

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLVMINIS IV. PARS II.

LIPSIAE, MDCCLV.

APVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder et P. Mortier iun. Parisiis apud
Briasson, Patavii apud I. Manfrè, Venetiis in B. Albrizzi et S.
Coleti officinis, Romae apud Venant. Monaldini.



I.

Commentarii societatis regiae scientiarum Gottingensis Tom. III. ad annum 1753. Gottinae. Sumtibus Eliae Luzac. 1754. 4. alph. 2. pl. 16. tab. aen. 11.



ox ab initio notamus, huic etiam commentariorum tomo, ut solet, a societate praefationem praemitti, ea, quae hucusque acta fuerunt in societate, recensentem, nomina etiam omnium, quae praeterito anno interfuerunt, membrorum adducentem, simulque continentem docte conscriptam IO. DAV. MICHAELIS orationem, *de defectibus historiae naturalis ac philologiae, itinere in Palaestinam Arabiamque suscepto sarcendis*. Sequuntur deinde:

1) *Observationum meteorologicarum ab anno p. 1. 1741. ad an. 1749. summa capita**, Auctore SAM. CHRIST. HOLLMANNO. Descripto autem instrumentorum, barometri thermometrique, apparatu, vicissitudines frigoris et caloris, eiusque gradus, nec non tonitrua, fulgura, nebulas, niuisque sexangulares et elegantes flocculos adnotat, et in additis tabulis, in quinque lineas distinctis, observationis insti-

N 2

tutae

* exposita a. d. 13. ian.

tutae diei horam, barometri thermometrique statum, ventorum plagas et tempestates exponit Cl. Auctor.

p. 67. 2) IO. MATTHIAE GESNERI *de electro veterum praelectio* *. Percleganti autem hac dissertatione, ut, quid de electro et vi electrica cognouerint veteres, pateat, primo in nominis rationem inquit, et, adfrentibus veterum locis, demonstrat antiquissimis graecis solem ἡλέκτωρ, lunam ἡλεκτρὶς, et ob cognationem succinum electrum vocari, eademque denominatione aurum insigniri, et misturam aliquam auri atque argenti, siue ab natura sibi iuncta fuerint haec corpora, siue arte. Veterum exinde auctorum loca explicat, quid veteribus de natura electri succini et speciatim de inclusis animalibus notum fuerit, ostendit, vim eius magneticam variosque alios usus magno cum eruditionis apparatu historice percurrit.

p. 115. 3) IO. GOTTFR. ZINNII *observationes anatomicae de tunicis et musculis oculorum* **. In varias disquisitionem diuisit sectiones Cl. Auctor, viam nervi optici, eius inuolucra, oculi post ea tunicas, eiusdemque musculos figillatim exponens, quum vero omnes, quas natura suppeditat, obseruandas conditiones concise et accurate declarauerit, nunc tantum primaria quaedam ex his adduxisse sufficiet. Nervus opticus in ingressu ad orbitam durae matris plica tegitur et antrorsum atque deorsum, sed etiam extrorsum procedit, in hoc ipso loco quoque contrahitur, et cellulosa tela intercedenti ossi adhaeret, mox vaginam a dura matre suscipit, et directione mutata leuiori modo extrorsum vergit et ad inferiora declinat, ut in bulbum semper inferius magis inferatur, ac eius fuit in orbitam ingressus. De vagina durae matris, ad

* Habita a. d. 3 febr. 1753.

** Lectae a. d. 8 febr. 1753.

ad neruum pertinente, etiam notatur, eam omnem in scleroticam terminari, exteriorem tamen cellulosa telam super bulbum expandi. Finitur autem sic, ut in scleroticam non continuetur, sed fibris suis margini posteriori, crassiori, prominenti scleroticae, prout ligamenta alias solent, inferatur, id, quod maceratione instituta intelligitur, qua sclerotica densa et tenax, vagina vero tenuis et laxa redditur. Huic vaginae subest pia mater, arctius medullae nerui nexa, cellulosa tela eius fasciculos iungens, ad bulbum propior, in adultioribus plerumque aliquantum fusca. Illa simul cum neruo, oculo vicino, constringitur, ita tamen, ut versus tempora conuexior, versus nasum planior sit, quo in loco a nerui ambitu reflexa ad scleroticae faciem internam accedit, eiusque laminam internam format, firmior reddita, concentrica scleroticae, intus ad choroideam fusca, ab ea nunquam separabilis; ut in fetu tandem, ubi paullo laxior, nouam membranam, scleroticam inter et choroideam constituat. Ipsa autem choroidea cum hac p. 124. cellulosa tela tantum coniuncta, eodem loco, ubi piam matrem a neruo recedere diximus, originem sumit, ut itaque choroidea piae matris continuatio dici nequeat, ora namque rotunda exsculpta, tanquam annulo seu circulo tumidulo, concentrica porro scleroticae, oritur et procedit, quod maceratio choroideam resoluens plenario confirmat. Retina tandem, ex medullari nerui parte producitur, quae tenerrimam laminam cribrosam transit, choroideae tantum contiguam, medulla nerui etiam post in papillam eminet et deinceps in laminam illam, cui retinae nomen est, expanditur. Cum humore vitreo arcte cohaeret, ut diuelli a Cl. Auctore non potuerit, eam tamen simplicem membranam esse iudicat, ex tenera tela cellulosa staminibusque nerueis conflata, quae vasorum etiam diuisioni fundamentum praebeat, nullo vero artificio in duas partes diuidi queat.

p. 130. Musculorum dein originem traditurus, varia, quae circa fundum orbitae notanda sunt, explicat Cl. Auctor. Foramen scilicet opticum ita positum est, ut margo superior et interior longior, inferior vero et exterior breuior terminetur, ex quo consequitur, ut omnium musculorum origo in eodem plano esse non possit. Per fissurae autem sphenoideae superiores locum accedens dura mater, illi, quae per foramen opticum exit, occurrens, ligamentum tendinis instar, efformat, ex quo tres, adducens, deprimens et ex parte abducens, musculi enascuntur carnei, propaginibus tamen tendineis, ab hoc ligamento deductis, contenti, quarum conditionum sigillatim subtiliorem descriptionem suggerit Cl. Auctor. Attollens musculus solus ex diuisionis durae matris angulo proficiscitur, supra quem leuator palpebrae ex perioestio orbitae enascitur, qui, ut obliquus superior, vaginam nerui optici non attingit, siquidem hic, ultimo nominatus, perioestio orbitae eo loco adhaeret, ubi dura mater sphenoidei ossis partem, cum ethmoidi portione plana nexam, inuestit, antrosum autem per trochleam progressus, in posteriori bulbi sede fibris radiatim dispersis, desinit, anteriùs tamen ac tendo obliqui minoris, cuius finis posterior est et medio tendini illius respondet. Ad insertionem tandem in scleroticam tendines rectorum musculorum ita attenuantur, ut reliqua parte tenuiores sint, hinc neque scleroticae crassitiem augeant, neque, ut multorum est opinio, in aponeuroticam membranam confluant, sed interuallis interpositis desinant.

p. 140. Ligamenta tarsea, a WINSLOWO notata, ultimo perpendit Noster loco; illi tamen durae matris laminae, quae in palpebram descendens, leuatorem et orbicularem, musculos disiungit, ligamenti nomen abiudicat; ad tarsum non nisi cellulosa existit, hinc ad eum integra non pertingit. Figurae additae nouorum horum inuentorum rationem exprimunt.

7) *De corporum marinorum, aliorumque peregrinorum, in terra continente origine, commentatio* SAM. CHRISTI. HOLLMANNI *. Incitatus Cl. Auctor, ingenti, quae Gottingae deprehenduntur, lapidum, petrefactis varii generis scatentium, numero, et miranda ossium permagnorum, de quibus alibi exposuit **, fabrica, conturbatus etiam permultis diuerforum auctorum, de eorum origine, disputationibus et hypothefibus, in veram eorum originem inquirendi magis accensa est magisque illius libido. Incipit itaque a veterum obseruationibus, et philosophorum eorum opinionem testimoniis corroborat, qui terram, quae nunc habitatur, maribus olim obtectam fuisse statuunt, hinc marinorum corporum ortum inde explicant, in qua recentiori tempore OVIDIVS atque TERTVLLIANVS permanserunt opinione. Post haec rudia et imperita, subtilitatibus nugisque obuoluta secula, negligentius in veram huius rei originem inquisuerunt, accedentibus pernociis acquiuocae generationis et lusus naturae hypothefibus, quae quidem substituta illa, qua per diluuium factae mutationi omne adscribitur punctum, opinione aliquantum deturbabatur, usque tamen recurrebat, ita quidem, ut maiora animantium ossa etiam lusus naturae aut gigantum ossa exprimere dicerentur, multis simul immistis fabulis. Recoxit autem, diluuium uniuerfale Noachicum causam esse, sententiam BURNETVS, quam exornans WOODWARDVS, confusio-
ni corporum, per inundationem factae, ordinem per specificam grauitatem datum fuisse statuit. Quae sane sententia plurimorum animis nostris etiam temporibus tam firmiter infidet, ut ab ea se auelli vix patiantur. His itaque tricis, quo eo melius expedire se possit, nunc tria in se suscipit peruestiganda momenta Cl. Auctor, num scilicet, dispersa per orbem corpora ma-

p. 285.

p. 307.

p. 319.

N 4

rina

* lecta a. d. I sept.

** vid. Comment. nostr. Vol. II. P. IV. p. 703 seq.

rina et exotica diluuii sint reliquiae, deinde num a recentioribus talis excogitata sit diluuii facies, ex qua omnia melius intelligi possint, et annon alius suppetat modus, illustrandae corporum marinorum origini accommodatus. Contra primam autem opinionem esse contendit, quod corpora marina magis in montibus eorumque cacuminibus, ad quae ob naturale sibi pondus facile deuenire non potuissent, quam in vallibus circumiacentibus, in quibus commode magis deposita fuissent, deprehendantur: porro, quod in angusto admodum spatio tanta conchyliorum copia coaceruetur, tantae saepius teneritudinis et paruitatis, quae per multa millia stadia aduehi potuisse nullo videantur modo, id quod copiosis exemplis, et aliquibus subiunctis iconibus comprobatur: deinde, quod sola marina, non alia ex terrestribus admixtis vel arte etiam productis, corpora simul congesta inueniantur: quod corporum petrefactorum facies huic refragetur hypothese; alia nimirum v. c. conchylia crusta sua adhuc inuestiri, alia eadem destitui, superflite nucleo osseo, formam referente, alia iterum, cum duro lapide coaluisse, quae omnis mutatio breuis illius temporis, per quod durauit uniuersale diluuium, spatii effectus esse nequeat: quod tandem terrae se inuicem excipientia strata, non sint opinioni conformia, quae et crassitie saepe a se discrepant et successionis modo, siquidem post leuiora grauiora sequantur strata, et haec iterum leuiora grauioraque

p. 339. eodem excipiant ordine. Quae quum ita sint, ut ex diluuiio argumenta, phaenomenorum ad explicationem facientia, desumi non possint, ad veterum refugiendum esse opinionem arbitratur Cl. Auctor, terrae omnis continentis superficiem aquis scilicet fuisse submersam, quippe quae opinio, suis circumscripta cancellis, declarandis phaenomenis apprime faciat satis, cuius rei periculum, ut videtur, laudabili cum successu Noster instituit. Est tamen in modo, quo

haec

haec euenerint, aliqua obscuritas, quam ita illustrare tentat, ut refutata prius ANTON. LAZARI MORO sententia, qua ex mari montes excreuisse, facta propulsione, et omnem continentem euomi quasi potuisse credebat, possibili quidem et non nullis exemplis dilucidata, non tamen probabili, alia veriora supeditet fundamenta. Terrae motibus varias regiones p. 355. totas fuisse euerfas notum sic est, ut de iis Herculanei, ante mille et septingentos annos voragine hausti, nunc denuo in lucem protracti, et nupera peruiani regni metropolis Limae, portusque Callaensis, exempla et alia plura, dubitationem relinquunt nullam, qui, quum fulgura sint subterranea, terrae incumbentis faciem concutientia, in locis, ubi cryptae et cauernae subterraneae existunt, orientia, fieri ali p. 364. ter non potuisse, quin maris itinera his ipsis mutata existant, in loca decliuiora recedant, grauitatis terrae centrum permuetetur, eiusque *alius conuersionis diurnae axis et obliquus ad planum orbis annui situs* efficiatur, ut corpora a mare longe dissita in remotis terris sepulta inueniantur. Tantis autem ubique circumuallatam proposuit suam hypothesein Noster argumentis, ut a vero eam prope abesse fatendum sit.

In quatuor additis tabulis tum lapicidinae prope Gottingam reperiundae, strata, tum partes quaedam, petrefactis farctae, lapidum eleganter delineantur.

9) IO. GEORG. ROEDERER *sermo de commu-* p. 397. *nicatione, quae utero grauido cum placenta intercedit* *. Duplex est auctorum de hac communicatione sententia, alii per vasorum sanguiferorum, alii per tenuiorum anastomofin fieri eandem autumant. Vtrique per iniectiones ceraceas suam comprobare ausi sunt, aliam ingressus est viam Cl. Auctor, quid ex institutis, in puerperis viuis obseruationibus elucescat,

N 5

disquisi-

* lect. a. d. 1. decembr.

disquisiturus. Varii eadem tentarunt, longe plura cepit tentamina Noster: Editio itaque vegeto et viuo partu, nulloque effluente ex utero sanguine, tanquam signo, placentam adhuc integre utero adhaerere, obseruauit, tunc demum praescisso funiculo umbilicali, nullum in funiculo fuisse pulsum, ex genitalibus sanguinem non prorupisse, magna tamen vi et arcu facto ex funiculo, sensim lentius, mox nihil, idque inter aliquot minuta horae prima; sanguinis quantitatem profluentem vix unciam unam et semissem multum superasse; uterum contractum fuisse, sed ita, ut laxo funiculum comprehenderit, soluta porro placenta, uterum sanguinem dimisisse, placentae vero vasa maiora sanguine vacua, in primis arteriosa fuisse, ea vero ligato funiculo sanguine turgere. Ex quibus id consequitur, ut, quum funiculus non constringatur, vel in vasis eiusdem enascatur thrombus, vel nihil ad placentae vasa sanguinis deueniat. In arteriis, quod vacuae sunt, non est coagulum, forte facilius in venis, sed nec hae turgent multum, ut sanguinis nihil accessisse noui inde pateat, et quid impediret, porro concludit Cl. Auctor, quo minus per anastomoses, venas et arterias placentae intercedentes, omnis euacuetur sanguis, quum alias minoris arteriae laesio letalem facere possit cruoris effusionem. Probabile igitur fit, uteri et placentae vasa immediata inosculatone sibi non iungi: in iis porro casibus, ubi funesta sanguinis per funiculum non ligatum effusio contigit, placenta ab utero fuisse solutam. Vasa, in uteri substantiam interne aperta lumina ostendunt, manifesto ampla, in puella, catameniorum tempore, ad quartam lineae partem luculenter hiantia, idem in utero grauido dissecto apparuit, in placentae superficie nullum vasis lumen conspicitur, copiosa vero et ampla in uteri superficie, sanguinem, si remouetur placenta, fundentia, quod idem sanguis, ex sano utero prorumpens, dum placenta soluitur.

tur, declarat. In placenta itaque vasorum lumina admodum sunt exigua; extraxit scilicet, id euicturus Cl. Auctor, postquam recens natus respirauit, placentam, sine funiculi tamen compressione, nec funiculum soluit, et pulsantibus licet eius arteriis nihil ex placentae superficie effluxit, nec orificium apparuit. Post pauca minuta cessauit pulsus, in placenta primum, dein in parte funiculi, huic propiori, circa infantem proxima adhuc obseruandus; calor funiculi prius ac pulsus periit, et dissectus funiculus tandem unciam circiter sanguinis effluere fecit. Idem euentus, quum infans simul cum placenta calidae trahebatur aquae, et dum eadem cum infante cohaerens, relinquebatur, ut inosculacionis vis hucusque adsumta multum labefactetur.

10) EIVSD. *sermo de pondere et longitudine recens natorum* *. Pondus hoc a nullo adhuc videtur cum aliquo studio fuisse disquisitum, docuere enim saepius facta pericula Cl. Auctorem, neque MAVRICELVM neque PHILLIPSON illud rite determinasse. Describit itaque pondus infantis, placentae, sanguinis ex utero effluentis, sed ita, ut pondus infantis simul illud relictæ portionis funis umbilicalis, fili, quo ligatur, et meconii, post partum adhuc inhaerentis, comprehendat. Adhibuit libram Gottingensem ciuilem, et pedem rhenolandicum, in decem partes diuisum. Ex omnibus autem, iam captis experimentis, quae et Cl. Auctor et nos optamus, ut ab iis, quibus copia data, repetiantur studiose, simul sumtis consequitur, summum infantis recens nati et maturi pondus octo libras vix superare, minimum quinque libris non esse minus, placentae pondus plerumque libram unam non exsuperare, sanguinis, ex utero exstillantis, post partum pondus duarum librarum esse, longitudinem vero infantum maximam pedem

* Lect. a. d. 1 decemb.

p. 420. pedem unum cum undecim pollicibus, minimam
pedem unum cum sex circiter pollicibus explere. In
gemellis, quarum una monstrosa, altera naturalis
erat structurae, pondus utriusque simul consideratum,
maturi foetus ponderi fere aequale, et in pueris saepe
testiculi iam delapsi in scrotum vel uterque, vel
uno alteroque in abdomine relictī fuerunt. Praeter
ea Cl. Auctor in eo iam est, ut natorum aliquando
pondus longitudinemque inquirat, quo rationem
quam illud et haec inter se habet, inueniat.

p. 425. II) 10. GOTTF. ZINNII *observationes botanicae* *. Docent illae, noua attentione sapientem partium plantae dispositionem semper accuratius posse declarari. Adhibuit autem laudabilem suam peruestigationem Cl. Auctor primo in describendo *Stratiote LINNAEI*. Planta haec, aquis innatans foliisque lineari-lanceolatis, in margine aculeatis instructa, hinc Aloe similis, ex foliorum sinu pedunculum crassum, foliis minorem protrudit, cui vero diuersi sexus, in distinctis autem indiuiduis, flores inhaerent. *Masculini* in spatha bifolia recondunt alios, plerumque tres flores, cui singulo spatha monophylla, tenera et pellucida datur, supra spatham pedunculus ex aquis exfurgit, continens calycem triphyllum, corollam tripetalam, in cuius medio filamenta flaua numerosa, et stamina duodecim, sed filamentis longioribus, antheris erectis insunt. *Feminini* fere similes, petala maiora, tubas sex, bifidas, triangulares, stigmate recuruo, alterne longiores continent, et ouarium hexaedrum, sex locale, septis spirae in modum intortis, semina multa oblonga, parum alata comprehendunt. Planta per gemmas propagatur sponte. Emendat itaque ex his botanicorum lapsus, qui vel non distinxerunt hos flores, vel rite non explorare poterunt.

Quod

* Lectae a. d. 29 Decembr. 1753.

Quod autem cum Hydrochari eam conuenire multi existimant, eius etiam descriptionem suggerit Noster et, prout prioris, partes floris accurate delineatas exhibet. In hac flos *masculus* quoad spatham p. 431. et contentos flores fere similis priori; ad LINNAEI descriptionem addi debet, staminum nouem sex exteriora breuiora et extrorsum recurua esse, tria interiora vero longiora existere, singulis ad basin stipitem adhaerere, omniumque antheras gemellas esse. Flos vero *femininus* absque spatha ouario oblongo, sex-loculari, seminibus rotundis, nudis foeto, inhaerentem habet corollam, instructam tubis sex bifido-caniculatis, inter quae nemini visi, eminent styli sex lanceolati, basi tubarum adnati. Caulis repit per flagella. Differentia a priori est in numero staminum, seminibus, ornamentis floris, situ ouarii et habitu externo. Quum vero in utrisque florigeri pedunculi in spatha contineantur, qua ratione cum aliis vegetabilibus similibus classem constituere possint naturalem, docet Cl. Auctor.

Describit deinde aliquas plantas, nondum accurate explicatas. 1) *Astragalum pedunculis foliis supparibus, floribus pendulis, siliquis erectis et longis, parum compressis*, MARTINI. HALLER. Enum H. Gotting. p. 260. Caulis ramosus, folia pinnata, duodecim plerumque parium, foliola ouato elliptica, neruo spinuloso, extremo impari, stipulae longae, pedunculi alares, spicati, bracteae albae, calyx parum hirsutus, denticulis duobus superioribus distantibus, inferiori longissimo, flores ochroleuci, vexillum compressum, emarginatum, lateribus eleuatis, alae ut in congeneribus, carina obtuse rostrata, purpurea intus, siliqua longa, teres, ad ortum incurua, ad valuas compressa, erecta, semina scabra. 2) *Cardiacam chinensem, albis calycibus aculeatis, semine nigro* MARTINI. HALLER, l. c. 326. Caulis fruticosus, tomentosus, folia petiolata, triloba, lobis incisis,

cisis, flores in verticillis densis, calyx quinquangularis, extus dense tomentosus, dentibus quinque aculeatis, tubus corollae longus, profunde diuisus, galea longa, ut Leonuri, erecta, alba extus hirsutissima, alae acutae, lacinia media lata, transuersa, barba tripartita, quinque lineis rubris notata, filamenta antheras rubras sustinent, semina nigra angulosa.

3) *Dracocephalum foliis ex lanceolato linearibus, rarius dentatis, spinulosis, floribus gemellis* MARTINI. HALLER, l. c. 334. Folia in fine obtusa, neruo emittente in spinulam, calycis sursum gibbi, striati, labium superius trifidum, dente superiori longissimo, labium inferius distans, profunde bifidum. Faux longa, hians, galea brevis, profunde emarginata, barba maxima, trifida, media lacinia transuerse lata, margine crenato, stamina parum inaequalia, stylus bifidus.

4) *Plantam nouam, Coreopsidi affinem.* Planta pusilla, ramosa, terrae appressa, rami et folia coniugata, ad originem vagina breui cincta: Folia lanceolata, rarius dentata, petiolo folioso: Flores ex alis: Calyx ex foliolis constans, duorum ordinum, latis, hirsutis, conuexis, pilosis: Flores in radio ligulati, extremo bifido, stylus stigmate duplici, reflexo: Flores in disco cylindrici, quadrifidi, anthera cylindracea, tuba alba, stigmate bifido: Semen oblongum, compressum, ornatum annulo membranaceo, breui, tenerrimis pilis ciliato. Thalamus planus, paleaceus. Planta est annua, cuius etiam icon adiicitur, cum Coreopside multa communia habens, alia discrepantia, forte ad nouum genus referenda.



II.

Iconum anatomicarum, quibus aliquae partes corporis humani delineatae traduntur. Fasciculus VII. Arteriae cerebri, medullae spinalis, oculi. Auctore ALBERTO DE HALLER. Gottingae, apud viduam Abr. Vandenhoeckii, 1754. fol. pl. 16. tab. aen. 6.

Quod in exponendis corporis humani vasis sibi pertexendum sumsit filum Ill. Auctor, ad arteriae carotidis internae ramificationes iam deduxit, cuius itaque distributionem, quatenus ab aliis descripta illa fuit, simul cum decenti de eorum cognitione iudicio, in praefatione docte recenset. Ipsa vero de hac dicta arteria carotide interna commentatio, spinæ dorsi medullae vasa etiam complectitur, intercostalium et lumbarium anatomen alibi est daturus.

Cum interna, quae nominatur haec arteria, ob p. 1. situm hocce nomen tueri nequeat, *cerebralem* potius vocandam esse putat Ill. Auctor, num vero eandem externa maiorem esse, nec ne, affirmari debeat, eam ambigit ob causam, quod ob exortum a carotidis trunco deductae arteriae thyroideae variantem in amplitudine etiam diuersitas occurrat, eodem fere modo, ac in flexionibus eius, quarum nulla est constantia, siue numerum siue magnitudinem spectemus. Ingressa in canalem petrosi ossis dura membrana quidem tegitur, sed sic, ut eam inter et duram matrem cellulosae telae pauxillum sit, neruo intercostali locum daturae, in hoc autem flexus quosdam constantiores habet, et *receptaculi sellae equinae* VIEVSSENII, in quod abit, sanguine perfunditur. Nullum vero, quod a GALENO introductum, ab aliis mox defensum, mox impugnatum fuit, rete mirabile eam circumdat arteriam. Quum enim aliquam eius speciem se inuenisse p. 3. doceret RVYSCHIVS, eas vidisse suspicandum est arterio-

- arteriolas, quas ad infundibulum et glandulam pituitariam abiisse detexit Noster, vel quae in receptaculum immittuntur. In receptaculo nimirum aliam posteriorem, aliam anteriorem arteriam et MECKELIVS et HALLERVS prodiisse viderunt, quarum ramusculi ad nervos, tertium, quartum quintumque abeunt. Hi prius ac ophthalmica oriuntur, nec non ex carotide, duram matrem perforante, copiosi ramuli eduntur, ad nervum opticum, infundibulum, glandulam pituitariam et plexum choroideum aliqui abeuntes. Porro arteria *communicans* inde nascitur circum WILLISII constituens, perpetua, diuersae tamen diametri, ad vertebralem abiens, quae deinceps ramos ad processus mammillares et vicinas partes ablegat. In diuisione lobi posterioris et anterioris cerebri in truncum anteriorem et posteriorem etiam arteria carotis interna nunc dispescitur, quorum anterior posteriori minor, *anterior carotidis internae ramus* siue *arteria corporis callosi* vocatur, cui praecipue ramulos largitur, aliis in lobum cerebri anteriorem et per eius substantiam dimissis. Nullas tamen cum sinu quarto communicantes deprehendi, contra b. GÜNZIVM notatur. Ramus autem *posterior internae carotidis*, anteriori longe maior est et truncum fere constituit, ramosque inter anteriorem et posteriorem lobum cerebri dispergit, in pia matre decurrit et dein fissurae SYLVII sese immergit innumeras in substantiam cerebri daturus ramificationes.
- Porro cerebrum a vertebralibus arteriis ramos haud paucos accipit, quarum quidem origo, quum in cerebro non sit, ad ramos nunc, ad duram matrem abeuntes, tantum respicit Ill. Auctor. Ex his primo notanda venit arteria *posterior durae membranae*, ad primam iam vel secundam vertebralem ablegata in dura matre copiosis ramulis distributa. Sed, postquam vertebralis arteria, subiecta medullae oblongatae, cranii cavitatem ingressa est, ante vtriusque lateris trunci
- p. 5.
- p. 7.
- p. 8.
- con-

coniunctionem, nascitur ex illa *arteria cerebelli profunda*, aliquando tamen utriusque lateris ortus inter se non conuenit, et inde vasa arteriosa cerebelli inferiori parti, medullae oblongatae et nervis suppeditantur, nec non inde *arteria spinalis posterior* haud raro originem sumit, quae saepe peculiaris vertebralis arteriae ramus est. Haec in finem calami scriptorii cum flexu delata, ad plexum choroideum quarti ventriculi pertingit suis ramis, truncus in medulla spinali, copiosissimis ramulis progreditur, ad alteram lumborum vertebrae desinens. Deinde *spinalis anterior* utrinque oritur, parallelo ductu per oblongatam et spinalem medullam descendit, cuius, ut prioris, rami sodales neruorum existunt, in collo duplex, in dorso unica est, et flexuosa ad medullae spinalis finem continuatur, a variis pro impari medullae spinalis neruo habita. Terminatur enim in confiniis ossis coccygis et sacri.

Post in fouea, medullae oblongatae ortum et p. 9.
pontem VAROLII intercedente, vertebrales arteriae in unam confluunt, quae *basilaris*, vulgo, a Nostro *truncus vertebraliū communis* nominatur. Haec circa pontem ad cerebellum ramos varios et ad nervos secedere facit, ex quibus semper etiam unus alterue ad acusticos nervos abit sub *auditiuae internae* nomine. Ad anteriorem pontis partem autem dela- p. 10.
tus truncus finditur in quatuor ramos, aut ramorum fasciculos, quorum plerique dissectorum et WINSLOWIVS etiam duos tantum notauerunt. Egreditur nempe ex his *arteria superior cerebelli* aliquando multiplex, quae ponti, superiori cerebelli parti, natis testibusque dictis prominentiis ramos largitur, aliisque vix constantis originis, superficiem et profundiore cerebelli substantiam adit. Prope has p. 11.
autem ex vertebraliū trunco utrinque dispergitur alia, cui *posterioris* aut *profundae cerebri* nomen imponit Ill Auctor, ab aliis etiam non praeteruisa, quae

Tom. IV. Pars II. O tertio

tertio ventriculo et thalamis neruorum opticorum vicinis sedibus, plexuque choroideo ramis prospicit. Deinde demum truncus hic *communicantes* cum carotide arterias, quas *circulum WILLISII* vocauit, supeditat. Neque tamen haec sola cum carotide communicatio, inter alios namque *profundae cerebri*, iam dictae minores ramos, quos copiose et graphice descriptos inuenimus, et quorum aliqui in posteriorem cerebri lobum diuiduntur, quidam et cum anterioribus carotidis ramis, a corpore calloso deductis, et cum posteriori eiusdem arteriae trunco aliquas alunt anastomoses, ut partito officio vertebralis arteria, aeque ac carotis inseruiat cerebro et de sanguinis arteriosi carotici et huius discrimine concidat multorum hypothesis. Est interim notatu dignus plexus, quem haec arteriae faciunt, in pia matre, quae a lobo cerebri posteriore, eiusque crure fornicis, nec non a cerebello abiens, antrorsum ad ventriculos laterales defertur.

p. 13. Haec de singulari in enucleandis vasorum cerebri ramificationibus, patientia et studio Ill. Auctoris aliquam tantum suppeditant notitiam, quam pro rei dignitate repetere non licuit, nunc de medullae spinalis vasis eadem agit cum sollicitudine, primo communia, deinde singularia momenta proponens. Tres in uniuersum ad singulum neruum rami arteriosi pertinent, qui eorum interualla occupant, ex his unus ipsam medullam spinalem adit, alter duram ei super inhaerentem membranam, tertius inuolucrum vertebrarum, durae matri circumiectum. *Secundus* ex variis truncis in diuersis locis prouenit, vel ex thyroidea vel ex cervicali aliqua. *Tertius* aliis ramis tum anteriorem tum aliis posteriorem partem inuolueri ambit, qui cum superioribus atque inferioribus communicant. Hi ex vicinis locis, in summo scilicet ex vertebrali, dein ex intercostalibus, lumbalibus et sacris proficiuntur, quorum omnium et singulorum accu-

accurate origo adnotatur. *Primus* tandem, ad ipsam medullam accedens, in anteriores et posteriores ramos distribuitur, et cum spinalibus anastomoses alit, anteriores saepe per duram matrem transeunt, posteriores vero iterum reflexae haud raro anteriores fiunt. Nullibi tamen tot eorum sunt, quot vertebrae, et in magnitudine earum quoque, fusius hic exposita, per multa discrimina.

Adiectae huic descriptioni quinque tabulae aeneae omnium vasorum, iam descriptorum, delineationes praebent. *Prima* ex his basin cerebri sistit, cuius lobus posticus ita reclinatur, ut fissura *SYLVII*, et deinde etiam ima ventriculi sinistri obseruetur sedes. *Secunda* plexibus cerebri declarandis destinata, superiorem partem cerebri omnem ablatam exhibet, ut nudum et integrum thalamis opticis inhaerens velum vasculosum pateat. In qua figura glandulae quaedam, in dura matre tentorii obseruatae, nullibi descriptae, simul delineantur. In *tertia* plexu hoc remoto, nudi thalami apparent atque cerebellum, ob cerebri maiorem partem resectum, et iam alia arteriarum itinera conspiciuntur. Sequentes, medullae spinalis arteriis dicatae, in *quarta* anteriores repraesentant, quarum posteriores *quinta* continet. In earum explicatione, obseruationes singulares de cerebro simul traduntur.

Excipit has peculiaris *arteriarum oculi historia*, eo magis necessaria, quod per earum disquisitionem et fabrica melius intelligitur et chirurgicarum, quae in hac parte fiunt, operationum indoles diiudicari potest. Praemittit ex more ill. Auctor eorum, qui in describendis oculi arteriis occupati fuerunt, recensionem, ex quibus recentiores potissimum laudandos esse manifestum fit; quid vero ipse hic praestiterit, sequentibus declarat: *Ego primus arteriam ophthalmicam tanquam truncum, cum omnibus ramis descripsi,*

scripsi, ramos oculares ipsi restitui, quos aliunde vir maximae auctoritatis IAC. BEN. WINSLOW deduxerat. Addidi vix definitos ramos, inferiorem oculi, supraorbitalem, arcum tarseum superiorem, inferiorem, et arterias ciliares anteriores, circulum uueae adeuntes: vorticosa vasa venosa esse ostendi; centram retinae ab origine sua persecutus sum; arteriolae fissurae lacrumalis ortum finesque definiui. Haec autem ex viginti et quatuor cadauerum peruestigatione confirmata habuit.

p. 37.

Ex praecipuis oculi arteriis itaque *ophthalmicam* primo nominat loco, quam a summis etiam viris pro dignitate minus recte descriptam esse ostendit, siquidem illa ex carotide interna, circa processus clinoides anteriores intra duram matrem, dum retrorsum et introrsum reflectitur, ex arcus conuexitate exoritur, cum nervo optico comite per foramen opticum ingressura. Plerumque sub nervo optico ad latus externum prorepit, nec non sub nervo tertio quarto, que et origine musculorum, in recessu proprio foraminis optici. Rami eius vero constantes non sunt, de quibus tamen ita differuit Ill. Auctor, ut ex copiosissimis observationibus ramos primum enumeret, varietates porro ostendat, tandemque communia et magis certa declaret. Varietates iam praetermittimus, praecipui vero ophthalmicae rami sunt, lacrimalis, ethmoidea posterior, centralis retinae, ciliares variae, supraorbitalis, muscularis inferior, ethmoidea anterior, palpebralis inferior et superior, nasalis et frontalis, quarum singularum aliqua momenta addere iam conueniet. *Lacrimalis*, quae aliquando etiam ex meningea, nunquam ex carotide interna prouenisse visa est, et plerumque ramulum ad duram matrem dimittit, porroque minores, ad periostium orbitae, musculosque, alium, qui os malae perforat, in musculum temporalem abit, alios praecipue glandulae lacrimali. Sed ab hac etiam recedens
sub

sub musculo ciliari descendens cum ramis ophthalmicae arcum constituit, hinc vocatur arteria *tarsea externa inferior*. Alius ramus ad palpebram superiorem deuenit, qui cum temporalis arteriae ramificationibus et ophthalmicae in arcum tarseum posteriorem et superiorem coniungitur, et nominatur *tarsea superior externa*. Truncus arteriae in adipem palpebrae tandem consumitur. Constantes itaque ramos p. 41. nominat Ill. Auctor, meningeum, perforantem malarum, palpebralem superiorem et inferiorem, et praeter minores furculos, lacrumales proprios. *Ethmoidae posterior*, quam olim *nasalem posteriorem* nominauerat Noster, non perpetua, saepe tamen adest, sub rectis oculi superioribus musculis procedens, foramen subit ossi fronti et plano commune, vel ex altero solo proueniens, et ramulis subtilibus in hoc loco, aliis in dura matre, ad quam truncus redit, distribuitur. *Centralis retinae* autem ab ophthalmicae trunco, inter ingressum in orbitam et locum, quo ille neruum opticum supergreditur, oritur, non nunquam ex ramo. Sunt aliquando minores ramuli sub nerui integumentis et in eius medulla decurrentes, aliquis tamen axin occupat semper, qui ad retinam deductus in numerosos diuiditur ramulos, ubi tamen hic desinant, nondum satis exploratum esse sibi adferit Ill. Auctor, licet circulus interior vasorum retinae, a Cl. ZINNIO descriptus, de quo suo tempore dicemus, omnem propemodum dubitationem eximat. Hac vero data occasione de corona ciliari notat p. 43. Ill. Auctor, eam esse coagulum muci nigri, inter retinam et ligamenta ciliaria constitutum, quale non nunquam, in retinam effusum, ibidem maculas diuersae magnitudinis facit. *Supraorbitalis* porro ophthalmicae ramus, per similis nominis foramen exit in fronte, post priorem demum nascitur et sub periostio orbitae antrorsum procedit, in transitu musculis vicinis ramos largitur, deinde ad orbitae margi-

nem constituta in duos ramos diuiditur. Quorum alter exeuns ex foramine dicto in fronte diuiditur, alter intus remanens, sub orbiculari palpebrae musculo et corrugatore extrorsum progressus cum temporalibus communicat. *Ciliares* arteriae numero discrepant et origine, quarum itaque varietates diligenter inuestigando Ill. Auctor, haec inuenit constantiora esse, ex paucissimis duas esse, ex plurimis sex, plerasque ex ophthalmica, aliquas etiam ex aliis, ut ethmoidea posteriori, supraorbitali, ramis muscularibus vel lacrimali dimitti. Accedentes autem ad eam, quae neruo optico et scleroticae tunicae interest, pliam, inter se coeuntes, circulum constituunt arteriosum, a Cl. ZINNIO primo notatum. Ex his deinde perforantes scleroticam rami proficiscuntur, quos Ill. Auctor *ciliares posteriores et breues* appellat, quippe qui prope neruum opticum in scleroticam penetrant. Hi vero *primum ordinem* constituunt, quos locus, quo scleroticam transeunt et in primis finis distinguit: *alterum ordinem* faciunt *ciliares longae* arteriae, quarum ingressus in scleroticam ad lineam et ultra ab insertionem nerui optici distat. Pauciores hae sunt, frequenter duae, quum priorum numerus ad modum differens ad triginta usque deueniat. Hae *longae* in ipsam scleroticam ramulos dant, trunci progrediuntur inter eam et choroideam et ubi ad orbiculum ciliarem deuenierint, in cellulosa tela diuaticatae ad angulos obtusos inter se communicant et in uueae principio annulum efficiunt, semiduplicem flexuosumque. Praeter has etiam ad scleroticam pertinent *ciliares anteriores*, qui ab iis ramis, qui ex iam dictis trunculis musculos comitantur, ad scleroticam, a cornea unius circiter lineae distantiam adueniunt, numero plures, et per cellulosum contextum ad orbiculum ciliarem cum longis congregiuntur, simulque partem annuli seu circuli uueae faciunt. Quaedam aliquando continuo uueam adeunt, et in choroideam desinunt,

nunt, anterie pallidam, pauciffimis vafis fanguiferis inftitutam. Ex eodem uueae circulo vafa in iridem difperguntur, quae in fetu pupillam praetergreffae ad feptimum menfem ufque eam claudunt et tunicam WACHENDORFII efformant. Quod deinde ad ciliares pofteriores pertinet, eae arbufculorum inftar ramosae per choroideam pergunt, fub quibus *vafa vorticoſa* STENONIS funt, quae vero certe pro venarum propaginibus haberi debent. Choroideae autem arteriae, ad concavam eius fuperficiem delatae, in ligamenta ciliaria immittuntur. Ab iis quoque flocculi, quos humoris aquei fontes eſſe non immerito ftatuit Ill. HALLERVS, ſecedunt, qui forte etiam ad lentem cryſtallinam diriguntur. Reliqua enim, quae de horum vaſorum ramificationibus apud diſſectores proſtant, adeo indubitata non funt. Inſignis et per p. 49. petuus trunculus eſt arteria *oculi inferior ſive muſcularis inferior*, ex ophthalmica enatus, licet autem nec hic varietates deſint, ex conſtantiori tamen norma muſculo recto inferiori, obliquo minori et ſacco naſali largitur ramificationes. *Ethmoidea anterior*, itidem ophthalmicae propago, per foramen, ſuper cecululam ethmoideam anteriorem, intrat, huic et ſinui frontali ramos exhibet; truncus autem in cranium redit, in dura matre et falce ramulos difpergens, nec non in ſeptum narium continuatur. Neglectae magis p. 51. fuerunt *palpebrales* arteriae, *inferior et ſuperior* ex ophthalmica conſtanter ortae videntur, quae cum aliis ramis internis et externis varias alunt anafomofes, quarum deſcriptiones ſuggerit Ill. Auſtor. *Nafalis* ex ophthalmica, circa ſaccum lacrimalem dimiſſa, ad orbicularem muſculum, et palpebram inferiorem partim ſubcutaneum arcum in facie exteriori, orbicularis muſculi format, partim aliis ramis circa naſum diffunditur et ibi conſtitutis partibus ad globulum eius ufque vafa porrigit, nec non ſuſum ad frontem rami deducti fuiſſe viſi funt. *Frontalis* tandem arte p. 52.

ria in tres primarios ramos dispescitur, etsi ludere et hi saepe soleant, scilicet in *superciliarem*, *profundam* et *subcutaneam*. *Primus* ex orbiculari musculo exit, deinde profunde sub corrugatore in periostio adscendit, aliis inosculatus. *Tertius* ad interiora magis glabellae procedit, supra musculum frontalem in frontem adscendit, *secundus* autem sub orbiculari et corrugatore musculis in periostio ad fontem pulsatilem venit, pariter coit cum aliis, vel exteriorem orbitae superficiem legit.

Sufficiet itaque nobis, huius plenissimae descriptionis arteriarum oculi aliquo modo adumbrasse historiam, laboriosissimam expositionem harum rerum amatores in ipso libro admirari poterunt, dum studiosius perlegunt atque cum natura conferunt. Non omisit tamen Ill. Auctor recensionem earum arteriarum, quae ad exteriores oculi partes pertingunt, et vasa sunt accessoria. Persequutus itaque est ramos arteriae infraorbitalis, nec non temporalis, atque angularis. In quibus omnibus expositionibus id praecipue sibi praefixum habuit, ut vel aliorum animaduersiones, quae naturae non respondent, emendaret, vel confirmaret.

Icones his arteriarum oculi explanationibus in tabula septima subiunctae omnes eas tum externas, tum internas accurate sistunt, nec non coniunctiones per anastomoses varias, atque in omnibus tunicis decursus elegantissime ante oculos ponunt.



III.

Der monatlich herausgegebenen Insecten-Beluftigungen erster Nachtrag, in welchem verschiedene zu dem bereits herausgekommenen Classen gehörige Insecten, mit ihrem Ursprunge, Verwandlung und allen wunderbaren Eigenschaften aus eigener Erfahrung beschrieben, und in sauber illuminirten Kupfern nach dem Leben abgebildet vorgestellt werden von AVGVST IOHANN RÖSEL, Miniatur-Mahler. Nürnberg, 1747. 4. 2 Alph. und 85 Kupertafeln.

hoc est:

Supplementum primum deliciarum, menstruo spatio editarum, ex consideratione insectorum enatarum, in quo varia insecta ad classes iam descriptas pertinentia, quoad originem, metamorphoses aliasque qualitates ex propria experientia describuntur et figuris, coloribus pictis viuum exemplar imitantibus, proponuntur, auctore AVG. IOH. ROESELIO, pictore.

Quamvis annus, quem titulus huius libri indicat, in nostrorum laborum tempus non incidat, praefixum tamen nobis terminum denuo laedere ipsa huius tractationis dignitas aequae ac elegantia nos monet, putamusque aequum lectorem amori in patrios profectus aliquid esse daturum, quum in hoc scientiarum genere, ab exteris editos dum euoluimus commentarios, huius laboris cognitionem ad eos non peruenisse, saepe inueniamus. Accedit et hoc, quod nondum ad finem deductum sit hoc supplementum atque ea propter ad recentissima possit scripta referri. Neque tamen plus Cl. Auctoris studio nos tribuere,

ac veritas postulat, ii iudicabunt, quibus nitida eius ranarum historia, alibi a nobis laudata *, non est incognita. Liceat vero, dum de supplemento iam nobis dicendum est, totius operis telam a primis eius initiis pertexere.

A longinquo iam tempore insectarum capiebatur amoribus Cl. Auctor, et eorum etiam faciebat ectypos, qui dum accurati esse observabantur, aliorum incitatus persuasione publice eosdem edere inducebatur. Sed, quod sine explicationibus, quibus ea, quae in iconibus sisti nequeunt, dilucidantur, sperata utilitas obtineri non potuisset, in emendando stylo, addendisque iisdem explicationibus post Cl. Auctori adstitit D. G. E. HUTH, Norimbergensium medicus eruditus. Factum hoc est anno huius seculi quadragesimo primo. Quoniam vero de suscepti laboris successu in antecessum iudicium formari non poterat, nec de eo quidem poterat cogitari, ut in systematicum ordinem redacta proponantur insecta, interim paullo post coniunxit inter se, quae characterum indoles sibi volebat vicina esse. Papiliones, utpote colorum varietate et elegantia allicientes sensus, primo itaque illustrabantur loco, sed, quum et illi, et erucæ, horum antecessores, ubique sufficienter non cognoscerentur, ad alia se convertere insecta cogebatur. Primus itaque tomus anno huius seculi quadragesimo sexto ad finem iam properabat, cuius vero contenta, quae titulus maximam partem explanat, qui cum superius notato fere convenit, hic breuiter adducere non dubitamus. Est vero titulus hic:

Der monatlich herausgegebenen Insecten - Belustigungen erster Theil, in welchem die in sechs Classen eingetheilten Papilionen mit ihrem Ursprung, Verwandlung und allen wunderbaren Eigenschaften

* vid. Comment. nostr. Vol. II. P. I. p. 85.

genschaften aus eigener Erfahrung beschrieben, und in sauber illuminirten Kupfern nach dem Leben abgebildet vorgestellet werden. Nürnberg, bey dem Verfasser, 1746. 4.

id est:

Deliciarum, ex insectorum contemplatione, per menses euulgatarum, Pars prima.

Addita huic tomo praefatio, utilitates insectorum exponit, eorum naturam indagat et diuisionis rationem perpendit. Collectiones illae sex, ex quibus hic tomus constat, sequentia continent: prima nimirum collectio, quae octo plagulas complet, et tabulas decem, primam papilionum classem sistit, qui omnes pilos habent fasciculatos, germ. *Dornraupen*, et sunt vel gregarii vel solitarii. De harum vero descriptione et deinceps de omnibus simul valere notamus, si fieri potuit, singulorum mutationes ab ouo exponi et delineari, nec non partes singulares, nudo vel armato oculo obuias, prout v. c. sunt plumae vel pili papilionum, eorum erucae, chrysalides, folliculi, papilionum superficies superior et inferior et sic porro, vel etiam aliquando insectorum declaratorum anatome. Secunda collectio in octo itidem plagulis et decem tabulis explicata, alteram classem tradit papilionum vel laeuium vel leuiter pilosorum. Tertia octo plagularum et tabularum phalaenas exhibet, earumque primam classem, quae ex erucis in cauda cornutis et glabris fiunt: quarta collectio, triginta nouem plagulis et sexaginta tribus tabulis, in altera classe phalaenarum, mixtas ostendit, quarum maxima pars pilosa est vel pilis fasciculatis ornata. Quinta collectio in sex plagulis tredecimque tabulis describit geometras et *baculiformes* REAUMURI, quae tertiam classem constituunt, earum vero paucae adducuntur. Sexta tandem plagularum sex, tabularum decem et septem, quartam classem sistit, quae complectitur

plectitur crucas, folia conuoluentes et eas, ex quibus phalaenae minores, *Motten*, prodeunt. His iunguntur eae, quae in fructibus et gemmis resident. Huic etiam tomo index rerum notabilium additur, praefationes vero speciales, generalia momenta continent, ad notitiam descriptorum insectorum pertinentia.

Paulo post coepit alter tomus prodire:

Der monatlich herausgegebenen Insecten - Belustigen zweyter Theil etc. welcher acht Classen verschiedener, sowohl inländischer als auch einiger ausländischer Insecten enthält. Nürnberg, 1749. 4.

hoc est:

Deliciarum ex insectorum contemplatione enatarum et per menses euulgatarum, Pars altera.

Verum, quod in titulo huius anni et illo supplementi differentia est, tenendum erit, illum tomum ante huius initium fuisse quidem inceptum, eo demum tempore, quod significatur, ad finem deductum. Praefamen generalia de scarabaeis continet et exoticas quasdam eorum species recenset delineatque, in plagulis quatuor atque duabus tabulis. Sequuntur deinde scarabaei nostrates, in duas iterum classes distributi, primo quidem terrestres nouem plagulas et tot tabulas complent, deinde insecta aquatica, eorumque denuo duae classes, quarum prima quatuor plagulas et tabulas, altera decem plagulas cum tabulis sedecim explet. De scarabaeis in uniuersum agens Cl. Auctor, eorum septem diuersa genera, a variis, quibus interdistinguntur, conditionibus constitui posse putat, nempe terrestres, qui in terra plerumque viuunt, deinde lignorum incolae, seu cerambyces, in foliis porro habitantes, alios, qui proboscide instruuntur, alios elasticos, motu vehemēti

menti corpus attollentes, tandem stercorearios atque rapaces, ex rapina qui victitant. Horum generum aliqua specimina adduntur et deinde insecta aquatica describuntur. Prima classis ex his recenset scarabaeos aquaticos eorumque ab ovo admirandam metamorphosin, hi vero plerumque in aquis habitare solent, nec nisi per continentem ex palude uno in alium iter facientes facile occurrunt: Secunda classis sistit primo nymphas seu libellas, in quarum alis, expansis et variis reticulis vasorum instructis, Auctor aliquam cum semine aceris se inuenisse conuenientiam arbitratus, eam ante oculos positurus, aceris feminum delineationem addidit et cum his insectis comparisonem instituit, has excipiunt alia, ut ephemerum et erucæ variae aquaticae, inter quas sunt, quae in domuncula viuunt illudque ubique secum circumferunt. Proximo loco ab his locustae atque grylli constituuntur, insimul etiam plurimae exoticæ cicadae et locustae, deinde indigenae et gryllotalpa depinguntur, nec non laternarius scarabaeus, quem vocant, seu cicada laternaria, Americana itidem ac minor quaedam Asiatica, hic deprehenditur et locustarum gregariarum descriptio occurrit. Tabulae huc pertinentes triginta, in plagulis viginti octo describuntur. Ab his transitus est ad bombylios et vespas nostrates, quarum tredecim tabulae sunt, et descriptionis plagulae nouem. Pro sua quidem cognitione suppeditat Cl. Auctor tria vesparum genera, gregarias nimirum, foliorum vespas et ichneumones, quas *Vipper-Wespen*, germanice appellat, siquidem iis IVNGIVS vibrantium dederat nomen. In gallis vero seu tuberculis quercuum inuenienda insecta huc accedunt, et ex diuersis hisce generibus specimina aliqua, alia enim in supplemento sequuntur, exponuntur. Ultimo tandem loco culices seu tipulae et muscae variae septem plagulis decemque tabulis obueniunt, inter priores est pulex. Vermes aquatici in tipulam conuertendi, muscae

muscae stercorariae, quae a foetore stapeliae alliciuntur, huc referuntur et ipsius stapeliae cum flore icon adiiicitur. Nec in hoc tomo dissectionis desunt specimina et index aliquis, ut prioris tomi, praecipua continens momenta, finem eius facit.

- Iam itaque ad supplementum properamus, quod ex variis classibus, in superioribus tomis propositis, noua specimina adiungit. Crucarum magna est copia, papilionum etiam et phalaenarum, ex his procedentium, mira colorum varietate ludentium. Ob-
- p. 5. seruamus v. c. phalaenam ex cruce, laesimino flore albo inhaerente, quae maculam habet caput mortuum referentem. Rara haec est, hic quidem non prima
- p. 17. vice, fusius tamen proposita. Porro geometram magnam ex albo fuscam, undulatis striis insignitam,
- p. 21. aculeis et tuberculis notatam, ex Rosa de Iericho, nec non phalaenam ex cruce Ligustri, viridi, caudata in latere septem paribus linearum obliquarum partim
- p. 37. purpurearum, partim albarum, picta. Idem crucas quasdam, in posteriore parte cornutas, et historiam fusam atque anatomen crucae ex moro, ex qua bom-
- p. 101. byx fit. Superfedemus recensione permultarum erucarum, quae deinde adduntur, ampla vero est *formicae-leonis* historia, in qua eius genesis, metamorphosis in libellam moresque accurate traduntur, nec non observationes quaedam Reaumurianae emen-
- p. 133. dantur. Inter *cimices aquaticos* alios lato alios angusto corpore instrui docetur et paulo post cimex magnus aquaticus Surinamensis delineatur, huius autem icon ex MERIANAE infectis desumpta, secundum exemplum siccum emendatior sistitur. Interspersa his protenus existit aranea aquatica minor rubra, nigris lineis notata, quam excipiunt varii demum cimices, apud nos vulgares, quo facto eorum historia magis
- p. 251. redditur completa. Post varies porro papiliones vespaie gallarum earundemque metamorphoseos momenta recensentur, iterumque papiliones varii sequuntur,

quantur, inter quos praecipue attentione digna est descriptio papilionis, coloribus variantis, Iris vulgo dicti, cuius scilicet alae pro diuerso oculi insipientis positu coeruleae vel fuscae apparent, quippe cum prismaticas habeant eminentias transuersas, utrinque aliter coloratas hinc etiam diuersas oculo imagines sistentes. A papilionibus atque phalaenis et vespa-
gallarum, quae ad inferiorem superficiem foliorum quercus posita reperitur, consideratio ad astacos procedit, quibus minor marinus, nostris *Seekrabbe* dictus, adiungitur. Inter scorpiones, qui aliquam-
cum his affinitatem habent, minimus, orientalis et italicus est, sed, quo varietati lectorum placeat, mox vermes, coryli in nuce habitantes ac inde pro-
ductus scarabaeus rostratus et varietates multae papilionum et phalaenarum explanantur. Tandem libel-
li instar singularis, historia polyporum aquarum dulcium legitur, in qua enucleanda adhuc desudat Cl. Auctor. Est enim appendicis instar addita et separatim haberi potest, ad finem vero deducta supplemento huic simul terminum ponet. Recensentur varia genera horum insectorum, nec non diuersa TREMBLEII tentamina a Cl. Auctore repetita, licet non semper eodem cum successu. Nihilo tamen fecius a suscepto labore recedere animus illi non est, sed de araneis, cochleis, lumbricis aliisque erucis et papilionibus in posterum se acturum esse promittit.

Quum vero de omnibus, quae in hoc supplemento continentur, insectis fusius exponere animus non sit, nec facile possit sine iconibus in horum corporum descriptionibus quidquam intelligi, nunc demum, ut modum, quem in declarandis iis seruauit Cl. Auctor, nostris etiam lectoribus monstremus, quaedam speciminis loco tantum adducere liceat.

Gallas itaque quercubus adhaerentes inter alia peruestigauit Noster et primo quidem de iis egit, quae in alis foliorum sedentes ex trunco vel ramo protuberare

berare solent. Qua occasione variae quod sunt Gallarum species, sedula observatione se septem eorum cognouisse scribit. Magna et rotunda galla est haec prior, de qua iam differitur, altera rotunda, sed minor, superficiei auersae foliorum adnascitur, tertia ex eodem loco prorumpens, vix pisum magnitudine aequat; quarta hemisphaerica et compressa est, plana sua superficiei folio subtus adnectitur et ante maturitatem strias transuersas, rubras, eminentes, asperas, ex fundo luteo prouenientes, ostendit, pisco dimidiato vix maior; quinta aggregata umbellae similis, a REAUMVRIO cum Cinara comparatur extremoque ramulo insidet, sexta ex fructibus quercus enascitur, septima spongiosae magis naturae ramulorum etiam apicibus inhaeret, fusca et hirsuta est.

De priori autem genere in tabula sistit diuersas a primo initio ad maturitatis terminum factas in magnitudine differentias, quo temporis etiam interuallo color mutatur ex viridi in luteum, ochrae similem, transeuntem. Interior substantia ex fibris constat et cellulosa est et succis abundat, fibrae vero radii instar ex medio centro in ambitum deferuntur. Deinde in medio puncto vermiculum tenerum inuenit Cl. Auctor; si vero, quod non raro fit, plures vermiculi simul incrementum, sensim factum, describitur, coloris etiam mutationes adducuntur et in vespam metamorphosis. Huius sexus ex magnitudine cognoscitur et femina aculeo armatur, qui in vagina ad inferiorem abdominis locum, quippe quod facile maximam vespae partem constituit, continetur, longus ille est et per radicis protrusionem maxime exseri potest, ad finem autem hamatus conspicitur. Inuenit etiam Cl. Auctor oua in abdomine, fluído viscido inhaerentia, pyriformia, quae mediante
iam

iam dicto aculeo in gemmas adhuc teneras, quas vespae pertundit, deponuntur et ibidem crescunt.

Paulo post alteram speciem eodem modo disquiri-
rit, quae non nisi loco natiuitatis a prima differt, p. 291.
vermis autem intus delitescens, loco proboscidis
(*Zangengebiss*) in priori obseruati, tantum papilla in-
struebatur. Describit itaque Cl. Auctor et hic in
chrysalidem metamorphosin, ex qua proueniens vespa
saepe per totam hyemem perdurat, haec autem ex
fusco nigricante et splendente praedita est abdomine,
alis longis atque antennis protractioribus et aculeo
destituitur. Oua oualia sunt et duabus appendicibus,
folia imitantibus, ornata; quorum formam aliquan-
do ipsis gallis differentem figuram dare posse suspica-
tur. In fine huius disquisitionis alius vespae speciem
delineat et describit, quae REAUMVRIUS notante
saepe in gallis delitescens obseruatur.

Deinde quartum supra nominatum genus explica-
re pergit. Vermis intus latitans admodum exiguus p. 403.
totam per hyemem immutatus viuit plerumque, si-
mul cum foliis labentibus decedunt gallae, et pri-
mo demum vere vespa egreditur. Maligno autem
accidit Cl. Auctori fato, ut loco gallae vespae non
nisi ichneumonem, quem describit atque pingit, ob-
tineret.

Astacorum deinde disquisitionem suscepit talem,
ut non externas tantum notas et differentias expri-
meret, sed interiorem quoque structuram dissecando
rimaretur Cl. Auctor, quam quidem ad suscipienda
eius modi negotia dexteritatem in opere ranarum ad-
mirati fuimus. Rationem itaque reddit, qua propter p. 305.
astacum ad insecta cum LINNAEO aliisque rerum na-
turalium indagatoribus referat, nimirum, quod ossibus
destituatur, et os transuersim apertum habeat, oculos
palpebris non tegat, sed eosdem prismaticos et in va-
rias politas superficieculas distinctos habeat et tandem
aerem non per nares, sed per alia spiracula trahat.

Duplicem autem astaci nostratis speciem esse asserit, fluuiatilem nimirum, in vulgus cognitum et minorem chelis distinctum. Ad propagationem suscipiendam tertio demum anno aptos esse censet Cl. Auctor, cui tempus a nouembri mense ad aprillem destinatum est. Mas, magnitudine chelarum cauda minus lata primo intuitu a femina distinguitur. In astaco autem in genere caput anterius acuminatum est, corpus oblongum, cauda crassa, decemque pedibus instruitur. Caput ad mediam scuti partem pertingit, quae transuersa linea distinguitur, os eius in hoc loco inferius constituitur, cui immediate ventriculus superest, antice in cuspidem desinit, cui a latere duo minores adstant, deinde oculi et antennae duae praelongae articulatae, quatuor minores sub his oculi, quos separatim delineat Cl. Auctor, emissiles sunt, exterior haemisphaerica nigra tunica, cornea dicenda, insistit alii retrorsum productae, quam scleroticam nominare possemus, posterius in neruum opticum propagatur, vitreus etiam cum crystallino humor inest, qui posterior tamen nigricans esse deprehenditur. Reliquum scutum mera crusta est, partes contegens subiectas. Cauda ex quinque articulis constat mobilibus, postice in eius modi iuxta se constitutas squamas desinens. Pedes decem numero in tribus anterioribus paribus in chelas desinunt, quae vero in primo pare robustissimae sunt, duo postrema paria vero simplici unco terminantur, quibus adiumentis tum ad retinendum se, tum ad capiendos cibos et defensionem suscipiendam adaptatur. In inuerso astaco praeter iam dictas capitis partes duos maiores dentes conspiciamus, sub quibus gula est, et tres mobiles partes ad depurandos dentes, ut videtur, datae, nec non duae productiones, pedibus minoribus non absimiles, ex quatuor articulis compositae, pilis instructae, quae vero ingressum non iuuant, et alimentis recipiendis simul destinantur, ab horum

horum exortu filum etiam propagatur, incertae utilitatis, sub quo articulatio priorum pedum observatur. In sexu porro haec differentia est, quod in mare ad articulationem duorum ultimorum pedum vesiculae seminales, in femina vero ad tertium pedum par intra eundem locum ovale orificium, tenera et eminente pellicula clausum, detegatur. Sub cauda deinde differentia annotatur; mas enim tria tantum paria minorum pedum, femina quinque eorum partibus squamosis caudae inhaerentium obtinet. Coeundi mos hactenus detegi tamen non potuit. Ultima tandem squama caudae inferius aperturam habet, in utroque sexu, qua intestina terminantur. Pedes vero minores in femina retinendis ovis inferuiunt.

His itaque absolutis, ad internarum partium structuram considerandam se conuertit Cl. Auctor, quae eas praecipue confirmant observationes vel emendant, quas de illis partibus proposuit LVC. ANTON. PORTIVS*. Monet autem, se ex multiplicibus subiectis descriptionem, saepe instituta peruestigatione, desumisse, ut eo accuratior euaserit. Remoto eam ob causam scuto pectorali et squamis caudae cerebrum antè detegitur, pone quod utrinque cauitas conspicitur, quae sedes lapidum cancerorum est, hyeme vero viridi materia repleta. Retro hanc crotaphites musculus, WILLISIO dictus, observatur, superius latior, inferius in tendinem abiens, in dentes vero, quorum mentionem fecimus, inferitur. Horum latera comprehendit materia lutea ab Cl. Auctore cum testiculis communicare visa, quae vero paullo exterius foramine pertunditur, in quo membranacea expansio in fimbriam laciniata, mobilis perpetuo observatur et sub se varias squamas teneras, foliaceas quasi, habet, quibus eandem, ac branchiis piscium naturam et usum vulgo, et recte forte, adscribunt. Intus vero infra hanc substantiam ventriculus maio- p.332.

P 2

rem

* vid. Ephemerid. Nat. Curios. Dec. II. An. 6. p. 48.

rem tamen partem in capite collocatur, membrana-
 ceus quidem ille, ad fundum vero musculo satis crasso
 armatus est, et intus dentibus instructus tribus; su-
 pra se positum obtinet, materia amara plenum, bilis
 receptaculum, inferius in gulam aperitur, posterius
 in intestinum rectum, omnem longitudinem caudae
 emetens, terminatur. Sub hoc duo oblonga glan-
 dulosa corpora in conspectum veniunt, testes consti-
 tuentia, quibus cor subest, ex quo antcrius tria vasa
 egrediuntur, posterius unum, per omnem caudam
 progrediens, aliud nodosum vero vas sub cauda ite-
 rum adscendit ad cor. Ad cordis inferiorem lo-
 cum conuoluta vasa spermatica inueniuntur. De qui-
 bus partibus, utriusque sexus, naturalibus adhuc ob-
 servationes aliquas subiungit Cl. Auctor. Praeteri-
 mus enim, quae de vermibus, in astacis nidulantibus,
 differit. Ad maris partes itaque testiculi pertinent,
 superius ampli et quasi ex duplici parte constantes,
 inferius, ubi sub corde positi sunt, in angustiore
 coecum canalem desinentes, ex quo magna tenuium
 canalium, intortorum vario modo, series decurrit,
 unico tamen producto ramo circa pedes posteriores
 desinens, verumque sperma excernens. In femina
 eundem locum occupat ovarium, itidem in tres par-
 tes diuisum, quarum duae superius linea media di-
 uisae, unum inferius deorsum pendet. Oua intus
 haerentia magnitudine variant, et per continuatos
 oviductus ad medios pedes deferuntur, qui ibidem
 orificio utrinque uno hiant. Per quod ova sic emit-
 tuntur, ut singulum filo glutinoso adhaereat, quae
 ratio est, quapropter illa pedibus adglutinari et tuto
 delitescere possint. Microscopium in his membra-
 nam inuoluentem et varii coloris puncta detegit:
 egressum vero pulli non obseruauit Cl. Auctor, licet
 eos viuentes, dictis adhuc locis inhaerentes, saepe
 deprehendamus. De ovario simul monet, illud for-
 te in ovarium et uterum diuidi posse, quum praeter
 matura

matura oua, semper minora adsint, futurae demum propagationi destinata. In maioribus astacis marinis, quos etiam disquisiuit Noster, nulla ab his discrepantia. Lapidum cancerorum usum admodum incertum pronunciat et, quod ad nouam crustam inducendam nihil conferant, variis argumentis comprobat, et de regeneratione testae atque chelarum sic disserit, ut aliquam cum polypis et vegetabilibus analogiam intercedere doceat, simulque monstrosas aliquas deprehensas conformationes describat atque depingat.

Haec autem de astaco speciminis loco breuiter declarasse sufficiant, quum ex iis haud aegre possit cognosci, quanta cum attentione partes pro sua cognitione soleat rimari Cl. Auctor. Coloribus autem, quod insignitas proposuit icones, omnibus iis gratam praestitit operam, qui pari sedulitate eius generis corpora naturalia indagant. Pro certo enim affirmare licet, nihil hic ficti et quod naturae non respondeat, fuisse additum. Quodsi vero ex sedula comparatione alii etiam differentias notare non neglexerint, nulli dubitamus, fore, ut in posterum ex varietatum consideratione, quid verum genus efficiat et species genuinas constituat, sit palam futurum. Interim, quo pro valetudinis ratione et huic operi suaeque voluntati satisfacere possit Auctor, optamus.



IV.

• Dissertatio inauguralis, de Cassauae, amarae, Surinamensis, radice, auctore HENR. NICOL. HERBERT, a nobilissima Surinamensis Coloniae societate constituto, nosodochii in Paramaribo et militiae in Surinam medico ordinario. Marburgi, 1753. 4. pl. 3.

p. 3. **S**uam quoque venenorum disquisitio sibi vindicat utilitatem, ut ab iis cognitis cauere nobis queamus melius. Hinc suam, quam in Cassauae amarae radice inquirenda posuit, operam haud perdidit Cl. Auctor. Ipse vero in prooemio pleniorum endemiorum morborum Surinamensium historiam alio tempore se editurum pollicitus, ad ipsam progreditur tractationem, enarratque aliorum de hac radice sententias. GUILIELMVS PISO primus quidem, obscure tamen de venenata, fusc de alimentosa facultate et praeparationibus huius, quam Mandihocam vocat, radicis disseruit. PISONIS verba exscripsit RAIUS. Patres DV TERTRE et LABAT multa compilarunt, at experimentis non comprobata certis. Neque dictionarium uniuersale medicum JAMESII praeter PISONIS verba aliud quid habet. BARRE-RE in descriptione Guyanae, Mandihocae vel Cassauae radicem innoxiam, succum vero expressum animalibus, praecipue iumentis, mortiferum esse scripsit, sed experientia repugnat. Reliqui auctores nihil tradidere noui; hinc de vera indole radicis venenosa altum adhuc est penes scriptores omnes fere silentium *. Suas iam adfert obseruationes Cl. Auctor,

* Optandum quidem fuisset, ut de Cassaua utraque veras et botanicas quasdam notas, quales rei vegetabilis scientia nostris temporibus suggerit, certiores addere voluisset Cl. Auctor, cuius tamen sufficienti disquisi-

Etor, quibus cogitata atque dubia de actionis veneni modo addit, tandemque popularia quaedam dicta adiungit.

P 4

Duae

disquisitione, forte ob librorum etiam in iis, in quibus degebat, terris defectum, destitutus fuit. Haec autem ratio est, ut a Cl. MATY in diario: *Journal britannique pour le mois de Mai et de Juin 1754. à la Haye. 1754. 12.* post breuem illius, quam iam adducimus, disquisitionis, a Cl. HERBERT communicatae per epistolam, recensionem dubitationes quaedam additae fuerint. Notat nimirum Cl. BARRERE dans son *essai de la France équinoxiale* p. 75. exsiccatae radicem sine noxae metu adsumi posse, hinc quaerit, an non exsiccatio idem valere possit, ac expressio? Verum, ni fallimur, expresso etiam succo, residuae adhuc volatiles partes, in corpus humanum ingestae, possunt noxam excitare. Deinde Cl. Auctorem reprehendit, quod veros characteres botanicos plantae suae et differentiam amarae atque dulcis non addiderit, cum inter Auctores nec de nomine imponendo inueniatur consensus. Qua in re utique nos etiam ipsi adstipulamur, in primis cum in patrio solo saepe disquirendi eam plantam ipsi Cl. Auctori data fuerit opportunitas, in exteris locis autem ubertas eam studiose considerandi non detur. En! aliquam diuersorum nominum copiam! Vocatur *Cassava: Arbor succo venenato, radice esculenta* C. B. pin. 512. *Manihot* THEVETI, *Yucca* et *Cassavi* I. B. II. 794. TOVRN. 658. *Hiucca* seu *Mandioca*, ex qua *Cassavi* fit. PARK. Theatr. 1624. *Hiucca* seu *Mizmaitl*. HERNANDEZ Mexic. 378. *Manihot Indorum*, seu *Yucca foliis cannabinis* C. B. pin. 90. PLVK. Almag. 241. t. 205. f. 1. *Manihot* seu *Manyot*. MERIAN. Surinam. 4. fig. 4. 5. *Mambiba* et *Mandiiba* Brasiliensibus, cuius radix *Mandihoca* PIS. et MARCGRAV. 65. *Yucca Brasiliiana* et *americana stellato folio mucronato* MONTING. Aardgew. 663. *Ricinus sariinifera heptaphyllos*, ex cuius radice venenata placentas et panem conficiunt Americani PLVK. Mantiss. 161. *Ricinus americanus pentaphyllos*, radiis foliorum integris, subtus glaucis, *Cassava Barbadosibus dictus* MORIS. H. Oxon. III. 348. *Ricinus minor*, viticis obtuso

- p. 6. Duæ species radicis Mandihocæ seu Cassauæ sunt in Surinam, altera amara, altera dulcis; et præter radicem vix a se differunt. Nam radix amaræ Cassauæ tardius maturescit, ac dulcis; fortior et ingravior eius est odor; cortex multo rudior; radix ipsa grandior et longior, ac dulcis; in hac vero media filamentum quoddam calami crassitiem, in amara id vix cannabis filum aequat. Amaram solum colunt indigenæ: coloni vero dulcem præferunt. Dulcis Cassauæ radix recens et tosta innoxia est, palatoque placet; succus eius itidem: Amaræ autem radix cocta vel cruda comesta, nisi vomitu reddatur, homines et quadrupedia brevi interficit; succus recens crudusque idem efficit, fermentatus vero vel igne coctus *, amissa vi mortifera, addito pipere, euadit condimentum, *Cassirippo* Indis dictum. Volatiles igitur venenum habet particulas, quas ignis et fermentatio auolare facit. Modum operandi veneni experimenta, in animalibus facta, docent. Canis et felis iunior, illico ab adsumto succo conuulsi, post pauca
- p. 8.

obtusis foliis, caule verrucoso, flore pentapetalo albedo, ex cuius radice tuberosa, succo venenato turgida, americani panem conficiunt. SLOANE Jamaic. 41. Hist. I. p. 130 t. 85. Vt alios iam taceamus, quippe cum iam ex his pateat, partim non visam, partim non accurate disquisitam ab adductis viris plantam fuisse. Ex recentioribus solus est LINNAEVS, qui ex datis characteribus Iatrophae generi eam addiderit nominaveritque: *Iatropha foliis palmatis, lobis lanceolatis, integerrimis, laevibus*, Spec. p. 1007. An itaque in externa facie diuersitas? describant, qui viderint.

* Cum itaque igne mutari succi vim corrigique adferat Cl. Auctor, miratur Cl. MARY l. c. quare decem guttae aquae destillatae et quinque rectificatae, eandem virtutem exercere potuerint, ac sexaginta succi. Tentandum fuisset, quid iidem liquores, aequali dosi dati, praestiterint. Id certe efficaciam remedii accuratius determinandi dedisset ansam.

pauca minuta exspirarunt. Felis maior, ab succi drachmis tribus haustis, post vomendi conatus, titubans, conuulsa periit. Canis maior vomitu mox reiecit succum, sed ab hoc infuso iterum post varia symptomata vitam efflauit. In horum cadauerum ventriculis succi eadem quantitas idemque color se exhibuit, nulla adrosio, nulla inflammatio; cetera visa sunt potius conuulsionum effectus, quam veneni. Succus itaque non vi rodente, nec coagulante sanguinem, sed neruis stomachalibus et per consensum ceteris omnibus inimica nocet; id, quod experimenta alia euincunt. Canis ab infuso repetitis vicibus succo, iterumque inter symptomata vehementissima reiecto, sudauit multum, saliuauit, vomuit atque ad se rediit. Canis alius senex ab immixtis aliquot succi unciiis, vomitu iterum reiectis, post conuulsiones vehementiores conualuit. Atque haec repetita sunt saepius in canibus experimenta. Canes post vomitum bene se habuere; feles vero, cum vomere non possent, interiere; saluatae tamen sunt, oleo tepido in os iniecto, adiutoque ita vomitu; id, quod exemplo quodam confirmat Cl. Auctor. Auibus contra omnibus succi magna quantitas nihil nocuit; neque laesit etiam in canibus et hominibus lumbricos, quin potius in nido, qui fuit in succum hunc immixtus, vixerunt plures dies et creuerunt. Succus porro, aeri expositus, nihil amittit virium; fermentatus contra vel coctus haud nocet, immo palato placet nutritque; neque damni quid adfert, si modo mox vomitu reiiciatur. Puer quidam aser comedere coepit radicis tostae frustula, mox conuulsus, terram procubuit; oleo tamen tepido iniecto, iterum vomuit, et a se sensim rediit. Haec et aliis accidere ignorantibus. Praeter haec Cl. Auctor chemicum radicis examen suscepit, atque ex octo libris rasurae recentis radicis destillauerunt liquoris pellucidi graueolentis unciae duodecim. Quarum uncias sex seposuit, reli-

p. 14.

quas sex rectificauit, atque ex his uncias duas obtinuit, reliquo turbido facto liquore. In experimentis factis uterque liquor, et rectificatus et prior fuit mitior, neque tantae virulentiae, ut expressus succus. Vnde colligit in valde volatili parte consistere venenum, mutarique in destillatione ab igne. Tandem de antidoto inueniendo sollicitus, casu detexit illud Cl. Auctor: Nimirum aquam menthae crispae succo illi admiscuit ad praecauendum vomitum, sed nihil haec valuit; huic vero addito sale absinthii *, succus euasit innoxius, immo medicamento instar fuit cani infirmo. Neque mira haec est vis salis absinthii, cum Cl. DE LA CONDAMINE saccharum inuenerit veneni sagittarum antidotum; cuius veneni hic simul mentionem iniicit **, eiusque virulentiae exemplum adfert Cl. HERBERT. Ex his effectus venenatae radice colligit, quos supra in obseruatis iam vidimus.

Constat inde, singulare hoc venenum esse, relatiuum, neque adrodens, neque inflammans, sed solum nervos stomachi et per consensum ceteros omnes male adficiens. At verò obscura est adhuc morborum generis nervosi historia atque curatio; obscura effectuum sympathiae et antipathiae indoles, quorum exempla

* Sal alcalinus autem, quod venenum potenter eneruat, optat Cl. M A T Y scire, numne cum salibus hisce hic succus efferuescat, an lac coagulet, et qualem syrupo violarum tribuat colorem? Porro num salia alcalica fixa et volatilia idem praestent? Tandem, cum Cl. LEMERY et BARRERE *le rocou* antidotum esse dicant, an id veritati respondeat?

** Conf. etiam Comment. nostr. Vol. III. P. I. p. 13. Hinc autem denuo Cl. M A T Y l. c. quaerit, ane hic succus Cassiae compositioni veneni sagittarum admisceatur? Deinde quosnam effectus vulnere immisus praestet? mortemne tunc adferat, an sal absinthii, simul admixtum, praeuertat effectus noxios? Quas quidem quaestiones omnes experientia sola rite resoluet, quae ut addatur ab iis, quibus disquirendi copia datur, utique optamus.

exempla varia hic legimus. Neruorum consensui tribuendi sunt illi effectus omnes; id, quod exemplo croci martis adstringentis illustratur. Ita quoque succus Cassiauae vix ubi attingit stomachi neruulos, mox conuulsiones totius corporis, vegeti antea, immo destructio sequitur. Corpus contra ante pastum p. 19. male se habens, vix accepto cibo, vigorem rursus suscipit. Modus inde operandi cognitu difficilis aequae, ac ipsa curatio. Praestantior fere est Indorum per moxam et acupuncturam curatio empirica, testibus KAEMPFERO, TEN RHYNE, LULLIERIO. Consensum hunc neruorum per plura exempla pergit Cl. Auctor illustrare. Syncopen ab odore corporis cuiusdam ingrato natam, tollit alius odor, priori contrarius. Ipse habitualement epilepsiam curauit ligatura supra genu, neruulique in pedis pollice destructione facta. Hystericarum ventri iniectum vinculum praestat prae aliis remediis, cum uteri nerui male adfecti impediantur in consensum trahere ceteros. De cicuta aquatica GESNERI vi simili in neruos stomachi WEPFERVM et BOERHAAVIUM testes adducit Cl. Auctor. Eiusdem naturae sunt laurocerasus, datura, nux vomica, hyoscyamus. Eadem forte vis est opii, quod dolorem sedat etiam remoti membri, in ventriculo licet adhuc sit, vel vomitu reiciatur; animae vero ecstasin vocare in auxilium est nodum discindere, non soluere. Dicta tandem quaedam popularia adhuc adduntur. Fama enim est venenum hoc distendere ad p. 23. crepaturam usque ventriculum, cui propter ea ligaturam stomachi et abdominis opponunt: sed falsa est fama, ex defunctorum inspectione nata, quorum tumor pendet potius ex humorum putredine, et ex supra obseruatis non patet. Neque vis nutritiua extraordinaria est causa vera venenatae virtutis. Neque medicam foliorum pulueris contra radicis venenum virtutem, quam plures laudant, ullam unquam

quam vidit Cl. Auctor. Porro et dulcis Cassiauae vim letiferam non probauit experientia. Semina Cassiauae etiam frustra dicuntur antidotum. Rasura amarae Cassiauae laudatur externe ut resoluens optimum, sed in scirrho eam absque successu Cl. HERBERT adhibuit.

V.

Historia febris anomalae Batauae, annorum 1746, 1747, 1748, etc. Accedunt monita siphyllica. Auctore IACOBO GRAINGER, M.D. Edinburgi, 1753. 8. pagin. 196 fin. praef. Monita pagin. 34.

Clariss. huius opusculi auctor, non paruam inde meretur laudem, quod ex eo statim tempore, quo medica in castris stipendia mereri coepit, casus obuenientes studiose notandi finem sibi religiose propositum habuerit. Decima tertia enim Anglicarum copiarum legio, per totum illud, ante hos aliquod annos, in quibusdam Germaniae ac inferioris Belgii prouinciis, gestum bellum, ipsius curae tradita fuit. In praefatione quoque, hunc librum iam ante hos tres annos exaratum exactumque, et eundem a primis in arte medica viris impressione dignum iudicatum, se vero grauibus negotiis implicatum a citiore publicatione impeditum fuisse monet, seque ea, quae in dicta decima tertia legione per annos 1746-1749 (priorum enim annorum obseruationes inter Gandauis spolia perdidit) obseruauerit, quaeque Cl. PRINGLE* aut latuerint, aut ab ipso ob instituti breuitatem praetermissa fuerint, descripturum esse pollicetur. Totum opus in tres partes diuisum deprehendimus.

Prima

* Conf. quae de eius peregregio libro, cuius etiam germanica versio Altenburgi 1754 prodiit, in Comment. nostr. Vol. II. Part. III. p. 393 seq. diximus.

Prima harum partium quinque capitibus absoluitur, in quorum tribus prioribus febrem istam satis luculenter describit, nullam tamen eius diagnosin dari conqueritur, atque inter alia dira huius febris symptomata refert, uxorem cuiusdam praefecti anno p. 30. 1748 post aliquot huius morbi violentas accessiones tantum tamque immanem, somnum impediens, labri superioris pruritum cum rubore et cutis fissuris aridis, nullo vero tumore coniunctum inuasisse, ut post varia alterantia, lacticia, epispastica, ptyalimum et sexcenta alia externa internaque incassum adhibita, non nisi libra semis aquae marinae omni mane ieiuno ventriculo epota mitigari, et setaceo in occipitio inciso perque anni spatium unguentis idoneis digesto, anno demum 1752 profligari potuerit. Ad p. 48. iecta tabula incrementum et diminutionem febris anno 1748 a die decimo tertio iulii styli veteris, quo triginta quatuor aegrotarunt ad diem vicesimum secundum nouembris, quo Heluoeti nauem cum nouendecim residuis aegrotis conscendit, singulis hebdomadibus sistit. Velocissimum incrementum a die vicesimo usque ad vicesimum septimum iulii, in quo numerus aegrotorum a quadraginta duobus ad octoginta sex ascendit, obseruamus, die tricesimo primo augusti ad centum et triginta quinque peruenit, ex quo tempore sensim rursus decreuit.

Secunda huius libri pars duodecim capitibus absoluitur et totam morbi huius curationem una cum prophylaxi continet. Illa quidem parum a Cl. PRINGLE commendata lectoribusque nostris cognita methodo abludit, et in larga repetitaque absque dierum indicio instituta venae sectione, vel si fractae vires hanc vetent, hirudinum applicatione, in emesi, catharsi, epispasticis, cortice peruuiano etc. consistit, varias tamen easque ab illo diuersas sententias fouet. Sic vomitorium horroris tempore exhibet, eodem p. 73. que paroxysmum saepe profligatum esse asserit. In
ea

ea ventriculi debilitate, qua potiones praesertim tepidas fastidiosus reiicit, inter alia corporis situm erectum, et ad syncopen, quae hinc oriri solet, arcendam, salia volatilia naribus admouenda commendat. Miris quoque laudibus aquam frigidissimam cochlearum eius modi affectis sitientibus datam extollit, variisque aliorum medicorum testimoniis sententiam suam

p. 94. confirmare annititur. Eandem tamen in febrili paroxysmo bibendam non suadet, et sudorem nimium liquoribus egelidis, subacidis, indusiis ficcis, nitidis, frictione, surrectione e lecto quotidiana, corporis-

p. 104. que exercitio arcendum esse monet. Cortici peruviano se in tabe dorsali nullum remedii genus acquirandum inuenisse, eodemque se epilepticum etiam

p. 127. curasse asserit. Bolum: Rec. Turpet. mineral. gran. duo, Scammon. gran. quatuor, Camphor. scrup. semissem, M. mane datum in pectoris hydrope, qui interdum aequae ac alia hydropis genera has febres insequantur, potenter aluum ducentem, vel urinae vel sudoris quantitatem augmentem cum leuamine insigni, nunquam inde orto vomitu, notavit; nimis frequentem tamen huius boli repetitionem ideo vitandam esse monet, ne ptialismus, in quem morbis hydropicis laborantes admodum proni sint, inde cieatur. Amara in vino vel spiritu iuniperi cum tartaro vitriolato huius curationem accelerare, porro scribit.

p. 140. Tertia tandem huius opusculi pars viginti continet casus satis notabiles secundum ea, quae in secunda parte proposuit curationis praecepta tractatos, qui omnes ultimo excepto euaserunt.

p. 1. In monitis sphylicis de modo excitandi ptialismus, et morbis inde pendentibus, quae ob grauia quaedam obseruata tironibus saltem haud vulgo nota recudi curauit, sic versatur, ut primo disquirat, in quibusnam subiectis saluatio locum habere possit, variisque dein breuiter discussis sputationem excitandi methodis, suam parcae inunctionis methodum commendat;

mendet, salivationis incipientis progredientisque symptomata describat, noxas, ab excessu caloris frigorisque salivantium cubiculi oriundas, memoret, illudque ultra sexaginta thermometri Fahrenheitiani gradum non calefieri debere moneat, et paucis de salivantium regimine monitis, superuenientia iisdem, eaque interdum satis graua et funesta symptomata una cum eorum praecautione et medela ostendat, tandemque saluatione rite peracta, se militem saepe pollicis dimidio, mane etiam, longitudine solenni breuiorem inuenisse asserat. De reliquo vero nec in hisce monitis, nec in febris anomaliae pertractione aliquid noui deprehendimus; et licet ii non simus, qui aliorum laudi quicquam detrahere studeant, non possumus tamen, quin fateamur, nos, post Cl. PRINGLE et ASTRUC labores, hoc libro facile carere potuisse; dictio quoque nec pura, nec genio latinae linguae satis accommodata, quin imo ne a vitiis quidem grammaticalibus prorsus libera deprehenditur.



VI.

A Treatise of the Scurvy. In three Parts; containing an inquiry into the Nature, Causes, and Cure, of that Disease. Together with a Critical and Chronological View of what has been published on the subject. By JAMES LIND, M. D. Fellow of the Royal College of Physicians in Edinburgh. Edinburgh: printed by Sands, Murray and Cochran: for A. Millar, 1753, 8. mai. pagg. 456. praef. pagg. 16.

hoc est:

De scorbuto liber, in tres partes diuisus, eiusque morbi naturae, causarum atque curationis inuestigationem continens. Accedit auctorum, qui de eo scripserunt, criticus index atque chronologicus. Auctore JACOBO LIND.

Quo aliquis morbus solet esse magis corruptus vel certe complicatus, eo difficilior is quoque erit diiudicatu, eoque magis in explicanda eius natura dissentire solent medici. Quae dicta, si umquam de corporis aliqua valent aegritudine, de scorbuto certiora sunt quam certissima. Praeter id enim, quod omnes fere morbos, quorum indolem vel declarare nequeunt vel interdum quoque nolunt, eo nomine insignire non raro solent medicorum aliqui, ipsa quoque vera eius natura, licet multum de ea scriptum fuerit, adeo detecta nondum est, ut amplius de illa dubitari non possit. Dirus interim ille morbus insignem hominum, in primis nauticorum et qui ad maris degunt littora, coxiam e medio tollit, adeo ut in ultimo, Anglos inter Gallos atque Hispanos exorto, bello illius vi plures, quam unitis hostium

stium viribus, cecidisse Cl. Auctor asserat. Qua re commotus, ut modum, quo is ipse eiusque funesti euentus possint praeuerti, doceret, paulo accuratius in detegendam veram eius indolem inquisiuit, recentiorum in primis auctorum studio, qui de eo fidas annotarunt obseruationes, quales potissimum in relatione itineris, ab Ill. ANSON circa terrarum orbem facti, a Cl. WALTER conscripta continentur, aliorumque praesertim chirurgorum, in regis nauibus olim stipendia meritorum, et ex his Cll. IVES et MYRRAY practicis obseruationibus cum ipso communicatis, suaque tandem, quum ipse olim in nauibus officio chirurgi functus fuerit, experientia adiutus. Ita vero totum hoc pertractauit argumentum, ut in *prima libri parte* eiusque quatuor capitibus praecipuas, a variis huc usque auctoribus conscriptas, morbi huius historias, diuisiones atque distinctiones critice enarraret, errores circa haec omnia ab iis commissos indigitando; porro ut in *secunda eius parte*, octo capitibus, veras eius morbi causas, ex ipsis in terra marique captis obseruationibus erutas, cum signis eius diagnosticis atque prognosticis, prophylaxi, cura, theoria, iis insuper, quae in cadaueribus eo morbo defunctorum obseruata fuere, tandemque symptomatum explicatione inde deducta proponeret. In *tertia* denique libri *parte* bibliothecam quasi exhibet scorbuticam dicendam, in qua nimirum vix non omnes a veteribus ad recentissimos usque auctores, qui de scorbutico scripserunt, ad temporis ordinem recenset, scriptorum eorum epitome extracta et sedulo exarata. Optimam omnino hanc esse viam, integrum aliquod exhaustiendi argumentum, cuius facile patebit. Eandem quoque methodum in libro suo *de morbis venereis* secutum fuisse Cl. ASTRUC, inter omnes constat; nec eum quoque hac in re imitari voluisse Noster negat.

p. I.

Primi, qui ex instituto scripserunt de scorbuto, auctores, RONSSEVS, ECHTHIVS atque WIERVS, non accuratam solum ipsius morbi descriptionem, sed et remediorum, quae vere antiscorbutica dici merentur, notitiam exhibuere. Quamuis etiam WIERVS multa depromserit ex ECHTHIO, varia tamen quoque noua atque certiora, quam hic, proposuit: omni itaque iure illam, quam consecutus fuerat, increbatur laudem, ita, ut eius *de scorbuto* dissertatio, *medicis* ipsius *observationibus* inserta, primas inter omnes tueretur partes et ab omnibus fere subsequenter auctoribus tantum exscriberetur ad EVGALENI usque tempora sub initium superioris seculi, quippe qui, quum numerosissimam exerceret praxin, ipsiusque tempore quam latissime diffusus iam esset iste morbus, et, quod primo loco monendum erat, magnam in semet ipso suaque morbos dignoscendi peritia collocaret fiduciam, eamque de se praedicandi haud intermitteret occasionem, libro suo satis inter omnes cognito, *de morbo scorbuto*, tantam adeptus fuit famam, ut is non saepe solum recuderetur, sed a summis in arte viris ad nostra usque tempora optime de hoc argumento scriptus haberetur. Sed an iure? statim

p. IO.

apparebit. Morbi vim iam antea longe praegressam esse posse existimat, quam incerta eius ac aequivoca, quae talia nimirum esse putat, signa, languor scilicet et singularis grauitatis sensatio, appareant; quae remota tamen et incipientis modo valetudinis huius esse signa, omnes alii auctores affirmant. Ea deinde, quae in plerisque aegris non, nisi ultima, et ad *anxum* perducti morbi esse constat symptomata, v. c. hydropem, atrophiam, inter prima eius ac sine ceteris, essentialibus dicendis, scorbuti symptomatibus refert. Alia porro vere huic morbo propria, ita, ut longe aliter se habuerint, ac ab aliis obseruata fuere, v. c. ulcera, dyspnoeam, describit. Talia denique, quae a scorbuti indole prorsus esse solent aliena, cancerum, bubones,

bubones, ulcera penis, e. f. p. ad eum tamen refert. Admodum itaque veri simile esse inde patet, in in-p. 14. signes errores semet ipsum deduxisse bonum illum virum. Pone enim, scorbutum plane aliam tum temporis induxisse faciem, aliquam tamen quisque largietur intercedere debere conuenientiam inter vera ac alias nota scorbuti symptomata, et inter ea, quae ad eum retulit EVGALENVS. At quatenus sunt pathognomonica eius signa, ab hoc auctore talia habita? Pulsus et urina, suo modo mutata, talia quippe signa, quae ab omnibus aliis auctoribus fallacissima hoc in morbo dicta sunt. Reliqua etiam, quae adducit, aut prorsus aliis morbis conueniunt, aut cum ipso scorbuto non semper esse solent *συγγενοα*. Ex quibus omnibus certo colligi debere Cl. Auctor p. 18. arbitratur, prorsus aliud morborum genus sub scorbuti nomine illum delineasse; idque magis adhuc apparere ex illa, quam is ipse dederit, generalissima regula diagnostica: sub omnibus nimirum iis morbis latere scorbutum, *qui vel occurrat rarus, vel etiam p. 20. veteribus cognitus, sed aliis et diuersis atque plurimum ab eorum descriptione discedentibus signis*; illudque insuper assertum eo certius fieri perpendenti, de affectibus hystericis, hypochondriacis, neruosis, rheumatismo; rachitide aliisque, iis nempe omnibus, de quibus veteres haud frequentem obseruandi habuerint occasionem, illum quoque ipsum vel nihil, vel valde parum habuisse cognitum. Longe adhuc fusior est Noster in examinandis illius auctoris sententiis, ut principis inter eos habitus, qui de scorbuto scripserunt; qua in re tamen ulterius eum sequi velle, recensionis limites vetant. Mirum interim omnino esse Cl. Auctori facile concedimus, qui fieri potuerit, ut tam perspicaces viri, quam caeteroquin fuere, SENNERTVS, MARTINI, HORSTIVS, LISTER, alique fere omnes ad nostrum usque aeuum viuentes, illius opinionibus adeo lubenter subscriberent

adeoque secure, ut multi librum eius verbatim fere exscriberent.

- p. 32. Nec EVGALENO tamen multo maiorem meruisse laudem Nostro videtur WILLISIVS, licet post illum maximi semper aestimatus, quem CHARLETON in primis, uti et in scorbuti symptomatum distributione HOFFMANN, ac in eius diuisione in calidum et frigidum BOERHAAVE, secuti fuere. Fieri enim haud poterat, quin, omnibus, quorum indoles videbatur esse noua, ad scorbuti genus relatis morbis, tanta tum explicandorum symptomatum, tum adhibendorum, quae post unum ab altero commendata fuerant, remediorum esset confusio, ut variis, in quas dispecerent hoc proteiforme ipsis visum malum, excogitandis studerent diuisionibus, quae tam diuersae erant, quam diuersas varii auctores artis suae inuenerant theorias galenicas, chemicas, mechanicas; in scorbutum scilicet frigidum aut calidum, acidum aut alcalicum, aut, pro vario acrimoniarum genere praedominante, varie quoque acrem; quas vero omnes diuisiones ipsi experientiae contrarias esse, Cl. Auctor declarat.
- p. 61. Idem deinde fert iudicium de illa scorbuti distinctione, quam auctores non nulli fecerunt in maritimum atque terrestrem. Is enim, siue in mari, siue terrarum aliqua parte, saeuat, una eademque semper habet signa pathognomica; unas easdemque, ex quibus oritur, causas; unam denique eandemque curandi rationem poscit. Cur illa igitur admittenda sit diuisio, non liquet. Vsu quidem ab aliquibus receptum fuit, certos quosdam morbos, purpurae v. c. quoddam genus, ulcera sanatu difficiliora, ac fere omnes, quorum causae atque natura nondum satis innotuerunt, sub scorbuticorum nomine comprehendere; sed, quanto inde orto damno, tum respectu tironum, tum aliorum quoque virorum iam exerci-
- tato-

tatorum, tum ipsius faciendae artis eiusque augmenti, Cl. Auctor probe notat.

In ultimo tandem huius partis capite quaestiones p. 78. illas dirimit: num inter connatos, hereditarios aut contagiosos, morbos referri debeat scorbutus? Omnem tamen, caute atque attente institutam, experientiam contra istas assumendas opiniones pugnare; sique morbus aliquando fuerit numerosior, a communibus tantum causis, minime autem a contagio, prouenisse epidemiam, satis clare docet.

Ad alteram libri nunc partem progredimur, in p. 83. cuius capite primo verae scorbuti causae ex observationibus in terra marique factis, eruuntur. Ante vero, quam certi aliquid de illis asseritur, de iis merito agitur, quae falso a non nullis auctoribus in verarum classe positae fuerunt; quarum prima esse dicitur p. 86. abusus salis marini, in victu ab hominibus nauticis adhibiti, unde *muriatici* quoque scorbuti nomen prouenerit. Illud autem, per se tantum consideratum, hac quidem in re insons esse, inde apparet, quod aqua marina non solum felici cum successu contra alios morbos, scabiem et mala in primis crurum ulcera, per integri mensis spatium a Cl. Auctore fuerit adhibita sine aliquo scorbuticae indolis phaenomeno; sed eadem etiam, experimenti causa, duobus aegris vere scorbuticis per dimidium mensem data, morbum, non mitiorem quidem, certe tamen nec vehementiorem reddiderit. Inde vero non sequi simul monet, victum sale induratum omni plane modo innocentem esse; in eo potius ipsum sal cum oleo animali intime ac adeo misceri, ut a corporis viribus digerentibus inde explicari, ipseque victus, difficillime digerendus, lene atque bonum corpori alendo praebere nequeat nutrimentum.

Alii porro existimarunt, sine vegetabilium usu p. 89. hominum sanitatem diu saluam esse non posse; ideoque defectum eius in nauibus solam scorbuti esse cau-

sam: attamen, licet ille occasionalibus ac praedisponentibus causis annumerari possit, sine vegetabilium esu tamen scorbutum quoque abesse posse; et contra in nauibus, ante breue tantum tempus in mare demissis, vehementissime tamen saeuisse, experientia probauit.

P. 94. Alii peculiare aliquid, illud demum quidquid sit, in clauso atque corrupto naus aere, aquam potissimum in infima naus parte stagnantem, pro unica causa assumserunt. Cur autem fabri lignarii, alique operam in ista naus parte facientes, reliquis non citius neque vehementius corripuntur scorbutis? Eadem est ratio aeris ab hominum multitudine sua elasticitate orbati. Febres inde quidem malignae, contagiosae; at non adeo facile, certe non immediate, scorbutus, oriri obseruantur. Quid? Quod in ipso aere naus impuro scorbutum curari posse, experientia testatur.

P. 100. Alii insuper aerem per effluuia e mari exhalantia ita mutari credunt, ut nautae inde aegrotent, usque dum peruenerint in terram. Cur autem in medio terrarum orbe continenti, v. c. in Hungaria per ultimum ibi gestum bellum, tantam stragem fecit scorbutus? Quamuis negari nequeat, ipsum aerem marinum certa ad gignendum scorbutum indole praeditum esse.

P. 107. Scire enim licet, principem inter omnes praedisponentes * scorbuti causas aerem esse nimis ac diu valde humidum, iis potissimum hominibus infensum, qui a praegresso morbo adhuc languent, aut qui

* Praedisponentes, quas vocant pathologiae doctores, causas cum procatactis seu occasionalibus proximis, quoad denominationem, saepe confundere Cl. Auctorem, facile quidem patet; quum illae in corpore iam praexistant, idque suscipiendo alicui morbo aptum reddant; hae vero tantum accedant illi generando: sed verborum usus cuilibet esse poterit liber.

qui nimiae corporis quieti, aut tristibus diu inhaerent imaginationibus aliisque animi cogitatis hunc ipsum afficientibus; id, quod omnes fidae comprobant observationes. Quam innumeris fere in casibus, et quam saepe longum per tempus in maxime udo aere saepiusque in ipsis tere aquarum undis degere debeant homines nautici infimi in primis ordinis, admodum viuis, ut ita loquamur, Cl. Auctor describit coloribus. En causa, cur in mari vehementius ut plurimum saeuat hicce morbus, quam terra!

Cui deinde quoque accedit frigus, altera ex eius p. 111. praedisponentibus causis. Hinc ille quoque grauior esse solet hiemis, quam tempore aestatis; in frigidior, quam calidior climate.

Quibus porro causis omnino recentium vegetabilium inopia, et contra durus iste difficilisque concoctu victus, optimo quidem iure, ita tamen, annumerari debent, ut ne solae tantum eae, sed, respectu infirmati iam ab illis potioribus causis virium roboris, tales seu potius mere occasionales haberi debeant. Siccus enim atque durus ille victus duris nautarum laboribus admodum conuenit; ab aliis vero, quorum vires quacunque demum causa iam fractae sunt, digeri nequit, sed ansam dat crudis generandis humoribus. Ne quid iam de corruptione aquarum, aliarumque rerum ad victum nauticum pertinentium haud raro accidente, de potus spirituosius abusu, uti et de animi affectibus, nunc dicatur.

Hisce igitur iam enarratis causis omnibus in ter-p. 128. rarum quoque variis partibus non numquam concurrentibus, facile patet, qua ratione in his etiam oriri queat iste morbus.

Sub huius tandem capitis finem diuersarum illarum causarum diuersos effectus, mitiores aut grauiiores, pro vario tum illarum gradu atque concursu, tum aliarum, quae in reliquo vitae genere occurrere solent, rerum circumstantium varia indole, Cl. Auctor exponit.

- p. 147. In *secundo* deinde *capite diagnostica* scorbuti *signa* secundum ordinem, quo ut plurimum procedere solent, enarrat. Ab eius initio naturalis faciei color mutatur in pallidum aut luridum; eaque ipsa intumescit, aeger autem deses fit, et ab omni laborum genere abhorret: labia et caruncula lacrymalis viridescentem nanciscuntur colorem; quae tamen omnia symptomata imminentem saltem praenunciant scorbutum; aegro nimirum, praeter insolitam ignaviam, sano adhuc viso, cibum potumque appetente. Non nullis tamen non prius, quam morbus iam diutius inhaeserit, facies mutatur, quae deinde magis lurida fit; animo simul valde deiecto. Ista tum pigritia in uniuersalem corporis abit lassitudinem; sub quolibet corporis motu genua rigida quasi ac infirma sunt; respiratio autem anhelosa; quod utrumque symptoma aegros vix non semper comitatur. Paulo post pruriunt gingivae, tument, post lenissimam frictionem emittunt sanguinem, ex liuido rubrae, molles, spongiosae tandemque valde putridae fiunt atque fungosae, cum anima vehementer foetente. Pathognomicum illud habetur signum. Nec e gingivis solum manat cruor, sed ex aliis quoque corporis partibus
- p. 150. prorumpit. Cutis per totum morbi decursum sicca apparet; quando autem ad extrema ventum est, lipothymiis praesertim accedentibus, frigido et viscoso madore squalida fit; in non nullis quidem, in primis qui febricant, aspera, in plerisque vero laevis atque splendens, maculis subrubris, liuidis et nigricantibus obsessa, qualis esse solet in sugillatis membris, ipsi cutis superficiei aequalibus, ad lentis magnitudinem ab initio, deinde ad manus ambitum latis, in corporis extremitatibus eiusque saepe trunco, in facie autem atque capite raro conspicuis. Non paucis aegris intumescunt crura, tumor autem non adeo facile, ac in oedemate, digito prementi cedit, foveis tamen impressis diutius permanentibus. En symptomata essentialia

essentialia reliquisque constantiora in primo scorbuti gradu! Paucis addamus illis adhuc reliqua:

De ulceribus vere scorbuticis notamus tantum, p. 152. quod potissimum valde putrida, sanguinolenta et fungosa sint, omnium fere applicatorum remedium vim eludentia. Ne tali aegro propines mercurialia, praesertim cauto! Alii morbi, quibus antea p. 157. hi aegri fuerunt correpti, facile nunc redeunt, vel, si praesentes adhuc sint, exacerbantur. Iis quoque, qui epidemice grassantur, facilius obnoxii fiunt scorbutici. Vti peccus in genere semper afficitur ab hoc p. 157. morbo, praesertim si alius clausa sit; sic et dolores vagi, in modum pleuritidis spuriae illud saepius affligunt atque opprimunt. Caput raro dolet; nec febres, quae non numquam superueniunt, nisi ad accidentalialia eius pertinere videntur symptomata; ex quibus tamen omnibus, si accidant, dirissima esse solet petechialis et ista a carceribus dicta. Aluus ut plurimum solet variare, in aliis modo naturalis; modo valde adstricta; in aliis vero et iis plerisque per vices obseruatur esse fusa, ac male olens. Vrina quoque varia est; cito putrescit, sique reponatur, oleosam, salinam et spumosam acquirit superficiem. Pulsus, nisi febris accesserit, solito ut plurimum solet esse tardior atque debilior. Haec de primo morbi stadio sufficiant.

In altero facilis membrorum usus magis magis p. 162. que perit. Poples tumet, dolet, musculis flexoribus contractis ac fere rigidis factis; singularis languoris sensus frequenter accedit, ita ut aegri, diu requiescentes, sub lenissimo corporis motu linquntur animo, vel etiam subito expirent. Tumor insignis atque ecchymoses occupant crura, omniaque haemorrhagiarum genera aegri vires exhauriunt ac eos saepe tollunt. Gingivarum ulcera pessima fiunt, fungosa, gangraenosa. Dentes cadunt; ipsas vero maxillas raro exest caries, quae nec alia ossa facile solet pre-

hendere. Attamen vel in dirissimo hoc statu et appetitus et sensus ut plurimum vigent.

p. 166. Tertius tandem ac ultimus status, praeter omnia iam recensita symptomata, alia adhuc extraordinaria dicenda nobis sistit. Ulcera olim curata recrudescent. Crura nunc sponte sua fiunt ulcerosa: Quibusdam aegris, licet non adeo frequenter, febris superuenit petechialis: Sanguinis profluvia nunc ubiuis prorumpunt: Icterus, hydrops, melancholia confirmata, neruorum rigor, pectoris angustia summa, dolor sub sterno, alique sexcenti accedunt morbi tristissimi. Non nulli aegri laboriosissimam quidem, eam tamen sine dolore, experiuntur respirationem subitoque vitam emittunt. Finit hoc caput Cl. Auctor variis enarratis morbi huius historiis, iam dicta illustrantibus.

p. 175. In *tertio* dein *capite prognostica signa* exhibet; quem in finem, ut ea intelligantur eo melius, omnem hunc morbum in duas classes diuidit; unam, qua homines antea sani, quales esse solent nautae, ab externis tantum atque occasionalibus causis in eum incidunt; alteram, qua homines debiles, in terra potissimum degentes, pro varia corporis sui dispositione a leuioribus illis causis eo afficiuntur. In priore casu aduentitium seu artificialem quasi dicendum, in altero autem naturalem vel potius a corporis constitutione nominandum, *constitutional*, appellare vult scorbutum. Vnus idemque morbus quidem erit et eiusdem quoque curationis; interim prognostica signa

p. 177. prius eius genus praecipue respiciunt. Ex iis haec sunt primaria: A sui initio, etiamsi valde afficiantur gingivae, satis adhuc facile et sine recentium vegetabilium usu, tollitur morbus, dummodo corporis exercitiis par sit aeger: quodsi vero lecto affixus, corpus mouere amplius nequeat, alterque iam adsit valetudinis gradus, sine vegetabilibus curationi nullus supererit locus. In mari autem, ubi vegetabilia
saepe

saepe non sunt ad manus, prognosis difficilis est. Malo enim pessimo nondum viso, periculosa tamen non raro et praeter omnem opinionem accedunt symptomata. Clauso tamen putridoque aeri adscribendum esse videtur, quod tales interdum aegri, simul ac aliquem motum exercere velint, aut aeri exponantur, subito tollantur e medio *. Si alui laxitas cutisque mollities et humiditas sequantur vegetabilium usum, certa spes erit; praesertim si corporis motum ac aerem aegri ferre possint: genuum vero rigor curationem respuit, morbo caeteroquin abacto. Scorbutica dysenteria, aut pectoris vitia, omnium difficillime expugnantur. Inueteratus morbus tabe non raro finitur. Si varia hydropis genera affligerint aegrum, is, licet sanitati restitutus, rheumatismo artuumque doloribus atque rigori, per reliquum vitae tempus facile fit obnoxius. Gingivarum nimis aut exesarum aut laxarum saepe remanere vitia, Cl. M V R R A Y annotavit.

In *quarto capite prophylaxis, seu morbum hunc* p. 180. *praesertim in mari praecauendi adminicula*, proponuntur. In terra ei facile praeripitur nascendi occasio; aere nempe calido, sicco atque puro, victuque tum vegetabili tum animali, concoctu facili; quae artis regula pro vario incolarum vitae genere moderanda erit et applicanda. In mari autem omnis haec p. 183. res altioris esse solet indaginis. Multa igitur et excogitata et commendata fuerunt eum in finem remedia **; quum saepius autem exoptatus successus non subse-

* Magna satis veri specie internis haemorrhagiis, a tabe factis visceribus ortis, hanc improuisam mortem tribuit Ill. VAN SWIETEN. v. Ei. Comment. in H. BOERHAAVI aphorismos. Tom. III. p. 608.

** Pag. 183. narrat Cl. Auctor, quendam olim virum, natione germanum, et in insula *Sumatra* summam rerum tenentem, ea spe fretum, ut chemicis remediis praeveniri posset ille morbus, *Lipsiae* in nostra hac uniuer-

subsecutus fuerit, inde factum fuit, ut omnem prae-
cauendi hunc morbum spem multi abiicerent. Sed
p. 186. immerito. Tum enim aut sero nimis sua in usum
vocarunt antidota, tum suis potius opinionibus, quam
experientia, ducti, varia remedia commendarunt.
Verum enim vero auerti posse morbum, eius non
indoles solum probat, quod nimirum sit aduentitius,
siue a causis externis oriundus, quae vel euitari vel
mutari certe possunt; sed ab ipsa etiam confirmatur
experientia, quum in variis Americae septentriona-
lis partibus iam haud obseruetur scorbutus, ubi olim
fere endemius fuit.

p. 191. Primo loco ex variis, studiose eam ob causam
captis, quae hic enarrat Cl. Auctor, tentaminibus,
in-

uniuersitate ciuem suum, celeberrimum sui tempo-
ris medicum, MICHAEL, suis sumtibus constituen-
dum curasse chemiae professorem; sua tamen spe ex-
cidisse, licet hic indefesso studio multa eum in finem
excogitasset medicamenta; eumque porro primum
omnium in Europa fuisse chemiae professorem, af-
firmat quidem; qua vero historica fide fultus, simul
non adducit. Sed in errorem se deduci passus est Cl.
Auctor. IOAN. HARTMANN enim primus in Eu-
ropa publice chemiam docere iussus fuit in acade-
mia Hassiaca, quae floret adhuc *Marburgi*, et Pro-
fessoris ideo exornatus titulo anno superioris seculi
nono; qui vero ipse dein ex hac vita discessit anno
illius seculi tricesimo. Vide sis eius Opera Franco-
furti ad Moenum 1684 in folio edita, et in iis ora-
tionem eius *de philosopho seu naturae consulto medico*.
IOAN. MICHAEL vero, quem a Cl. Auctore sub-
intelligi putamus, anno superioris seculi sexagesimo
septimo Lipsiae obiit Professor Therapiae dictus.
Num antea Chemiae Professor fuerit, nos ipsos igno-
rare quidem fatemur; ab illo autem Batauorum co-
lonorum duce talem certe constitutum fuisse valde
dubitamus, quum publicorum munerum habenda cu-
ra ad principis iura pertineat. Forsitan Noster MI-
CHAEL opibus ab illo viro fuit adiutus, ut eo ala-
crius atque felicius in rem adeo utilem inueniendam
inquirere posset.

interne poma in primis aurantia atque limonia largiter comedenda, externe vero ad gingivas elixirium vitrioli et acetum vini, utrumque in gargarismis adhibendum, tum sua, tum aliorum, quos citat, experientia doctus, commendat. Quod si quis etiam oggerat, illa poma ab aliis interdum sine exoptato fructu fuisse adhibita, is quoque scire debet, alios saepe morbos sub scorbuti nomine fuisse comprehensos, hancque ideo in contrarium adductam experientiam sublestaе omnino esse fidei.

Quum illa vero poma spontaneae corruptioni sint p. 207. obnoxia, nec semper, neque in quouis loco acquiri possint: hinc, quo vires eorum cogi et per multos annos conseruari queant, huncce proponit modum: Vt succus nimirum ex iis expressus, per filtrum transiiciendo clarus redditus, in vas purum, terreum, vitrea crusta bene obductum et euaporationis operationi aptissimum, infundatur, hoc deinde vas in aliud aqua plenum intromittatur, idque super igne viuo per aliquot horas ponatur, ut aqua bulliat, donec ad olei, dum adhuc caleat, vel ad syrupi, postquam refrixerit, consistentiam redactus fuerit ille pomorum succus, in ampulla post bene obturata reponendus. Quatuor et viginti poma aurantia, quinque librarum pondus ad quatuor uncias excedentia, depurati succi unam libram et nouem uncias semis; spissi vero illius facti quinque uncias, suppeditarunt, quod extractum vix trium aquae unciarum aequat volumen; ideoque integrae vires sat insignis pomorum copiae in vasculo mediocris magnitudinis per aliquot annos asseruari poterunt.

Ad naturalem huic extracto conciliandam fragrantiam paucae quidem vel essentiae, vel olei eorum corticum guttulae addi possunt: fini tamen suo conuenientius ac aequè gratum esse videtur, sub euaporationis finem paulo antea, quam ab igne remouetur vas, paruam externi corticis partem ipsi succo adiace-

adiicere. Quae medicina suo tempore satis modico paranda pretio, cum variis inter homines in primis nauticos usitatis spiritus generibus, *rum*, *arrack*, cet. misceri, simulque hunc potum saepe per se noxium non corrigere solum, sed et in medicinae genus, scorbuto optime resistentis, immutare potest.

p. 213. Aliorum quoque multorum vegetabilium, baccarum, herbarum atque radicum copia per longum tempus satis bene in nauibus asservari poterit, dummodo penitus sicca, in vasis bene clausis, ab omni

p. 217. aeris atque humiditatis accessu arceantur. Omnes fere etiam liquores fermentatione parati, sub nomine *cyder* cogniti, aliaque potus genera ex vino aut cerevisia fermentescentibus cum baccis ribium, sambuci, e. f. p. praecipue autem cum abietis cuiuscunque summitatibus, conis, foliis, quin et cortice et ligno, e. f. p. prodesse, per experientiam constat.

p. 223. Aegros, vel qui certe a superato morbo valde debiles adhuc sunt, reliquis facilius scorbuto corripi posse, supra iam monuimus. Itaque regulas non incognitas quidem, at rite expositas, ex quibus illorum cura haberi debeat, Cl. Auctor proponit, ut nimirum iis victum porrigi debili eorum corporis statui convenientem, et pro ratione virium corpus quotidie mouere eos iubeat.

p. 228. Ultima tandem harum animaduersionum classis concernit modum, quo causae huius morbi externae, aeris, victus, potusque facta corruptio, corrigi, vel, quantum fieri potest, auerti queant; quas tamen singulas recensere non possumus; aliqua saltem nunc

p. 240. dicturi *de cura morbi eiusque symptomatum*, in quinto capite proposita.

Optima in genere dicenda, scorbuto medendi methodus est illa, quam in praecedenti iam capite exposuimus. Morbus in primis aduentitius, nec diu iam praesens sola mutatione aeris, victuque leui ex

recen-

recentibus potissimum vegetabilibus ac herbis illis factis cognitis antiscorbuticis dictis confectus, sine ullo fere medicamentorum usu, saepe expugnari observatus fuit. Pone autem, altiores iam morbum egisse p. 244. radices, quid tum erit agendum? Prima medenti esto regula, ut omnes corporis se- et excretiones iuuet, scorbuticamque acrimoniam et debito victu et aptis remediis obtundat atque emendet. Quem in finem serum lactis praesertim caprilli, cui sal polychrestum, ut diureticum et aluum laxans remedium, addi potest, commendatur. Succum porro ex herbis p. 246. antiscorbuticis acrioribus, ut et saponaceis, dente leonis, fumaria, tritici progerminante segete expressi, cum illo pomorum aurantiorum Hispanicorum mixti, quibus etiam saccharum lactis adiaci potest, per omnem diem hausti iuuabunt, sudore simul bis aut ter in singula hebdomade post illorum usum prolicito. Nisi haemorrhagiae metus sit, balnea calida ex herbis aromaticis parata, optimi erunt usus.

Symptomata, quae urgent, singularem quoque p. 248. curam poscunt. Os internum seruetur purum gargarismis ex hordei decocto, melle rosato et acidis mineralibus: Fungus, si necesse fuerit, praescindatur: Altis autem ulceribus applicetur oleum vitrioli vel per se, vel quoque dilutum: Crurum oedemati p. 250. conuenit lenis frictio cum pannis paulo asperioribus fumoque ex aromaticis gummatibus medicatis, et leniter applicata fascia; illis vero rigidis factis et dolentibus fons ex aqua calida cum pauca aceti aut salis ammoniaci adiecta quantitate, et deinde oleum palmae inunctum. Eadem fere est cura ulcerum, per lenem compressionem et remedia antiseptica, praestanda: Sanguinis profluvia, quae minantur periculum, acida mineralia, parca semel dosi, sed crebrius data, corticem peruianum et vinum rubrum exposcunt.

Omnium,

- p. 253. Omnium, quae accidere possunt, symptomatum et periculossissima et pertinacissima, iam enarratis remediis obedire saepe nescia, sunt dysenteria et pectoris affectus cum tussi violenta, difficili, anxia et dolorosa respiratione coniunctus. Alui fluxus, licet periculi plenissimus, subito tamen coerceri non debet, sed saltem mitigari. Rhabarbarum parce, sed crebro datum, cumque theriaca vel diascordio mixtum, vinum rubrum, generosum, sed dilutum, diaeta subadstringens, gelatinosa, in non nullis aegris alumen quoque crudum, tinctura rosarum similiisque, profecerunt.
- p. 258. Pectoris autem iam dictam valetudinem leuant vesicatoria, equitatio, diaeta mere lactea et vegetabilis, et remedia sic dicta pectoralia, gummi ammoniacum, oxymel scilliticum et balsamus de Copaiua.

Reliqui non numquam superuenientes morbi ex artis regulis alias iam cognitae oppugnari docentur. Morbo tamen principe superato, remanent interdum ulcera, quae praeter antiscorbuticum regimen, antimonii crudi cum aethiope minerali, vel etiam, gingivis antea satis confirmatis, mercurii, balsamo sulphuristerebinthinato extincti, moderatum usum cum lignorum decocto admittunt felici cum successu, praesertim si diaphoresis aucta simul fuerit.

- p. 260. Postquam dein varia adhuc, ab aliis rei medicae peritissimis viris commendata remedia enarrauit atque examinavit, quasdam iis denique subiungit cautelas Cl. Auctor: Venae sectio nimirum et fortiora purgantia semper nocent; lenissimis tantum potius remediis alius ducenda est, et semper libera servanda: Vesicatoria, ob gangraenae metum, caute applicantur: Idem quoque valet de vomitoriis, quippe quae ipse Cl. Auctor tentare noluit: Morbo alte prouecto, aegri caute moueantur e lecto, aut libero aeri exponantur: Si diu etiam ii a vegetabilium usu abstineant, eaque nunc nanciscantur, magna eorum copia

ne vescantur una vice; alias dysenteria hancce sequitur voracitatem.

Quae huc usque proposuerat Cl. Auctor, sola p. 272. fere nitebantur experientia. Nunc autem in *capite sexto theoriam morbi* tradit. Corpus nostrum, inquit, tum quod heterogeneis constat partibus, cum propter perpetuum earum motum atque attritum, in varia contrahenda acrimoniarum genera spontaneamque corruptionem per se pronum est. Hinc particulae a blanda sua indole alienae factae excerni, novumque restitui debet nutrimentum quotidie. Eliminantur istae potissimum per urinam ac insensibilem dictam perspirationem, per quam prae primis ultimam subtilissimae excrementitiae particulae auolant, quae, si diu remanent, putrescentem indolem acquirunt et ad periculosissimos suscipiendos morbos corpus disponunt. Nisi porro blandi quoque et nutritii liquoris copia per singulos dies suggeratur nova, naturalis humorum ad putredinem fit dispositio. Animalia enim, fame enecata, non ex sanguinis ac humorum defectu, sed ex corrupta potius putridaque eorum dyscrasia orta, pereunt. Ad hanc igitur pu- p. 277. trescentium morborum, ab ipso naturali motu atque calore genitorum, classem pertinet scorbutus. Ideo tamen nondum appellari potest alcalicus, quum alcalica atque putrida corpora valde a se inuicem differant. En modus, quo generari poterit iste morbus pro causarum suarum effectibus! Intensius primo frigoris gradus, in debilibus potissimum hominibus, neque corpus satis mouentibus, cutis perspirationem, constrictis eius poris, cohibet; unde serosa colluuiet. Verus inde tamen scorbutus nondum oritur, nisi ac- p. 280. cedat aeris humiditas, quam per se solam gignere iam morbum posse diximus. Talem efficiunt in septentrionalibus regionibus crassae nebulae, in aliis pluviae copiosae. Noua atque dira haec est perspirationis supprimendae causa, quae totius corporis

- robur simul enervat, fibras relaxat, sanguinis praeparationem in pulmonibus impedit, ideoque ceteras inde dependentes corporis actiones, nutritionem in primis, laedit. Accedit et hoc, quod resorpti ex atmosphaera liquores, per se iam forte in illa humida magis heterogenei, nunc in corpus induciti, acriores fiant cumque feri praesente colluie post aliquod tempus ad putrescentem indolem inclinent. Quantum insuper per nimiam quietem, aut praegressos alios morbos, aut animi pathemata, metum, tristitiam, nimiasque curas, debilitetur corpus, aliunde etiam constat. His nunc autem causis, praedisponentibus Cl. Auctori dictis, et ipsarum effectibus accedant aliae occasionales, durus, salus, viscidus, non fermentatus victus, cum vegetabilium recentium defectu, c. f. p. quid tum fiet? Nec satis digerentur alimenta, neque blandus inde praeparabitur chylus, quum eorum superare tenacitatem, et in nutritium immutare succum, corporis vires haud valeant. Fac quoque, in primis viis illa resoluantur; chylus tamen, cui sua et necessaria semper deest blandities, in secundis, quae a praedisponentibus causis iam debiles factae sunt, viscidus remanet, acris tandem fit atque putridus. Inde porro perspiratio, iam ex aliis illis causis laesa, magis adhuc ab illa humorum tenacitate imminuitur.
- p. 298. Scorbuti itaque natura in laxo debilique solidarum corporis partium habitu et fluidorum sponte sua facta putrescente mutatione, consistit, quae a defectu blandi nutrimenti ac insensibilis perspirationis longa suppressione oritur; id, quod causae eius morbi ac effectus, qui sunt ipsius symptomata, satis superque testantur. Pergit deinde Cl. Auctor, et ex accescente, saponacea et diluente vegetabilium indole eorum usum atque necessitatem contra scorbutum demonstrat.

Septimum caput observationes continet ex hominum scorbuto defunctorum cadaueribus captas, quas vero transcribi quidem, sed breuibus non recenseri posse, intelligimus. Omnes vero illas putrescentem humorum singularem factam corruptionem indicare, monemus. Vnicum saltem de iis, qui subito saepe usque ex improviso expirauerant, notamus adhuc, eos omnes auriculas cordis in pugni magnitudinem extensas ac sanguine coacto plenas habuisse; alios, dyspnoea potissimum simul olim affectos, omnes in thorace sitas partes sibi conglutinatas ac in unam quasi massam commixtas, ut distingui fere non potuerint, pulmonibus in media eius parte quasi contritis haerentibus; alios autem vel musculos, vel intestina, gangraena affecta, ostendisse.

In *ultimo* tandem, quod partis huius est octauum, *capite de natura symptomatum* agit Cl. Auctor, eorumque indolem atque rationem ex praecedenti theoria atque anatomicis observationibus deducit atque exponit. Quibus vero hic loci dictis, facile ex antecedentium capitum summa perspiciendis, nunc supersedemus enarrandis.

Tertia tandem totius libri *pars*, uti supra diximus, bibliothecam quasi librorum, de scorbuto scriptorum, continet, ita, ut in *capite* eius *primo* loca ex veteribus medicis depromta examinentur, in quibus scorbutum ab iis indigitatum fuisse recentiores existimarunt. HIPPOCRATEM vero, quem posteriores fere omnes exscripserunt, iis in locis icteri genera, ex hepate vel liene obstructis orta, descripsisse Cl. Auctor declarat. Stomacace atque scelotyrbe, a PLINIO descripti affectus *, attentionem mererentur, nisi auctor is esset nimis saepe credulus, et in hoc etiam loco narrationi suae fabulosa simul immiscuisset. Primus autem, qui ex instituto scripsisse dicitur de scorbuto, fuit IO. ECHTHIVS. Eius ita-

R 2

que

* Histor. nat. lib. 25. cap. 3.

que libri *de scorbuto vel scorbutica passione* recensio, ad p. 355. annum 1541 posita, legitur ab initio chronologici omnium librorum indicis, qui de scorbuto huc usque fuerunt editi, ad annum usque nuperrimum 1753 perducti atque finiti epitome tractatus *de scorbuto marino* a Cl. ADDINGTON in lucem emissi.

Appendix denique huic libro addita et eos libros, qui non visi ideoque omitti fuerant, a Cl. Auctore, et chronologicum et alphabeticum auctorum eorumque scriptorum, ab eo allegatorum aut recensitorum, indicem continet. Vt ipsi quoque alium adhuc indicem, totius libri argumenta comprehendentem, addere placuisset, optamus. Interim ex iis, quae adduximus, cuilibet clarum fore confidimus, quam utile opus a Cl. Auctore non susceptum solum, sed etiam quam bene illud ab eo fuerit perfectum, ita, ut omnium, quos de hoc morbo huc usque scriptos habemus, librorum iudicari esse queat plenissimus.

VII.

Quaestio medica: An à diversa virtus scorbutici indole et sede Morbi diuersi? Praeside M. PAVLO LE ROY, Doctore Medico. Proponebat *Henricus Michael Missa*. Parisiis, 1754. 4. mai. pl. 2.

Postquam illum de scorbuto librum a Cl. LIND editum, cuius iam iam dedimus epitomen, legeramus, nunc, ulterioris acquirendae notitiae cupidus, quid alii ex recentioribus medicis de eo sentiant, hancce, quam indicamus, dissertationem perlustrabamus. Sed, si dicere licet, eam perlegisse nos fere poenitebat. Poetica magis, vel certe rhetorica, haberi poterit tractatio, quam medica, ab omnium fere auctorum, qui fidem merentur, observationibus aliena, morbi nec ortum atque causas, nec indolem atque

atque effectus ita explicans, ut legentis desiderio satis faciat. Quaestionem itaque propositam eo modo solutam esse haud miramur, ut a diversa virus scorbutici indole ac sede quam maxime etiam diversi morbi oriri dicantur, iis scilicet vix non omnibus ad huius morbi classẽm relatis, quorum indoles nondum satis exposita fuit. En quaedam eius rei specimina!

Nec unicus, neque simplex est scorbutus; modo p. 1. sub omnium morborum larua se suumque virus diversis modis occultat; modo mitius agere videtur cum aegris; modo furit, parcens nemini; modo chronicus est, ipsius saevitiae multorum in annorum seriem pertingente; modo peracutus. *Dum grassatur enim p. 2. eius contagium, nihil vacans ab illo, omnia omni implet clade, ita ut nulla post se supersint salubria.* Hinc quoque factum fuit, ut infinitas eius metamorphoses pro totidem veteres haberent morbis, ideoque cum multis aliis, quibus erat finitimus, eam confunderent. Vera et adaequata dicitur eius esse definitio p. 3. *simultanea solidorum ac fluidorum depravatio, virulento quodam humore peculiari et venereum aemulante illata.* Humor iste vel a nostra origine in nobis latet, vel spontaneo naturae vitio, vel per contagium, oritur. A venerea lue, quae veterum fuit elephas, virus quidem sui natura ideoque et curatione differt scorbutus; sed origine, sede, more, signis, periodicis et effectibus, ambo morbi, uti sibi pares, sic et saepissime sibi mutuo fiunt germani atque congenere. Sexcenti sunt alii morbi sibi similes suaeque indole maxime propinqui, quibus cum ille conspirat: rheumatismus, arthritis, omnia fere exanthematicarum febrium genera, ipsa pestis; qui affectus omnes sola eius *virus alterationis varietate*, quantitate, partiumque, quas illud occupat, indole a se differunt. Itaque non septentrionalibus solum populis, sed toti p. 4. terrarum orbi competit proteiformis hicce morbus, ita tamen, ut inter illos chronicus sit, inter reliquos

- autem eo acutior, quo propiores ei sunt a meridie. Vbiuis tamen aliam aliamque induit figuram. Omnes itaque endemii, tales inter singulas fere nationes reperiendi, morbi scorbutico humori suam debent originem, v. c. Hispanorum struma atque cholera; Parisiorum tussis atque rheumatismus; Anglorum sudor inflammatorius; ac alii reliquorum populorum fere innumeri, quorum satis longum hic loci reperies catalogum. Tot igitur scorbuti erunt species, quot sunt virus ipsius dotes: vitriolica nempe, nitrosa, falsomuriatica, ammoniacalis, austera, tartarica, deurens, alcalica, foetida, putrefaciens, corrosiva, aliaeque porro multae, quas omittimus, ne uniuersam conscribere velle pathologiam videamur. Quot vero omnium fere morborum causas esse posse credideris, tot etiam generando scorbuto Cl. Auctor tribuit, corpori tamen noxias tantum, quantum ad suscipiendum hunc morbum illud iam habet dispositionis. Inficientes autem illae particulae, hinc et inde per aerem disseminatae volitant, quae, si corpus fuerint ingressae, scorbuticum humorem euoluere poterunt. En varia et mira scorbuti facies, quae a tam diuersis causis oritur! Quid? Quod v. c. febres continuae aut intermittentes, quotannis vere vel autumno reduces, non ipsius forsitan causae sint, sed propagata potius eius soboles ac metamorphoses; quam etiam sententiam de omni aegrotatione periodica, vel etiam erratica, ferendam esse Cl. Auctor sibi persuadet. Sed eheu satis ea de re dictum esto!



VIII.

TIBERII LAMBERGEN, Lectio inauguralis
fistens ephemeridem persanati carcinomatis.
Groningae, apud Henricum Vechnerum.
1754. 4. mai. pl. 4¹/₂.

Quo rariores ulcerum cancroforum, sine laesae
partis extirpatione curatorum, esse solent ca-
sus, eo maiori omnino iure illi, a viris non artis pe-
ritia solum claris, sed fide quoque dignis, enarrati,
debent colligi, quo tandem, iis inter se comparatis,
ad intimiorem dirissimi huius omnium morbi cogni-
tionem eique medendi certiore, ac huc-usque ha-
buimus, spem deveniamus. Ad primam illorum
casuum classem sequens a Cl. Auctore enarrata perti-
net historia, nuper iam a nobis indicata*.

Femina quatuor et triginta annorum, a tribus p. 3.
inde annis vidua, temperamenti sanguinei, sana qui-
dem satis, sed mobili nervorum systemate utens at-
que in morbos inflammatorios valde proclivis, prima
vice ante octo circiter annos dextrae mammae inflam-
mationem eiusque copiosam suppurationem, altera
vice ante sex annos eiusdem, tertiaque tandem vice
ante quinque annos eiusdem denuo simulque alterius
quoque mammae sinistrae inflammationem, quam
semper exceperat suppuratio, experta; ab illo tempo-
re in mamma dextra varia tubercula dura, indolentia,
atque scirrhusa gerebat; plurimum tamen adhuc infan-
tum mater facta; tandem praeter opinionem quam
vehementissima sinistrae mammae corripiebatur in-
flammatione, brevi tamen tempore feliciter et sine
ulla mammae relicta duritie discussa. Post annum
vero elapsum, quum a quinque iam inde noviluniis
parcius iusto fluxerint menses, in dextra illa mamma
lancinantes dolores, in primis sub tempestatum mu-

R 4

tatio-

* Comment. nostr. Vol. IV. P. I. p. 164.

p. 5. tationibus auctos cum aliquali eius tumore, potissimum autem ex inopino lapsu dein perterrita, et doloris, et tumoris, persentiscebatur incrementum, quade causa denuo consulebat Cl. Auctorem. Reperiebat is tum dura, iam olim observata, ista tubercula, mole iam multum maiora et saxae ferme duritiei, in unum quasi nunc tumorem coisse, eumque scabrum iam valde atque praeruptum, in superiore in primis mammae parte haerentem, musculo pectorali iam accreuisse. Pruritus aderat perpetuus; lancinantes autem dolores, sub axilla incipientes inque ipso tumore desinentes, non numquam tantum intercurrebant. Color atque calor mammae, praeter unam alteramque venam tumidam factam, reliquae corporis cuti similes adhuc erant. Sub ipsa vero axilla glandula quaedam scirrhusa; nec altera quoque mamma, sinistra nimirum, ab omni iam duritie libera erat. Externe tum temporis applicabantur saturnina, et pro interno usu propinabantur aegrae resoluentia cum anodynis mixta; iusto simul regimine aegrae praescripto; et ad instans catameniorum tempus emmenagoga; iisque nondum sufficienter profluentibus, sanguis mittebatur ex talo; quae tamen omnia in usum vocata auxilia breves modo sequebantur induciae. Quid? Quod, praeter redeuntes saepius dolores nuncque fere perpetuos factos, versus inferiorem tumoris partem duos fere digitos transversos supra papillae locum, qui pro tumoris duritie satis erat mollis, naturalis huc usque cutis color, nunc in rubellum mutatus, maculam sistebat inflammata.

p. 9. In hisce rerum angustiis alios probos expertosque medicos Noster adiens, a Cl. WINTERO in primis, Academiae Leidenfis Professore, illud accipiebat consilium, ut, ad exemplum Cl. DEGNERI, Medici Nouiomagensis, qui ad inueteratos scirrhusos infusum herbae *Solani furiosi*, vulgo *Belladonnae* dictae, commendauerat, eandem quoque medicinam in usum vocaret,

vocaret, eamque vel etiam omnino dubiam in dubio ac desperato hocce morbi statu tentaret*. Ante ve-
ro, quam aegrae dare vellet illam, in semet ipso faciebat Vir Optimus periculum, et herbae illius seu foliorum eius, per triennium iam siccorum, scrupulo uni tantum feruentis aquae infundens, quantum decem vascula porcellana, ex quibus ut plurimum forbillare solemus infusum Theae, capiunt, et per noctem infusum illud digerens, mane ieiuno ventriculo capiens unum vasculum, indeque breui lenem

R 5

vertigi-

* Externum quidem *Belladonnae* usum contra cancrum aliaque similia ulcera, et veteres iam, et recentiores, collaudarunt; inter quos ex illis GALENUM, Lib. II. *Method. med. ad Glauc. Cap. 2. Tom. X. p. 390. edit. CHARTERII*; et AEGINETAM Lib. IV. Cap. 26; ex his vero IO. BOECLERUM in *Cynosura materiae med. ad Hermannianae imitationem collectae*, P. I. p. 321. nunc adduxisse sufficiat. Internum autem eius herbae usum, quantum nos quidem iam rescire possumus, a nemine fere tuto commendatum esse legimus, si dissertationem exceperis, a Cl. OETINGER, sub Cl. ALBERTI praesidio, anno huius seculi trigesimo nono *Halae Magdeburgicae defensam, de belladonna, tamquam specifico in cancro in primis occulto*; in qua multa quidem experimenta chemica atque physica, de plantae eius viribus capta, uti et non nullas aegrorum, cancro laborantium et decocti illius ope inde liberatorum, historias inuenies. Ipse tamen Auctor in sua praxi nondum illud tum temporis adhibuisse videtur; eiusque virium cognitionem amico cuidam, et Cl. IVNCKERO, Professori Medico Halensi, acceptam se debere fatetur. Nec immerito de hac dissertatione questum fuisse Cl. HEISTERUM, intelligimus, illius auctorem haud sufficienter docere modum, quo herba tam dubiae virtutis in usum vocari queat. Refert simul Cl. HEISTER de aegra quadam, cui chirurgus aliquis tale quidem propinauerit decoctum, quae inde vero per aliquod tempus amens neque a cancro suo liberata fuerit. vid. eius *Institution. chirurg. Tom. I. P. I. Lib. IV. Cap. XVII. p. 337. edit. Amstelod. 1750. 4. mai.*

vertiginem, et insolitam oris siccitatem per unam alteramque horam percipiens, ab hac dosi in aegra sua medio mense *ianuario*, anno huius seculi quadragesimo quinto, curationis faciebat initium. Enarrat nunc Cl. Auctor, quae ab hoc die ad decimum usque mensis *iunii* eiusdem anni, per singulos fere dies obseruauit.

Eosdem etiam, quos Cl. Auctorem in semet ipso deprehendisse iam diximus, effectus semper experiebatur aegra, praeter arteriarum ictus, in principio curationis debiliores ac celeriores in hac visos. Emplastri, diapompholygos dicti, usus cum mercurii et plumbi amalgamate semper continuabatur. Post primam hebdomadam dolores atrociores, eminens tumoris apex magis liuescens, et illa iam dicta macula purpurascens, fieri incipiebat, cum epidermide rimulam actura atque duobus parum prominulis punctis flauescens coloris. Mensium instans tempus, et cardialgia spasmodica cum anxietate accedens, antispasmodica, aliorum remediorum loco, exposcebant. Quibus impedimentis remotis, sub eiusdem mensis finem, secundi scrupuli illius herbae infuso utebatur aegra, dosi paululum aucta. Dolor idem fere manebat continuus, punctula vero illa nunc vera fiebant ulcuscula, in unum foraminulum cocuntia; diametro quidem, sed non altitudine, maiora facta; paucam lenti, subflauescens humoris copiam emittebant; Eminens ille quoque apex vehementer dolens, liuescentem maculam cum duobus itidem punctis albicantibus, post tertium diem quoque in ulcusculum transeuntibus, ostendebat. Infusi istius nunc unum et dimidium vasculum sumens aegra maiorem eamque satis molestant oris siccitatem, temulentiam, visusque insignem obnubilationem inde sentiebat, appetitu solito minore, et pulsu aliquantum incitato, obseruatis; quae ultima tamen symptomata post breue tempus cessabant, relictis semper prioribus.

Ab initio mensis *februarii* ulcusculis illis praeter p. 16.
emplastrum imponebatur unguentum nutritum di-
ctum cum plumaceolis. Per ipsius mensis decursum
satis bene se habebat aegra. Ulcuscula modo sicca,
modo aperta, plerumque parum fundebant ichoris.
Dolor mammae quoque modo auctior, modo leuior,
in genere tamen mitior erat, ac antea. Non num-
quam occupabat is etiam glandulam subaxillarem
scirrhosam, et mammam sinistram; paulo post vero
evanescebat. Ipse autem laesae mammae tumor ali-
quantum emollitus ac imminutus esse videbatur. Ad
rediens catameniorum, largiter prorumpentium,
tempus redibat quoque iam commemorata cardial-
gia, cito autem dissipata.

Circa mensis *martii* initium sub planta et iuxta p. 22.
tibiam pedis dextri sponte oriebantur vesiculae am-
plae, ingentem lymphae serosae copiam continen-
tes; quae tamen forfice discissae, citam recipiebant
sanationem. Post grauem iram grauis etiam denuo
aegram excruciat cardialgia. Tumor dein faciei
atque labiorum multa afferebat symptomata, eua-
nescentia post labium superius suppuratum. Reli-
qua fere eadem, praeter dolores mammae ut pluri-
mum auctiores: inferiora tamen ulcuscula fere clau-
sa erant: appetitus saepe languens.

Sub initium mensis *aprilis* pes sinister vehemen- p. 26.
ter dolens, varias illis iam prioribus similes fiste-
bat vesicas, ex quibus per maximam mensis partem co-
piosissima effluebat lymphae acris cum maximo aegrae
incommodo: alia quoque similis in digito indice lae-
uae manus extremo, post praegressi diei inflamma-
tionem, eleuabatur vesicula humorem quoque sero-
sum continens. Sinistrae porro mammae area exco-
riata et parvis furunculis obsita, lymphae aliquid
emittebat. Reliqua satis tolerabilia solitoque mitiora.

Eadem remedia per mensem *maium* ad medium p. 30.
fere usque *iunium* continuata, morbum sensim sen-
simque

sinque faciebant mitiorem; ulcusculis istis clausis. Mamma quoque sinistra per aliquod tempus largiter madens, tandem siccabatur; et dextrae tumor atque durities valde imminuebantur, ita, ut flaccescens atque pendula fieret.

p. 33.

Per aliquod deinde tempus iter faciens aegra, redibat sanissima visa, illa tumoris parte, quae adhuc supererat, penitus sensim discussa. Per totum ferme quidem subsequenter annum dolores interdum recrudescere visi, uno tantum infusi illius hausto vasculo, euanescebant. Ab illo etiam postea tempore, id, quod octo comprehendit annorum spatium, nullum in mamma sentiens dolorem, viro dein iterum nupta, infantem edens, ipsa eum sine incommodo lactare poterat. Notamus adhuc, plures, quam sex, drachmas illius herbae continuato usu adhibuisse hanc feminam, infuso singuli scrupuli per septem octoue ut plurimum dies utentem; eamque porro huic infuso, licet eius usus quotidianus fuerit, numquam adfueuisse, sed eadem semper expertam symptomata, hincque unam fere eandemque illius dosin semper retinere coactam fuisse.

Nos omnino gratulamur Cl. Auctori hunc felicem curationis euentum, ceu praemium viri docti, candidi atque industrii, laboribus dignissimum; ipsiusque sententiae facile multos subscripturos esse putamus, qua nempe *narcotica in neruorum morbis saepe optima esse remedia, et neruos in scirrhi et carcinomatis malis praecipuam symbolam conferre*, atque ex laudati iam remedii corticisque peruuiani, contra eundem morbum dati, obseruato felici successu medicinam diro isti malo aduersam inuentum iri putat atque sperat.



IX.

D. IO. HARTM. DEGNER, Scabini, Senatoris et Archiatri Ciuit. Neomag. Acad. Caes. Nat. Cur. Coll. etc. Historia medica de Dysenteria bilioso - contagiosa, quae MDCCXXXVI. Neomagi et in vicinis ei pagis epidemice grassata fuit. In qua simul nouorum quorundam remediorum antidysentericorum, nimirum corticis Simarubae, radicis Salab, trochiscorum Gitta Gambir et corticis Mangostan effectus exploratur. Accedit relatio historica cum responso Facultatis Medicae Halensis de morte per mercurium sublim. in emplastro adplicatum, inducta. Editio nouissima, ab Auctore ipso reuisa et aucta. Traiecti ad Rhenum, apud Nicolaum van Vucht, 1754. 8. mai. alph. 1. pl. 3. praef. pl. 1.

Postquam utilissimus hic liber prima vice anno huius seculi tricesimo octauo Traiecti ad Rhenum editus, isque totus praeter illam sub finem additam relationem, Actis etiam Academiae Naturae Curiosorum * insertus fuerat: bibliopola quidam Louanien-
sis, *van Ouerbeke*, specioso quidem editionis auctae ac ultimae praefixo titulo, sed temerario ausu incio-
que Cl. Auctore, nec ullo sane augmento, at men-
dis tantum innumeris ditio-rem, eum anno huius se-
culi quinquagesimo recudi curauit. Quo non illicito
solum et turpiter quoque praestito istius hominis fa-
cinore, sed prioris etiam atque iustae editionis omni-
um exemplorum iam venditorum defectu commotus,
eum iterum ipse Cl. Auctor prelo submittendum cu-
rare voluit, additis permultis, maximam partem
practicis, obseruationibus, quas ipsi tamen textui
haud

* Vol. V. in Appendice.

haud inferuit; eo nimirum prorsus immutato relicto; sed annotationum saltem nomine ad calcem cuiusvis paginae apposuit. Quum ipsum vero librum in plurimorum, qui nostros forte legent commentarios, iam fore manibus, ideoque contenta eius fere neminem ignoraturum esse opinemur, in eo iam recensendo morari nolumus, ex iis saltem, quae nouiter in hac editione accesserunt, animaduersionibus aliqua excerpturi:

- p. 26. In epidemicis iisque malignis morbis, quorum sedes in tenuioribus corporis humidis haeret, ex urina vix quidquam innotescit, quod de ipso morbo iudicemus.
- p. 34. Quam de aliis morbis habemus observationem, qua ad eos nimirum suscipiendos certam in corpore existere debere dispositionem, in scholis docemus, ea quoque valet de contagiosis atque malignis, adeo ut talis venenosi miasmatis effectus diuersi esse soleant in diuersis, quae intrarunt, corporibus, pro varia eorum conditione.
- p. 48. Dysenterias sporadicas, a particulari aliqua causa ortas, diarrhoeas dysenterioides, quam veras, appellare mauult dysenterias Cl. Auctor; quum essentiale harum existimet attributum esse contagium.
- p. 54. Nocuiarum aeris qualitatum certi atque determinati effectus certis quoque anni temporibus assignati esse videntur. Eo itaque maligniores ei esse obseruantur, quo citius se se exserunt; ideoque dysenteria maturius, quam augusto et septembris mensibus, proueniens, acrior deprehensa fuit.
- p. 60. Licet aeris conditiones ad epidemicum aliquem morbum gignendum omnino multum conferant: inferre inde tamen non licet, venenatas quasi particulas per aerem esse diffusas. Satis itaque grauiamouet Cl. Auctor dubia contra illam observationem, quam anno superiore 1754 sub initium mensis maii Lutetiae Parisiorum fecisse medicos, in publicis relationibus legere meminimus. Recentissimae nempe carnis frustum, perticae impositum, ac per unius tantum horae

rae spatium in altissimo quodam loco suspensum, in corruptionem tamen illico abiisse, referebatur, indicio iis habito, aerem mediae coeli regionis infectum fuisse. Experimentum fac quoque rite sit institutum; attamen, num idem fuerit aer atmosphaericus in urbis plateis atque nosodochiis, simul non annotatum fuit. Nec horaeos fructus aliaque vegetabilia, p. 75. neque terrarum inundationes, neque plumbeos, per quos aquae defluunt, canales, licet alios inde quidem morbos excitari posse certum sit, dysenteriae tamen continentem, quam dicunt, causam, uti ab aliis creditum fuit, haud praebere, Noster, experientia teste, confirmat.

De cortice *Simarubae*, cuius usum iam olim ex- p. 159. pertus commendauerat, iam iterum refert, quam raro potiri eo vero potuerit, licet e multis locis eum sibi curauerit apportandum, eumque in primis, quem Parisiis arcessuerat, omnium fuisse vilissimum, aliis quoque medicis idem testantibus; eum porro vel etiam verum quam maxime differre, optimumque esse a ramis modicae crassitie, quippe qui tenellis et exsuccis ramulis meliores sint; sapore tamen atque gustu indolem eius optime declarari. Paulo infra de p. 288. eodem cortice adhuc narrat nouisque iam probat exemplis, eum, praeter dysenteriam, in nimio etiam fluxu menstruo, colica habituali et dysenterica aliisque morbis, ubi laxae corporis fibrae roboris augmentum postulauerant, profuisse. Clysmata ex oleo lini p. 167. solo tantumque tepesfacto maxime quidem iuuauerunt aegros dysentericos: ea tamen obseruanda fuit cautela, ut parca saltem quantitate singulis vicibus, sed crebro, iniicerentur, quo facile retineri potuerint.

De radice *Salab*, morbo huic admodum conue- p. 169. niente olim quoque etiam laudata, monet nunc Cl. Auctor, eam difficulter solui posse, ideoque in subtilissimum puluerem redigi, et sufficienti affusa aquae quantitate, v. c. drachmae pulueris uni octo uncis
aquae

- aquae superfusus, lenissimo tantum igne coqui debe-
- p. 177. re, quo eius nanciscamur gelatinam. De eadem ra-
dice beatus nunc s. DV BVISSON, qui, dum viue-
ret, ciuitatis Medioburgensis poliater fuerat, ac olim
ipse iter fecerat in Indiam Orientalem, ad Cl. Aucto-
rem scripsit eam haud esse aliquam radicem, sed
fructum quendam, ficuum nempe ad solem ficcato-
rum speciem; id, quod ex pedunculis eius clarius ad-
- p. 180. huc pateat. Idem quoque remedium in omnibus
aliis morbis, in quibus gummosa et resinosa locum
obtinent, maxime in colicis infantum doloribus, ca-
tarrhis pectoris, renum ac vesicae morbis, optimo
cum successu fuit adhibitum. Aliquam etiam, licet
lenissimam, adstringendi vel roborandi vim ei inesse,
tum viri exemplum probat, cholera laborantis chro-
nica, et per sex hebdomades hacce salub utentis
aluumque tandem adstrictam inde experti; cum haec
etiam peculiaris ipsius indoles, qua mucilago inde
parata, uti linguae et faucibus diu et fortiter adhae-
ret, sic et ventriculo et reliquis partibus solidis idem
praestare ideoque aegris dysentericis omnino conue-
nire videtur. Ex illo satis cognito semine, *sago* di-
cto, similis et perquam grata parari poterit gelatina.
- p. 185. In tenesmo et haemorrhoidibus dolorosis liquor
ex floribus verbasci paratus et externe applicatus,
optime profuit. Fit ille vero liquor, dum herbae
istius flores, vitro alicui inditi, exponuntur solis vi,
cuius ope in liquamen fuscum mucilaginoso-oleosum
- p. 188. fatiscunt. Solani esculenti tuberosae radices, quippe
quae leni atque tenui constant substantia farinacea
cum crassiore aliqua terra, tanquam salubrem cibum
aegris suis concessit Cl. Auctor, nec ullum inde noxi-
um, quem alii metuerant, effectum observauit.
- p. 191. Vti congrui potus in genere, sic et in primis aquae
simplicis sufficientem, quin et largissimam, copiam
in eius generis morbis non in aliis solum aegris, sed
et in semet ipso olim valde proficuum expertus fuit.
- Alii

Alii essentiam millefolii probe saturatam pro scopo p. 223.
tum prophylactico, tum curatio, commendant quid-
dem; sed illum fuisse nullum, hunc autem rarum
annotavit Noster, nisi multa nimirum cum circum-
spectione adhibita fuerit, quippe quae in omnium
adstringentium remediorum usu necessaria sit. Quum p. 230.
porro, si contra alium umquam morbum, hunc in
primis dysentericum permulta commendari solent re-
media, serio hortatur Cl. Auctor omnes medicos, ut
taliam feligant, quae rationali tantum methodo satis
faciant, probeque expendant, *quo maiore vi polleat
aliquod medicamentum, si non cum summa cautione
adhibeatur, hoc magis noxium edere effectum;* hinc p. 238.
quoque valde circumspectum in his morbis usum esse
debere monet et mercurii dulcis et corticis peru-
uiani.

Quam utile sit, homines morbo aliquo contagio- p. 257.
so decumbentes, quam demum primum fieri potue-
rit, a fanis separare, apparet ex memorabili hic enar-
rato, exemplo. Nuper enim sub initium anni supe-
rioris Holmiae in Suecia febris quaedam purpurata
contagiosa sese manifestauerat in aliqua domo, ita, ut
in hac sola octo aegri eo morbo breui perirent; qua
vero statim clausa et obserata, malum ulterius pro-
pagatum haud fuit. In terreis remediis contra dys- p. 272.
enteriam parum ponit fiducia Cl. Auctor, quum
bilis nimirum alcalicam corruptionem, quam morbi
eius causam esse putat proximam, haud immutare
valeant; neque nitri usum in morbi potissimum statu,
uti quoque in cholera, tutum satis esse putat. De p. 281
remediis specificis dictis in genere ita statuit, ut,
quum venena quaedam et fermenta tum animalia,
cum vegetabilia, in certas tantum corporis partes
singulari modo agere ipsa conuincamur experientia,
illa quoque sua habere existimet antidota, specifica di-
cenda. Sic mercurius specificè agere videtur in
glandulas in primis faucium, quas pro specifica
Tom. IV. Pars II. S quoque

quoque sua indole praecipue occupat virus venereum.

- p. 296. Supra iam laudatus medicus, DV BUISSON, novum aliud nec huc usque valde cognitum remedium antidyfentericum communicavit cum Cl. Auctore sub nomine *Gitta Gambir*, quod trochiscorum quoddam genus est ex insula Iava allatorum, quos non in gargarismis solum contra faucium inflammationes anginosas et aphthosas, sed etiam aduersas diarrhoeas, dysenterias, aliasque intestinorum laxitates ita ille adhibuerat, ut illorum uni vel duabus drachmis infunderet aquam feruentem, eiusque ad colorem theaeboei tinctae singulis horis vel bihoriis unum vasculum porcellanum hac portione plenum per aliquot dies suis aegris propinaret, reliquis tamen remediis pro rerum circumstantium ratione necessariis visis simul haud neglectis.
- p. 299. Postquam ille quoque medicus Nostro scripserat, se existimare, trochiscos illos maximam sui partem ex succo catechu esse paratos, hic, utramque illam medicinam soluendo et euaporando, magnam quoque inter eam inuenit convenientiam, praeter longe maiorem terrae inertis copiam in solutione *Gitta Gambir* deprehensam. Sapor tamen praecipuam suppeditauit utriusque diuersitatem: paulo enim acerbior magisque adstringens *Gittae Gambir*, quam succi catechu, fuit sapor, tandem tamen in lingua aliquam relinquens dulcedinem. Ex una igitur eademque arbore, vel certe a talibus, quae parum a se inuicem differunt, praeparari videntur ambae hae species, catechu forte ex eius solo fructu aut succo, *Gitta Gambir* autem ex immaturis simul adiectis corticibus. In sporadicis quidem dysenteriis, haud vero in aliqua contagiosa, nouo hoc utendi remedio Cl. Auctor nactus fuit occasionem, in quibus bonum quidem edidit effectum, sed non talem, ut aliis iam cognitis auxiliis hoc praeferri debeat. Insignior

signior adhuc eius usus in faucium fuisse dicitur affectibus *.

De cortice *Mangostan*, ut nouiter quoque detecto p. 308. medicamento antidysenterico, pauca quoque narrat Cl. Auctor, ab aliis iam auctoribus notata **, quum ipse eum videndi viresque eius examinandi nondum habuerit occasionem. Sufficiant, quae adduximus. Apparebit inde, quantum utilitatis libro iam antea medicinam facientibus utili et grato in noua hac editione accesserit.

X.

A Method of Cure for the Stone chiefly by Injections. With Descriptions and Delineations of the Instruments contrived for those Purposes. By WILLIAM BUTTER, M. C. Edinburgh, printed for Hamilton, Balfour et Neill. 1754. 12. mai. pagg. 84. tab. aen. I.

id est:

Calculo per iniectiones potissimum medendi methodus, cum instrumenti hunc in finem inuenti delineatione atque descriptione. Auctore GVILIELMO BUTTERO.

Inter optima, quae calculum soluere valeant, reme- p. I.

dia a recentioribus medicis, iisque praecipue anglis, aquam calcis viuae referri constat. Quum eius

S 2

autem

* De eo vid. VALENTINI *Mus. Mus. T. I. in Append. p. 25.* RUMPHII *Herbar. Amboin. Part. I. Lib. I. Cap. VI. p. 34. et Lib. III. Cap. XLI. p. 251. et Part. V. Lib. II. Cap. XXXIII. p. 64.* et ALB. SEBA. Caueant pharmacopoei, ne nominum aliqua similitudine decepti illam cum *gummi gutta* seu *gutta camboidea* confundant.

** v. *Memoires de l'Acad. Roy. des Sciences: à Paris, l'année*

autem vires per ipsas corporis actiones ante, quam ad renes vesicamque urinariam pertingere queant, imminuantur, ideoque non, nisi lente, in ipsum calculum agere soleant: in voto habuerunt multi, ut inueniretur methodus, qua tuto ac sine aegri incommodo illa calcis aqua per urethram immediate in vesicam possit immitti. Postquam igitur hunc in finem Cl. Auctor aliquod excogitauerat instrumentum, idque cum Cl. WYTT communicans, et aliqua in publico quodam nosocomio faciens cum eo tentamina, euentum voto suo non perfecte respondere obseruauerat: hoc tandem, quod nunc in usum publicum describit, finique praefixo asserit esse conuenientissimum, inuenit instrumentum; id, quod indicare saltem volumus, licet administratio eius atque usus sine icone nec describi nec intelligi satis queant.

p. 10. Vt in genere tamen aliqua de eo dicamus, follis quoddam illud esse genus, ex ligno quodam Americano *Mahogany* dicto * confecti, commemoramus, in quo medio collocatur ouilla vesica sicca ad recipiendum, quod mediante illo folle compresso iniici debet liquidum; cuius autem extremae parti tres applicantur e stanno parati tubi, in exteriori superficie pro se inuicem recipiendis, cochleae in modum in partibus extremis contorti, quorum medius epistomium habet ad retinendum in vesica, quam diu lubet, liquorem; ultimus autem pro urethrae figura in finem

fenstram

née 1730. *Commerc. litter. Norimb. Ann.* 1735 et 1738
RUMPHII *Herb. Amboin. Part. I. Lib. I. Cap. XXVIII*
p. 143.

* Quantum nos quidem scimus, nullum adhuc a botanicis huic arbori datum fuit nomen specificum. CLAYTON in *Hist. Carol.* eam describit arborem foliis pinnatis, nullo impari ala claudente, neruo alato unum excurrente, fructu anguloso magno, semine alato instar pinus. vid. MILLER'S *Gardener's Dictionary* in appendice, ultimae eius, quae sexta est editioni addita, p. I.

senfim senfimque angustiores et paulo incuruatum excurrit; qui etiam a mulieribus adhibendus, ut sibi ipsae consulere queant eo facilius, magis adhuc inflexus, pro diuersa autem virorum aetate penisque magnitudine ad diuersam longitudinem parandus, commendatur.

Quo autem modo instrumentum istud ab ipsis p. 27. aegris sibimet applicari possit, satis accurate Cl. Auctor docet. Liquidi, singula vice iniiciendi, quan- p. 30. titatem ita determinat, ut ea dimidio minor sit, ac cuiuslibet hominis vesica commodè circiter continere possit. Quodsi enim ea adhuc parcius sit, totum calculo non penitus circumfusa, parum vel nihil eius substantiae soluet; sin vero maior, tum ea vel cito reiicitur, vel ipsa rumpi poterit vesica. Quem p. 32. in finem etiam, ut haec eo facilius distendi, liquidumque infusum diu satis in se continere posset, sub initium curationis eandem quantitatem decocti maluarum immisit Cl. Auctor. Ex iisdem quoque cau- p. 35. sis iniiciendi modus lentus sit, haud interruptus ac aequalis.

Felicius autem adhuc omnis succedit operatio, p. 40. si interne simul adhibeatur aqua ista calcis, ex ostrearum testis paratae, incipiendo a duabus vel quatuor eius uncis; una dosi bibendis, usque dum pro potu ordinario illam assumere queat aeger. Consuetis enim horis, quando ventriculus nempe ieiunus est, aegro eam dare velle, ideo Cl. Auctori non arridet, quod ea tum temporis maximam in humoribus patiatur mutationem; quae vero minor sit, si sub ipso pastu vel paulo post eum hauriatur: quum urina tum temporis soleat esse cruda, a viribus nimirum corporis assimilantibus nondum valde immutata. Sub cly- p. 43. steris quoque forma in corpus iniici potest illud remedium in iis potissimum, qui ore illud assumere recusant; eiusque pondus singula vice ad libram circiter dimidiam; aegro deinde horizontaliter posito, na-

tibusque eius per aliquod tempus eleuatis, ne illico per aluum regrediatur lotio.

- P. 44. Saponis usum haud adeo necessarium simul esse putat Cl. Auctor, ut omitti nequeat, quum calcis aqua iam sufficiat ipsoque sapone tutior sit, quippe qui appetitum facile destruat, viasque urinarias nimis saepe irriter, sique in iis ulcera haereant, haec augere valeat. Quodsi vero nihil adsit, quod contra eius usum indicet, aluus autem e contrario sicca sit, usum eius ad unciam dimidiam partitis vicibus per diem adhibendam cum fructu admitti posse concedit. Tempus autem, quo in vesicam ingeri possit aqua calcis, optimum esse putat matutinum ante, quam e lecto surgat aeger, atque vespertinum, quando is vult ire cubitum. Dorso eum dein iubet incumbere, natibus atque feminibus reliquo corpore altius positus, quo tam diu, ac demum fieri possit, in vesica retineatur aqua iniecta, et reliqua ore assumpta remedia eo melius in renes etiam agere queant. Urinae enim faciendae nifum vel in homine sano non facile a distentis vesicae tunicis, aut ipsius lotionis stimulo, sed ab huius saltem pressione in ceruicem vesicae facta, oriri autumat: quum a vero prorsus alienum esse videatur, cauum aliquod continendo singulari alicui liquido dicatum, ab eius acore irritatum iri in statu sano*.
- P. 51. Ipsam porro calcis aquam per se mitem satis esse, nec alio mucilaginoso forsan addendo remedio obtundi debere, non inde solum probat, quod oculo instillata perparum modo eum afficiat; sed binis etiam aegris, quorum vesicae statum antea inuestigauerant aliqui

* Cur vero ab assumptis alimentis acrioribus, vel si quoque in corpore nostro aliqua latet acrimonia, urinae vel admodum paucae mittendae valde insignis stimulus? Illud assertum de urina maximam sui partem aquosa potius, quam omnibus eius generibus, valere posse videtur.

aliqui medici tirones sanguinemque proluxerant, sine ullo eorum incommodo eam immiserit.

Qua nunc paucis enarrata methodo calculum sa. p. 55. tis magnum atque durum post paucorum mensium spatium dissolutum iri, ipsumque certe, si quando omnem remediorum vim saxea eius durities superet, laeuigari posse, sperat atque promittit; idque alius quoque medici, Cl. RUTHERFORD, testimonio p. 61. comprobat, a quo conscriptam calculi, feliciter iam dicta ratione curati, historiam hic loci adducit; omnemque hunc suum libellum animaduersionibus p. 67. contra omnes calculum secandi modos eorumque, quod vix euitari unquam possit, periculum finit; hancque a se commendatam methodum omnibus reliquis praeferendam esse docet; quae omnino, si eam in posterum etiam probauerit experientia, Cl. Auctoris laudes ex merito confirmabit.

XI.

A Dissertation on the ancient and noted Doctrine of Revulsion and Derivation: wherein the Absurdity of the Principles, on which the Notion of Revulsion was originally founded, is evidently demonstrated, and the immediate Consequences of Blood letting plainly prov'd, both from the Laws of the Circulation, and the obvious Effects of this and several other spontaneous and artificial Evacuations, in the Cure of Diseases, to be the emptying, exhausting those Vessels in particular, that more immediately communicate with the Orifice; and consequently that all Drains, whether by Bleeding, Issues, Setons, etc. should be made near, as they

conveniently can, to the Part affected. By
GILES WATTS, M. D. At Battel in Suffex.
London, Printed for George Keith. 1754.
8. mai. pagg. 69. sine praef.

i. e.

Super antiqua et nota doctrina de reuulsione et
deriuatione dissertatio, in qua principia, qui-
bus illa ab initio superstructa fuit, euidenter
absurda esse demonstrantur; simulque tum
ex legibus circulationis sanguinis, tum ex
obuiis venae sectionis, aliarumque variarum,
vel sponte sua vel arte factarum, illius euacua-
tionum effectibus, immediati sanguinis mis-
sionis euentus, in morborum cura, ei esse
clare probantur, ut ea in primis vasa, quae
cum illo inciso proxime communicant, va-
cua reddantur atque exhauriantur; indeque
sequi, ut omnes detractiones, siue per san-
guinis missionem, siue per fonticulum aut
setaceum praestari debeant, tam prope a par-
te affecta, quam demum fieri possit, susci-
pantur, necesse sit. Auctore AEGIDIO
WATTS.

In sui potissimum ipsius defensionem exarauit hunc
tractatum Cl. Auctor, quum erroris in curando
aliquo aegro commissi, a maleuolis dicti, accusare-
tur, cui apoplectico facto, ut sanguinis impetum ad
encephalon factum tolleret, venam in superiore va-
forum systemate secuerat, et ad illum in remotas ab
eo partes reuellendum, stimulantibus atque catharticas,
in aluum immittendas, curauerat lotiones, vesicato-
riis atque sinapismis simul inferioribus corporis artu-
bus applicatis. Neque mirum illud esse putat, quum

A GALE-

a GALENI in primis tempore ea de sanguinis reuulsione ac deriuatione inter auctores vix non omnes inuauerit opinio, ut ad partes, in quarum vicinia secta fuerit aliqua vena, sanguinis iusto maiorem copiam allici existiment, ideoque in remotissima aliqua corporis parte antea eam secandam esse, quam in vicino quodam obstructioni loco, si demum in eo aliqua aperire liceat, percutiatur: At magis etiam adhuc mirum esse, quod haecce quidem difficilis, sed ardua valde doctrina de eligenda, quae feriri debeat in morbis, vena in recentibus hisce nostris temporibus, postquam sanguinis circulationis leges detectae ac reliquae scientiae physicae partes admodum excultae fuerint, nondum satis exposita sit. Vt igitur, quantum in se esset, hancce inter medicos agitatam litem dirimeret, in hoc se inquisiuisse argumentum modeste narrat.

Totius libelli summam ipse eius titulus satis declarat. Ab initio enim veterum de reuulsione atque deriuatione proponitur doctrina. Scire licet, eos **p. 2.** plurimorum quidem morborum, inflammationis tamen potissimum, doloris atque tumoris, *fluxionem* variorum humorum ad partem affectam subito tendentem, causam esse proximam arbitratos fuisse; inter eos tamen, qui modo fiebant, impetu nempe irruentium humorum adhuc durante, et inter illos, qui iam facti erant, humoribus affectae parti iam impactis, distinxisse; eaque distinctione hanc suam superstruxisse doctrinam. Porro in genere aperire iubebant illa vasa, quae cum illis credebant communicare, in quibus imminuere volebant humorum redundantiam. Inde quoque nascebatur eorum do- **p. 5.** *ctrina de euacuatione κατ' ἄνω, e directo*, vasorum quippe ab uno loco ad alterum, siue per longitudinem, siue per latitudinem corporis, excurrentium; v. c. in lienis inflammatione sinistri, in illa vero hepatis, dextri brachii vena incidenda erat. Illam au-

- tem famofam de reuulfione atque deriuatione qui inuenerit doctrinam, primus fuiſſe dicitur HIPPOCRATES; eius tamen accuratas ſatis nullibi dedit notiones. Studioſiſſimus autem eius commentator, GALLENVS, omnes ſibiſque ſaepe contradicentes, ab illo traditas regulas inter ſe conciliare tentauit, illudque ad noſtra uſque tempora tam ſancte a multis obſeruatum, ſyſtema de eo argumento conſtruxit. Appel-
P. 9. lauit is ἀντίσπασι, reuulfionem, quando humori-
bus alium, illicque priori, quem antea habebant, prorfus contrarium conciliamus fluxum; παραχέτευσι vero, ſeu per canales vicinos deriuationem, quando ipſum ſtagnantem et obſtruentem humorem per incifionem, vel in ipſa affecta parte, vel in aliqua vicinarum partium, factam, euacuamus. Vti enim ex
CELſO *, contra hanc ſententiam diſputante, clare ſatis apparet; ſanguis quaquauerſum ad incifum locum et adiacentes partes, non ſub illa ſolum phlebotomiae operatione, ſed et per longum ſatis adhuc tempus poſt illam, affluere, idque ipſum, quod iam grauatum ſit, euocari; ideoque in morbis incipientibus quam longiſſime inde, ubi laederet, ad eum in oppoſita loca reuellendum; in iis autem inueteratis ex ipſa affecta parte, qui iam ibi haereret, emittendus
P. 15. eſſe credebatur. Ab omnibus ea quidem recepta non erat opinio, quum eſſent, qui a contraria parte ſtabant, exiſtimantes nimirum, vaſa incifo loco vicina non grauari, ſed exhauriri potius: illa tamen nihilo minus praeualebat; licet, quum contra omnem eſſet experientiam, dubios redderet ſuos deſenſores, adeo, ut in morborum declinatione ſic dictam deriuationem admitterent; quae tamen, ex ipſis eorum principiis, aequae tum temporis habenda erat nociua, ac antea, propter metum quippe, ut nouus humorum ad partem affectam fluxionis impetus excitaretur.

Ad

* Lib. II. Cap. 10.

Ad conficiendam itaque totam illam litem, haec p. 18. omnino dirimenda erit quaestio: Num sanguinis missio exhauriat, an grauet, vasa illi inciso adiacentia? Quem in finem primo utramque hanc quaestionem ad sanguinis circulationis leges Cl. Auctor examinat, illarum utra his quam maxime conueniat? Deinde ad obuios tum spontanei, cum arte facti, sanguinis profluii effectus respicit, quantum hi ad sententiam reliquis magis inuentam probabilem adhuc magis concurrant confirmandam.

Omnis inuestigationis inde capit exordium, ut varias, quae progressiuo sanguinis motui obueniunt, resistentias enumeret, quippe quae sunt: Sanguis ipse arterias semper replens, tam in earum systole quam diastole: Tunicarum, e quibus illae sunt contextae, elasticitas; ita ut post diastolen se contrahentes, ab impulsu nouiter irruentis sanguinis distendi debeant: Varii flexus et anguli, quos pro situ atque distributione variis, experiuntur haec vasa: Conica arteriarum figura, quae omnium earum singulis ueritalis est; licet cunctarum ab aorta secedentium lumina coniunctim considerata, huius maximi uasis lumine maiora sint, ut illud hoc respectu vas dici possit conuergens: Illae denique partes cunctae, quae arteriis circumiacent et pro diuersa sua indole magis vel minus reliquas iam iam recensitas augent resistentias. Post haec de sanguinis illo progressiuo motu, per ve- p. 20. nas continuato agit, eumque arteriarum quidem viribus, cordis tamen potissimum ad ipsas pertingenti vi,tribuendum esse contra Cl. WHYTT* non inde solum probat, quod in ranae pulmonibus obseruati oculo clarum illud fiat; sed et compressa arteria, aut animi accedente deliquio, sanguis ex incisa uena fluere desinat; idque etiam, praeter iniectiones anatomicas,

* Essay on the vital and other involuntary motions of Animals. vid. Comment. nostr. Vol. I. P. IV. p. 589.

micæ, ex variis morbis, tenerrimas partes occupantibus, v. c. erysipelate, oculorum tunicae albugineae inflammatione, uti etiam ex sanguinis celeritate in minimis vasis maiore observata, quam ex calculo rationis inter eorum areas ad aortae lumen ducto, suspicari quis posset; quippe quod celeritatis augmentum cordis vi adscribendum sit. Maiorum tamen etiam arteriarum elasticitati, et earum minimarum aequæ ac talium venarum oscillatorio motui aliquid dandum esse concedit. His præmissis, ad ipsius quaestionis solutionem redit.

P. 23. Ipsa venae alicuius sectio in genere sanguinis imminuit quantitatem, certoque modo primam ex resistentiis iam adductis, tollit, ideoque liberiores per suos canales transitum humoribus conciliat. Magis ea adhuc de particulari parte, e qua sanguis missus fuit, valebunt. Quo enim expeditius per inflictum vulnusculum, ac antea per ipsam venam, exit sanguis, eo quoque minor non per hanc tantum incisam venam, sed per arteriam quoque ei respondentem, ac utriusque ramos, illi transituro oriatur resistentia. Porro ex legibus hydraulicis, sub ipsa venae sectione, sanguinis in hancce arteriam irruentis eadem erit ratio, ac illius, qui per venam exit, maior nimirum aut minor, quo maior vel minor eius copia emittitur. Itaque, quoniam tum temporis vena cum sua arteria eodem modo, ac antea, plena est sanguine, derivatio, stricte et ex eius prima determinatione loquendo, locum habere non posset, si iam iam dicti venae sectionis effectus essent unici. Verum enim vero sanguinis copia non in genere tantum decrescit: sed eius quoque refluxus in venam caavam intercipitur, ideoque illa sanguinis quantitas in ista vasa, quae cum incisa vena communicant, nunc denuo immittenda, minor, ideoque eius etiam resistentia in qualibet vena minor erit, corde simul non minorem modo sanguinis copiam, sed et hanc non priore, at imminuta

nuta potius, sui ipsius vi, emittente. En causa, cur vasa nec extraordinariam sanguinis quantitatem, illi effluenti aequalem recipiant, nec in eodem distentionis statu, ac antea, permaneant! Ut res fiat clarior, p. 25. pone viginti sanguinis libras duobus singulis horae minutis per totum vasorum systema circumduci, et eodem temporis spatio, sexagesimam circiter eius partem, quatuor circiter uncias, per venam brachii medianam fluere; porro, eodem adhuc tempore, ex incisa illa vena duodecim eius uncias emitti: patet, octo unciis maiorem eius copiam in communicantem arteriam irruere debere eodem tempore, si vasa eandem retinerent copiam. Illud autem fieri non posse, non solum ex iis, quae iam dicta sunt, colligere licet: sed eius quoque mutationis aliquale certe signum ex illa communicante arteria, tangenti digito pleniore et fortiore apparente, desumi posset, si tam insigniter aucta sanguinis copia uno tempore per illam traiceretur: sed nihil adesse insoliti deprehenditur; ideoque et inde patescit, sanguinem nec maiore quantitate, neque fortiore impetu in vasa illi inciso vicina irruere; ac inflammationem igitur, si qua ibi praesens sit, aut aliquam forte fluxionem dictam inde non augeri; quin ea potius vascula, quae cum illo inciso communicant, exhaustiri. Quid? Quod veri simile sit, p. 27. ipsam arteriam incisae venae respondentem, tantam post venae sectionem haud recipere copiam, ac ante illam adduxerat. Qua occasione in b. FREIND, BUTLER, aliosque animaduertit Cl. Auctor, eos in errorem inde se deduci passos fuisse, quod, anteriore seu proximae resistente sanguinis columna per sanguinis missionem adempta, eius ipsius nunc maiorem quantitatem allici existimauerint, ad emissam illius copiam haud satis respicientes; quippe quae triplo minimum maior sit illa copia, quae ante venae sectionem per illa vasa fluxerit. An volumini illius partis, e qua mittitur sanguis, ab exhaustis vasis diminuto,

minuto, adscribendum erit, quod ligatura, inciso loco applicata, post aliquod tempus ut plurimum laxior fieri soleat?

Arteriotomen praeferre non nulli solent phlebotomiae. Num iure? Idem fere utriusque esse videntur effectus: in eo tamen casu, ubi incidendum aliquod vas immediate communicat cum obstructis, humorem, statim sua iam corrumpi coeptum facilius educere posse videtur phlebotomia. Vulnuscule venae clauso, sanguinis circulatio ad pristinum statum illico reuertitur, siue quoduis vasculum iustam, qua cordis vi resistit, sanguinis iterum recipit quantitatem, adeo ut venae sectionis usus in singulari aliqua parte expectandus, ipso durante sanguinis profluvio diutius haud persistat. En spes inde vana in tumoribus iam diu praesentibus aut inueteratis doloribus!

p. 29. Particularis etiam venae sectionis usum ex iam dictis a priori, ut aiunt logici, intelligendum, confirmat adhuc experientia. Sanguis enim, per nares prorumpens, quantum saepe leuat morbos capitis? Inter prognostica eius signa, cervicis dolorem, gravitatis sensum in temporibus, obnubilationem visus, rubicundum faciei colorem, e. s. p. refertur etiam a multis medicis hypochondriorum calor atque tensio, ex quo signo certum aliquem inter nares atque hypochondria consensum intulit Ill. VAN SWIETEN, quod tamen a repulsione potius et accumulatione sanguinis ad maiora cordis vasa facta, propter alia in superiori vasorum systemate obstructa, eriri Noster

p. 33. autumat. Spontaneus interim ille naturae motus adeo salubris esse observatus fuit, ut inde arterias temporales venasque iugulares aperiendi occasionem sibi dari existimauerint vix non omnis ferme acui medici. Quin et veri esse videatur simile, veteres singulari aliquo, licet notis haud cognito, usos fuisse modo, quo narium haemorrhagiam arte chirurgica excitauerint. Anginae poro egregie mederi venae sectiones

sectiones in vicina aliqua parte, v. c. venis raninis, ab initio morbi institutas, experientia saepe docuit; licet in hoc etiam morbo alii medici, et inter eos quoque Ill. VAN SWIETEN, ex illa iam saepe dicta opinione praeconcepta, largam sanguinis missionem in remota aliqua parte antea suadeant. Nisi enim ita, ut exhauriat proximum locum, haec ipsa iuvet operatio; sin potius sanguinem attrahere tumoremque inflammatorium augere valeat, suffocationis metum ea nullo non tempore afferet; id, quod tamen et ii, qui contrariam defendunt sententiam, ipsi fieri negant. Aliae porro tum arte factae, tum quoque naturales evacuationes in particularibus morbis ideo utiles esse videntur, quod illae prorumpant e vasis, quae cum aliis affectae partis communicant, haecque nimis repleta exinaniant. v. c. Haemorrhoidum fluxum in visceribus abdominis obstructis; sic et ulcera exteriorum corporis partium arte excitata, in omnibus internis suppurationibus; uti et scarificationem laesae alicuius partis, prodesse constat.

Ante vero, quam de his evacuationum generibus, quatenus eorum effectus suam de sanguinis missione confirmet sententiam, amplius loquatur, oppositioni cuidam, quam ipsi a non nullis moveri posse praecidet, obuiam it Cl. Auctor. Spontaneae nimirum, dicere quis posset, haemorrhagiae ut plurimum sistuntur, sanguine in extrema aliqua corporis parte misso: Nonne inde colligere licebit, ad inflatum illud vulnusculem omnem sanguinis molem magis attrahi? Verum enim vero illum huius sanguinis missionis effectum soli plethorae imminutioni tribuendum esse inde patet, quod in copia sanguinis imminuenda saepe sola haemorrhagiae curatio posita est, ideoque haec ipsa saepius sponte cessat. Deinde, id, quod maioris adhuc esse videtur ponderis, ex eadem ratione, qua ad incisam venam sanguis ruere dicitur, ad illam quoque sponte factam vasorum aperturam
omnis

omnis tendere posset cruoris copia ibique effluere, vita illius aegri vix non semper peritura; quod tamen contra omnem pugnat experientiam.

- P. 47. Prima igitur ex iam dictis euacuationibus sanguinis missioni analogis, in cuius naturam inquirat Cl. Auctor, est formatio abscessus seu praeparatio puris, quippe quae, quo demum cunque modo fiat, certe inflammationis symptomata imminuit et, pure deinde emisso, prorsus tollit. En immediata via, quam ipsa incedit natura ad deplenda, quae distendebantur nimis, vasa! adeo ut, suppuratione diu protracta,
- P. 49. pars ista affecta valde emacietur. Ex egregiis inde observatis effectibus factum etiam esse videtur, ut similia ulcera per fonticulos aut setacea, similique arte efficerent medentes; de quibus tamen omnibus nulla fere inter medicos umquam orta fuit dissensio, illa eo esse utiliora, quo propius a parte affecta applicari queant *. Quin et populi omnium artium imperiti, rudes atque ignari, ideoque nullis seducti doctrinarum hypothesebus, sed soli tantum innixi experientiae, semper ad laesam partem tam prope, quam fieri poterat, talia efficiebant. Praeter id etiam parca illa humoris copia in eius generis ulceribus excerni solita, innuere videtur, vicina tantum, quae iam af-

fecta

* In his aequae ac sequentibus, quae de ulceribus arte, in primis per unctionem factis, dicta sunt, Cl. Auctor nimis parum ad illam respexisse videtur irritationem, quae in nervis fit, et qua non vicinae solum partes ad fortiorem contractionem stimulari, sed et inde maior omnino humorum copia allici, ideoque verae reuulsioni, vel simili certe morbi mutationi, locus dari, videntur, quia morbosum humores nunc in alio loco, ulcere nimirum facto, copiosius se- et excernantur, quam antea fiebat, ubi illi fere omnes ad illum locum deferebantur, qui, forte propter diuturnitatem morbi, reliquis partibus laxior, ideoque ad illos recipiendos et excernendos aptior factus fuerat.

fecta sunt, vascula inde exhauriri; v. c. in rheumatismo fixo, dolore ischiadico, serophulosis tumoribus, e. f. p. ut morbis a vasis obstructis nimiaque grauatis morbosorum humorum copia ortis: illud siue fiat per obstructorum vasculorum eiusue lateralium oscula immediate in ulcus hiantia, vel per eorum communicationem seu *inosculationem* dicendam; sublata nunc in extremis resistentia, cordisque ideo vi morbosum humorem facilius propellere potente. In p. 54. cuius rei confirmationem narrat Cl. Auctor exemplum feminae, cui canerosus tumor in brachio fuerat extirpatus, dein vero repullulare visus, fonticulo prope illum locum excitato, perfecte sanatae

Vlcera quoque artificialia, in anteriore colli parte excitanda, contra binos alios aequae funestos morbos commendat, bronchocelen et hydrophobiam; quum illa a faucium regione et glandula potissimum thyroidea nimium tumidis factis; haec vero, symptoma eius certe pathognomicum, aquae scilicet horror, a rima glottidis vicinisue partibus spasmodice constrictis, veneno hydrophobico critice quasi ad has partes deposito, oriri videantur. Eadem huc usque p. 56. dicta de methodo per cauteria vel etiam scarificationem curandi morbos, quoque valent, quae tam prope, ac fieri poterunt, a parte affecta cum felici successu applicabitur.

Si quis autem interroget, quaenam inter has iam p. 58. iam recensitas euacuationes, istamque per venae sectionem praestandam intercedat conuenientiam? is scire debet, eas omnes modo *quoad plus et minus*, vel in ratione demum ad diuersam emittendi humoris copiam habita, a se inuicem differre, ita, ut respectu tum phlebotomiae, cum aliarum euacuationum, generalis valeat regula: eas omnes, si aegro debeant esse proficuae, fieri debere ex illis vasis, quae proxime ipsi parti laesae adiacent.

p. 63. Postquam deinde ipsas iam expositas reuulsionis atque deriuationis notiones a non nullis auctioribus inter se commutari animaduenerat Cl. Auctor: ipsemet illas ita determinat, ut *reuulsionem* eorum remedium dicat esse operationem vel effectum, quae partes, quibus applicantur, stimulando, maiorem sanguinis copiam ad eas inuitant, ideoque, si illae fuerint remotiores, circulationis vim a parte affecta auocant; *deriuationem* vero illorum vim, quae obstruentes humores per proximam aliquam partem a loco affecto deriuant atque emittunt. Ad illam itaque pertinent cathartica, vesicatoria, sinapismi; e. f. p.; ad hanc autem sanguinis missio, fonticuli, setacea, e. f. p. Venae sectionis itaque effectus citi sunt et transitorii; illi autem fonticulorum similiumque euacuationum lenti magis atque tardi; hinc illi in acutis, hi potius in chronicis morbis, locum habebunt. Inter reuulsionis remedia prima et reliquis efficaciora sunt cathartica; post haec veniunt vesicatoria, eo tamen in primis respectu magni habenda, quod partibus corporis quibuscunque applicari queant; circa quae tamen, ut usitatis illis remediis vesicantibus alia substituantur magis tuta, Cl. Auctor optat. En totius tractatus summa, de quo, ut argumento difficili inter omnes certe medicos nondum penitus confecto, ferendum iudicium lectoribus nostris relictum esto!



XII.

Quaestio medica: Vtrum *Aquitaniae* minerales aquae morbis chronicis? Praeside IOANNE BAPTISTA BASSEVILLE; proponebat THEOPHILVS DE BORDEV, thesios Auctor. Parisiis, 1755. 4. pl. 9 $\frac{1}{2}$.

Thesios huius Auctor, si recte quidem iudicamus, est idem, qui quaestionem: *An omnes organicae corporis partes digestionem opitulentur?* quam praecedenti volumine* adduximus, proposuit. Omne in quinque partitum est sectiones opusculum. A p. 2. primis medicinae principiis orditur Cl. Auctor, et in prima sectione, quae XLVIII theses continet, physiologiam, morborumque pathologiam praemittit, quibus tamen omnibus facile supersedere potuisset, nisi paradoxas eique prorsus singulares interdum foueret opiniones, quas, quia sequentes ex hisce cogit, ut lectores antea scirent, necesse erat. GUILIELMI BALLONII, celebris praeteriti seculi medici, in primis sequi videtur principia, quem ideo multum laudat. Veterum medicorum monumenta diligenter legit, saepiusque citat: eorum tamen placita ad suam plerumque vertens mentem. Sunt secundum p. 6. illum, in qualibet vera inflammatione unicum aut plura centra, veluti *nuclei*, aut textus cellularis lamellarum compressiones, hinc coalitiones. Organum igitur cellulare, *textusue mucosus* praebet sedem in inflammatione: praebet praeter ea textus ille cellularis *mucosam* materiem, aut *gelatinosam*, ex qua coalitio fit et augetur. Materies illa succus est nutritius, in lamellas adhuc non recte extensus, qui multis in morbis turgescit in sanguine, dum a textu cellulari non excipitur. In omni itaque fere morbo adest in sanguine plethora succi nutritii, et, quae sanguini innant,

T 2

tant,

* Vol. III. P. II. p. 266.

tant, concretiones in acutis et chronicis, nil nisi fucus idem redundans, quoniam textus cellularis nutritioni non vacat.

- p. 13. In morbi cuiuslibet curatione intendere debet medicus, ut morbus praeuertatur atque solvatur, quantum fieri potest, veluti excretio simplex aut naturalis digestio. Omnis enim morbus, dum sanatur, praesertim secundum naturae normam excretionem aliquam definit, aut soluitur, siue sit acutus, siue chronicus. Morbus tandem chronicus illi est, omnis affectio, acuta fieri non potens; vel morbus, qui facile concoqui nequit; acutusque vel intempestive castratus, vel non omnino terminatus, chronicus fit, ex simplicissimo etiam affectu ad morbum usque magis complicatum adscendens.
- p. 15.

In sectione *secunda* observationes LXXII. referuntur, quae diuersos morbos continent, qui *Aquitaniae* aquis sanati sunt. *Aquitaniae* autem fontes, de quibus hic potissimum agit Cl. DE BORDEU, quinque sunt numero: *Bareges*; *Bannieres*; *Cauteres* (*dans le Bigorre*); *les eaux Bonnes*; *les eaux Chaudes*, (*dans le Bearn*). Ob calorem, quem possident, thermac nominandae. Quatuor ex his odorem habent veluti sulphureum; argentum nigro colore tingunt. *Bannieres* vero nec odorem illum habent, nec alium, neque argentum inquinant. Et haec fere sunt omnia, quae de harum aquarum natura ac indole habet Cl. Auctor. Examen enim physicum aut chemicum, cum his aquis institutum, uti equidem sperabamus, hisce pagellis nullibi inuenimus. An hoc fortasse factum sit in opusculo, quod 1746 sub titulo: *Lettres contenant des Essais sur l'histoire des eaux minerales du Bearn et du Bigorre*, edidit, et quo aquas has, uti ipse ait, medicus expendit, ignoramus, quia dictas videre litteras nobis nondum licuit.

Observationes autem, vel ipse in fonte collegit Auctor, tunc mineralium omnium aquarum in *Aquitania*,

tania, Inspectoris Regii officio fungens: vel ex Cl. MEIGHAN, qui 1742 opus circa aquas *Bareges*, anglico idiomate: *a Treatise of the nature and powers of Bareges baths and waters*, London, 1742. publicavit, excerptae: vel ex Cl. Patris, ANTONII DE BORDEV, Medici Monspeliensis opère, *Dissertation sur les eaux minerales du Bearn*, à Paris, 1748. reuocatae sunt. Morbi, quos prae aliis hae aquae sanarunt, p. 18. fuere morbi ventriculi, intestinorum, lienis et hepatis obstructi, uteri inordinate fluentis, pectoris debilitati, haemorrhoides, catarrhi, asthmata, hemi-crania, rheumata. Hos morbos *sympathicos* nominat Cl. Auctor. Sequuntur nunc morbi partium solida p. 32. rum, seu stricti et laxi, quos *idiopathicos* appellat et sectione *tertia* tractat: licet ipse fateatur idiopathicos cum sympathicis saepe complicari, ut inter eos nequeat afferri diuisionis punctum. Plures quam quinquaginta affert observationes, quibus probat eiusmodi morbos his aquis curatos esse. Huc pertinent tumores oedematosi, varicosi, fluxus pituitosi, mucosi ex vesica et partibus genitalibus; nec non partium imminutio, exsiccatio, marasmus. Sic mulieri luxatus fuit humerus in superiori articulo, brachium postea emaciabatur, contrahebantur et exsiccabantur tendines, digiti adunci fiebant. Stillicidium p. 39. *Bareges*, balnea aliquot temperata, potusque aquarum parti motum pristinumque statum conciliarunt. Viri femur ex pertinaci rheumatismo contabuit: parti medelam attulere aquae *Bareges* more solito adhibitae per tres annos. Ulcera quoque, proprietate specifica, sanare dicuntur aquae *Bareges* et *Bonnes*. In nulla corporis parte ulcera sanata non vidit Cl. Auctor. Callositates vero illis aquis resistunt, licet aliquae illis soluantur.

Commotionem in primis febrilem excitant aquae p. 42 *Bareges* et *Bonnes*; praeter ea ad partem affectam humorum copiam emittunt, nec deest forsan, secundum

cundum Cl. Auctorem, humoribus illis vis cicatricem fundens, unde cicatrix vetus aperiatur, necessum est, noua cicatrice orta, quae spatium vacuum replet. Vteri haemorrhagiam, dolores, motusue conuulsuos, ex utero duro et indolente oriunda, composuere balnea et iniectiones *Bareges*. Vteri ulcus, quod abdominis musculos perforauerat, ita, ut aqua iniecta in vaginam, per infimi ventris parietes exiret, et vice versa, *Bareges* sanatum esse contendit Cl. Auctor. Per vulnus ad pubem in vesica glande plumbea inflatum, urina fluebat sponte. Huic fistulae sanationem conciliaffe dicuntur aquae *Bareges*, quid? quod duo ulcera vesicae confirmata, a causa interna, sanata se vidisse credit Cl. DE BORDEV. Iuuenes, quorum glandulae mesenterii tumeabant, aquae *Cauteres* admodum subleuarunt. Lienem tumidum in puero tum et in adulto discusserunt aquae calidae *Bareges* balneaque temperata. Ex peripneumonia puris sputator febre laborans cum macie et debilitate potu aquarum *Bonnes* excreationem copiosiore primo expertus est, postea pelliculas, scilicet vomicae cystidem cum sputis elicuere aquae caedem pectusue expedire, viribus et obesitati consulendo. Cataractam aquis *Bannieres* resolutam fama quidem haberi proficitur: morbum tamen hunc *Bareges* et alibi obfistentem vidit. Ast cicatriculas, aut callositates in cornea, inflammationis effectus, imminutas aliquatenus obseruauit, aquis *Bareges* et *Bonnes*. Paralyti affectos septem numero annotauit *Bareges* anno 1751, qui quidem satis subleuati, non tamen omnino sanati sunt. Senis, hemiplegia tentati, crus, non autem

p. 46. brachium, subleuarunt aquae *Bannieres*. At enim vero, quum morbi incurati et incurabiles multum doceant rerum peritos, in quarta sectione *insanatos* harum aquarum ope, *insanabiles* et *dubios*, scilicet eos, qui sunt in ambiguo, refert, nec suos, nec aliorum tacens errores. Sic paralyticos plurimos obseruauit,

p. 48.

seruauit, quorum aliis nil proderant, aliis autem euidentissime nocebant aquae supra laudatae. Et quoniam thermae in genere caput magnopere replent: in epilepsia et vertigine non nisi caute thermas harum aquarum admittendas esse ipse fatetur. Morbos pectorales in corde idiopathicos, pulmonum affectus idiopathicos, cum haemoptysi et asthma coniunctos, inter morbos ponit *incurabiles*. Hisce adiungit ulcera, cariem, marasmoideasque dispositiones.

Post ea de morbis agit, in quibus nondum satis p. 52. compertum est, quid praestent aquae illae minerales: morbos eos *dubios* appellat. Huc refert morbos articulares, rheumatismos, podagram, calculos renum atque vesicae, quos interdum excerni aquis hisce affirmat. Vlceribus herpeticis et cancris nihil profuere aquae, potius malum auxerunt. Gonorrhoea virulenta et lue venerea laborantes plures curatos, quam incuratos, animaduertit Cl. Auctor: sed panaceas suas, mercurialesque inunctiones in usum saepius vocauit: hinc dubium, utrum aquae, an mercurius malum abstulerint. Ipse enim hanc objectionem praecidens adiicit: *haec historice narrata* p. 60. *sunt, nec dicant nos morbum venereum aquarum nostrarum ope curari contendere; id enim neque putamus, nec proponimus.*

Tandem contra HOFFMANNVM, qui minerales aquas in scorbuto multum commendauit, asserit illas in hocce morbo minime esse adhibendas, quia ter vidit scorbutum, cui aquae saepe dictae fuere lethales. Sed, si recte equidem iudicamus, b. noster HOFFMANNVS de alio loquitur scorbuto, qui hypochondriacis valde infestus est, et mineralibus omnino curari potest aquis, licet, ut verum fateamur, inadaequate scorbutus audiat, quam de quo Cl. DE BORDÉV egit. Harum aquarum adhuc explicanda rema- p. 63. net vis et actio, qua morborum excretionibus (mor-

bus enim omnis excretionis labor habendus) fauent
 vel nocent, quod in sectione *quinta* praestare anniti-
 tur Cl. Auctor. Quibus praemissis, aquas *Bannieres*
 diureticas, purgantes, tonicas pronuntiat: aquas
Bonnes bechicas: aquas *Bareges* diaphoreticas, re-
 laxantes utraque habet: aquas *Cauteres* et *Chaudes*
 veluti medias inter aquas *Bannieres*, *Bonnes* et *Ba-
 reges*, easque stomacho potissimum dicatas iudicat.
 Verum mineralis aqua, si omnis ad sanguinis vias
 transmittatur, num mineralia sua secum vehat, valde
 dubitat. In visceribus enim minerales aquas digerere,
 dissolvere, decomponi suspicatur, vel ex eo, quod ea-
 rum multae excrementa nigricante colore inquinant
 etc. defaecatam igitur et subtiliorem aquam forsan
 solum lacteas vias subire credit: Mineralia, qui ad
 sanguinem transuchi affirmet, saltem a salis GLAUB-
 BERI et marini minima quantitate effectus fere nul-
 los produci fateatur, necessum esse: Salis enim ma-
 rini, tum et GLAUBERI, aut salium terreorum
 quantitatem maiorem in prandio uno saepe assumi,
 quam in mineralium aquarum (saltem harum) per
 dies quatuor potu: Aquarum igitur *spiritus*, gas,
 aut quidquid sit, ad sanguinem transferri dicendum,
 et ad organa, quae excitat: neque per circulationis
 vias duci se pati putandum.

p. 72.

In fine harum adhuc thermarum gradus caloris,
 in thermometro Farenheitiano annotatos, adiicit.
Bannieres fontes, sunt autem triginta aut triginta
 duo, reperiuntur calidi a gradu 82 ad 124 circiter:
Bareges, octo fontes, a gradu circiter 86 ad 115:
Cauteres, fontes septem aut octo, a gradu 102 ad
 120: *Bonnes*, fontes tres, a gradu 90 ad 102: *Chau-
 des*, fontes tres, a 92 ad 114 gradus, eosque quan-
 doque paululum augeri, aut imminui calore, exper-
 tus est Cl. Auctor.



XIII.

Physicalische Belustigungen. Erstes bis vier und zwanzigstes Stück. Berlin, bey Christian Friedrich Voss. 1751. 1752. 1753. 1754. Erster Band 2 Alph. 3 Bogen, Zweyter Band 2 Alph. 4 Bog. Ein bis vier und zwanzigstes Stück, 20 Bogen.

id est:

Deliciae physicae. Pars I ad XXIV. 1751 ad 1754.

Has quidem *delicias* vel eam ob causam filere non possemus, quia de scriptis, quorum partes per intervalla prodeunt, omnibus dicendum nobis existimauimus; sed praeter ea illae etiam rerum ubertate et praestantia se commendant, ut commemoratu dignissimae sint.

Primus illarum auctor CHRISTLOB MYLIUS fuit, post cuius obitum adhuc, etsi lentius, continuantur. Licebit vero hac occasione de MYLIO ipso quaedam dicere, ubi utemur scripto, quod memoriae eius seruandae destinavit Cl. KAESTNER, et primo quidem separatim edidit, post deliciarum harum parti vicesimae tertiae inseruit. Usus vero est KAESTNER V S illis, quae habet Cl. MYLIUS A.M. Ienensis in Historiae suae Mylianae, Ienae 1752. editae, Part. I. §. 14. p. 105. a defuncto accepta; sed plura etiam, quod ipse MYLIO familiariter usus est, addidit.

Natus erat CHRISTLOB MYLIUS Reichenbaci, in pago Lusatiae superioris, patre verbi diuini ibidem ministro, d. II. nouembr. 1722. Litteris praeter scholas inferiores unice Lipsiae vacauit, medicinae operam nauans, sed omnium, quae natura continet, feruidus et indefessus scrutator, mathematicum etiam, sine quibus naturae cognitio nulla est, perquam studiosus. Ita cum in botanica assiduus esset, simul in-

secta sedulo collegit et accurate contemplatus est, tum metamorphoses illorum observando, tum ipsa cultro anatomico subiiciendo. Fossilia quoque et mineralia ut cognosceret, laboravit, Cl. K A E S T N E R V M aliquando Freibergam sequutus, sicque ex omnibus naturae regnis thesauros non contemnendos accumulavit. Coelestium vero videndorum curiosissimus, eclipsicos annularis gratia 1748 Berolinum abiit, ibique deinde consedit, donec ardori illi, quo regiones exteras inuisendas semper optauerat, societas quaedam subueniret, directore Ill. DE HALLER, impensas ei subministratura, quo per triennium Americae partes quasdam, illas praecipue, quae Anglis et Batauis incoluntur, et iis vicinas ignotiores permigraret, quaecumque natura ibi offert, observaret et describeret, colligeret etiam diuitias eius generis, inter eos, qui sumtus itineris faciebant, diuidendas. Eo igitur fine, martio 1753 ineunte, Berolino abiit, Lipsiae primo valedicens, deinde Saxoniam inferiorem peragrans, in Hollandia etiam, et tandem Londini commoratus, ubi peripneumonia nocte inter 6 et 7 martii 1754 obiit. Scripta eius, quae plura edidit, ad naturae cognitionem non omnia pertinent; nam elegantiores etiam litteras assidue nec infeliciter tractavit, saepius adeoque naturae elegantiam stilo poetico depinxit. In primis vero a nobis hic commemorandae sunt plagulae dimidiae, ab eo singulis septimanis hic per integrum annum 1748 editae, *Physici* titulo. (*der Naturforscher*) In *deliciis etiam litterarum severiorum et elegantiorum*, quae ante aliquot annos Lipsiae prodierunt, (*Belustigungen des Verstandes und des Witzes*) quaedam eius physica habentur; quae cum aliis iunctim nuper Berolini *Miscellorum* MYLII (*vermischte Schriften*) edidit Cl. LESSING. Londini HOGHARTI *analysin pulcritudinis* vertit, et zoophytum quoddam, ex mari Groenlandico adlatum, in epistola ad Ill. DE HALLER descripsit; legitur

gitur illa *deliciarum* Parte 24. Ea occasione, cum Cl. MYLIVS anglis innotuerit, nam et scriptum hoc anglice redditum est, filere non debemus, cum perperam pro *Boruffo* habitum esse: huius enim gentis nomen ipsi Cl. MARTY, in bibliotheca Britannica, uno alteroque loco tribuit.

Iam ad *delicias* ipsas progrediamur. Nihil vero prodesset plurium, quibus constat, scriptorum brevium longus catalogus: igitur pauca quaedam saltem indicabimus.

In praefatione monet Cl. MYLIVS imitaturum se, quantum possit fieri, *promptuarium Hamburgense*, excerpta ex libris tamen non daturum, utilia sectatorum, praecipue quae ad oeconomiam et commercia pertinent, non tamen neglecturum, quae philosophum delectent, cum et haec suo modo utilia sint, et ex iis saepe numero illa vulgi utilitas exsistat.

Part. I. art. 3. habetur, MYLIO auctore, *idea p. 11. observatorii meteorologici instrumentis scilicet instructi*, quibus ventorum directio et vis, pondus atmosphaerae et reliquae conditiones, similiaque cognosci possint.

Art. 5. Coccionellae historia, documentis illustra-*p. 43.* ta. Ex Batauo vertit MYLIVS. Ostendit praecipue coccionellam insectum esse. In sequentibus partibus continuatur.

*Art. 8. Modi duo traduntur, aues collectioni vo-**p. 76.*
lucrium destinatas servandi. Cl. REAUMVR eos Cl. BOSIO perscripsit. Minores auiculae septem vel octo dies in aquam, quam *reginae Hungariae* vocant, deponuntur, deinde rei cuidam molli imponuntur, attenditurque, ut pennae in situ naturali remaneant. Maiorum exenteratarum venter et collum calce viua in puluerem redacta replentur. Si aestate aliorum transmitti debeant, receptaculo, cui induntur, stratum calcis viuae inspergitur; hieme eo opus non est.

Monet

Monet Cl. Auctor sic ornatum quidem, quem far-
ctae aues praebeant, non tamen id, quod essentiale
collectionis est, perire. Vidisse se auiculas Surina-
mensis tabacò repletas, quae situm naturalem satis
bene retinuerint, addit idem.

p. 81. *Part. II. art. 1.* legitur *historia palmae dactyliferae*,
quae cum octoginta fere annos Berolini floruiſſet,
fructus etiam tulisset, sed abortiuos, maturos tunc
demum tulit, cum flores masculini, Lipsia ex horto
CASPARIS BOSII missi, spathis femininis appensi
fuerint. Adiicit Cl. MYLIUS observationes, sexum
plantarum confirmantes alias, a Cl. MICHELMAN-
NO, horti regii inspectore, mature nimis extincto,
in lentisco et terebinthina institutas. Varietates ex
pulvere antherarum, in plantam alius speciei delato,
nasci, etiam experimentis probabile reddit.

p. 161. *Part. III. art. 1.* Cl. LEHMANN, iam consilia-
rius rei metallicae regis Borussiae, *lapidis sterilis in
mineram cupri mutationem* narrat, variaque ad simi-
les mutationes pertinentia subiicit. Sunt huius viri
plures in his *deliciis* dissertationes, de re metallica
cum fructu legendae, descriptiones etiam, ut *fodina-
rum lapidis calcarei Riedersdorfsium Part. VI, ther-
marum Freyenwaldensium et cocturae aluminis, quae
ibi perficitur, Part. VII. cet.*

Cl. HOPPII etiam, mercatoris Gerani, naturae
curiosissimi, leguntur variae observationes, de den-
tibus ceruinis aurei coloris, regionis circa Geram
descriptio, de ligno petrefacto Coburgensi, de me-
morabilius plantarum, cet.

p. 448. In epistola quadam, quam Cl. MYLIUS ad Cl.
KAESTNERVM esse coniicimus, etsi nomina addita
non sint, (*Part. XVI. art. 4.*) illud palmae floribus
masculinis fecundandae experimentum, alio modo
repetitum sistitur. Fecundatio scilicet florum mascu-
linorum

linorum ope peracta est annis 1749. 1750. 1752. Anno 1752, nullis floribus masculinis applicatis, fructus non maturuerunt, sed exigui et immaturi permanserunt, uti ante anno 1749. Palma tamen hoc anno egregie floruit, ut ab eius quidem parte nihil maturitatem fructuum impediuerit. In eadem epistola singularis causa diarrhoeae, a Cl. LINNAEO Cl. MYLIO perscripta, narratur. Auditor aliquis Cl. LINNAEI in hunc morbum repetitis vicibus incidit. Praeceptoris igitur consilium sequutus, excrementa examinavit, et in illis acarorum (*Mülben*) exiguarum myriades reperit. Eas postea in vase, ex quo potum hauriebat, etiam inuenit, et semper diarrhoea rediit, quoties ex hoc vase potarat. p.453.

Part. XVIII. art. 3. memorabiles electricitatis in p. 511.
morbis tollendis effectus describit D. PAUL. PAULSON, medicus Dorpatii in Liuonia. Pauper quidam aetatis circiter 30 annorum, ante septem annos, Petropoli graui morbo linguae usum omnem perdidit; sensus vero et motus lateris dextri solum perierunt. Vnice sonum hunc: *te, te*, edere poterat, brachium dextrum contractura laborabat, sensu carens et exsiccatum, nullaque vi digiti in rectum extendi poterant, ossa cute sola tecta, nulla interposita carne videbantur. Similiter comparatus erat pes dexter. Huic homini, datis primo per tres septimanas generalibus, quae secretiones et excretiones promouerent, electricitas quotidie hora integra vel dimidia applicata est; paucos post dies pungi se, cum manus durante operatione electrica tangeretur, sentit, nono die loqui coepit, balbutiens scilicet, tempore minutorum quinque, voces has: *Maria Bocho-rodiza, Maria Deipara*, pronunciauit. Electricitate applicata, eadem verba nullo temporis dispendio repetiit, et hymnum sacrum exorsus est. Cum desineret electricitas, rigescere veluti lingua, nihil amplius

plius proferre valuit, redeunte statim loquela distincta, cum repeteretur electricitas. Continuata electricitate, magis magisque lingua et membris uti didicit, etiam repetere potuit voces auditas, quaerere multa, et hymnos canere, quos denuo didicit: omnium enim oblitus erat, et hinc difficulter loquebatur, verbis non succurrentibus; canebat vero facilius, quam loquebatur. Brachium sentit, extendi potest et capiti imponi, manus etiam denuo carnosae spectantur, pes sanus est. Haec vero eo magis miranda sunt, quod durante hac curatione, homo ille ob paupertatem toto die nuces, cepas et similia, vitae utcumque sustentandae causa vendens steterit, summum frigus perpeffus, et vesperi saltem rigens a frigore, electricitati se obtulerit. Nobili cuidam personae decenni, tonsillarum tumore laboranti, accidit, ut labium inferius sensu omni priuaretur, nulloque dolore affligeretur. Cl. PAULSOHN, nullo medicamento adhibito, tangi eam aliquoties ab electrico homine iussit: nihil vero sentiebat. Quindecies in loco sensu carente tacta, pungi se aliquantulum percepit, hacque operatione pluribus diebus repetita, sensus perfecte tandem rediit. Plures alii salutares electricitatis effectus legi apud ipsum Cl. PAULSOHN possunt.

p. 529. *Part. XVIII. art. 1. 2. 3.* plures observationes habentur Cl. IOACH. FRID. MÜLLERI, Med. Lic et Physici Lenzeniensis in Priegnitia. Dimidio milliari a Lenzenio in pago *Moedlich*, ad albam sito, cadauera duo sunt putrefactioni nondum obnoxia, ARNOLDI GIESEL DE LYRE, olim Archithalassi Regis Portugalliae, 1676 anno aetatis 97. mortui, et filiae eius paullo post ipsum defunctae. Haec igitur cadauera plus, quam 70 annos, ibi requiescunt, nihil plane adhuc a putrefactione perpeffa, paucis saltem foraminulis in faciebus conspicuis, quae vermibus tribui possent. Inuoluta sunt linteis albis Batauis, et orna-

ta fasciis nigris, quae tam firma sunt, ut decerpi pars nulla possit. Patris cadauer, ut decrepiti, gracile et tabidum, filiam pinguem et obesam fuisse apparet. Balfamationis indicia nulla spectantur. Locus ceteroquin, quo reconduntur, humidus est et in ipso coemeterio cadauera facile putrescunt, haec vero in sepulcro quodam templo adiecto reperiuntur. Idem Cl. MULLERVS aquas destillatas congelationi p. 535. obnoxias obseruauit; cum enim hieme anni 1749 in vasis similibus et aequalibus aquas menthae crispae, anethi, rosarum, et conuallariae in camera quadam reposuisset, ianuarii die sexto anni 1750 aquam rosarum totam in glaciem mutatam reperit: reliquis eodem in loco consistentibus id non accidit. Suspiciatur ergo aquarum destillatarum alias aliis facilius in glaciem abire. Oleosum enim, cui quid in aqua menthae et anethi tribui posset, conuallariae aquae non inest, nisi hic aliquid contulerit id, quod extracto ex conuallaria vim purgantem conciliat, cuius tamen principii resinoso-gummosi parum inesse aquae potest, et rosarum pallidarum idem cum hoc extracto est effectus.

In eiusdem Partis art. 4. CONR. DIETER. GV p. 540. TIKE, M. D. Perlebergensis, *os singulari modo diffractum* sistit. Miles aetatis quadraginta annorum, qui olim baccho et veneri strenue litauerat, a pluribus annis motus haemorrhoidales sensit, fluxum vero haemorrhoidum nullum. In expeditione Silesiaca profundum vulnus capiti infligebatur, cumque simul spiritum vini fortissimum auidius hauriret, motus illi haemorrhoidales increuerunt, accedentibus doloribus podagricis, praecipue dolorem, quem *surdum* appellabat, in medio ossis femoris sinistri sentiebat. Hic dolor perpetuo augebatur, ut tandem insistere pedi sinistro vix auderet, metuens, ne diffringeretur. Neque vanus fuit metus; cum enim equo potum praebiturus in stabulo amphoram tolleret, in medio ossis

ossis femoris partem inferiorem sensim exteriora versus curuari, tandemque diffringi sensit, ut confidendum in terra ipsi esset. Chirurgus coniungere partes ossis rursus tentavit, clapsisque septimanis quatuor, tollere pedem aeger potuit, neque multum tumoris adfuit; mox vero intumescere insigniter coepit pes in loco, ubi diffractus fuerat, hominis crassitiem adaequans. Remedia efficacissima frustra adhibebantur, et humoribus omnibus ad pedem finisstrum confluentibus, reliquum corpus contabuit. Urinae etiam fluxus sistebatur; scrotum vero insigniter expandebatur ab humore foetente, magna copia per cutem scroti transsudante. Vxor tamen et amici clam et copiose adferunt vini spiritum, donec moreretur. Praeter hunc potum, venenum venereum hoc exedisse in aprico est. Dissecare cadauer non licuit.

p. 543. *Art. 5. de fluxu urinae praeternaturali* commentatur idem. Femina triginta annorum, paucos dies postquam partum enixa esset, in regione vesicae vehementes dolores et spasmus sensit. Hinc nata urinae retentio, quam dolores maiores comitati sunt. Inexpectato ventrem madefieri sensit, et animadvertit urinam per exiguam aperturam in medio umbilico tanta exire copia, quanta sanis hominibus quotidie fluere solet; dolores tamen non cessarunt. Pressionibus continuis urinam in viam consuetam reducere laboravit, tandemque id obtinuit. Profluens vero e via ordinaria, urina sub initium pure multo mixta erat, unde colligere licet, circa sphincterem vesicae ulcus fuisse, exeunte vero pure, spasmos desisse, ut urina exire consueto modo rursus potuerit. Fluxus ille per umbilicum plane cessavit, urina etiam a pure libera fluxit. Vrachum in femina hac adhuc apertum fuisse intelligimus, naturam vero solam vesicae morbum sanasse. Ulcus a pressione infantis in collum vesicae, aut alia quadam vi in partu adhibita, nasci

nasci potuit. Iam femina bene valet, neque incommoda haec redierunt, cum denuo peperit.

Qui scopum itineris Myliani et conditiones, qui-
bus suscipi debebat, legere cupiunt, has in *Parte*
XX reperiunt, quae voluminis secundi ultima est.
Singulis enim voluminibus partes decem destinatae
sunt, hocque volumine Cl. MYLIVS fere curam ope-
ris deposuit, nisi quod, inchoato iam itinere, vel
obseruata quaedam, vel versa ex diariis anglicis, misit.
Cl. KAESTNERVS tertio volumini praefationem
praemisit, et aliqua ipse subministrauit, vel, ut ver-
terentur, curauit, ex hodoeporico etiam Cl. MYLII
MSto, quod post mortem auctoris nactus est, quae-
dam selegit.

Part. XXI. art. 3. obseruationes thermometricae p. 831.
a Cl. MYLIO in mari institutae leguntur. Vfus est
thermometris duobus, ab insigni artifice PRINS fa-
brefactis, quorum scala est Fahrenheitiana, omnia
vero haec thermometra exacte sunt concordantia.
Maius thermometrorum suorum Cl. MYLIVS in aere
libero soli exposuit, minus mari immisit, profundi-
tatem, ad quam immergeretur, simul dimensus, ob-
seruationi cuilibet minuta horaria quinque tribuit, ut
ad caloris gradum componere se thermometra pos-
sent. Secundas obseruationes in medio fere inter
Batauiam et Angliam mari, cum traiceret, instituit
augusti 20. 1753; primas eiusdem mensis 17, in cor-
nu quodam Mosae fluminis miliari circiter ab eo lo-
co, ubi in sinum, *Haringvliet* dictum, cornu illud exo-
neratur. Dabimus secundarum, inter Batauiam et
Angliam institutarum, tabulam:

Thermometra.

Aug. 20. 1753 pom. hor. 3. min. 5	maius in ae- re grad. $71\frac{1}{2}$	minus in ma- ri grad. $64\frac{1}{2}$	profunditas mi- noris. ped. 6.
3. 15	72 ^r	63 ^r	11.
3. 22	73	64	15.
3. 30	70	63	13.

Tom. IV. Pars II.

V

Part.

p.934. *Part. XXIII. art. 2. Echo notatu dignum prope pagum Immerode inter Goslariam et Guelpherbytum describit Cl. MYLIVS, aliaque duo commemorat, alterum in cella vinaria sub curia Bremensi, alterum in ecclesia diui Pauli Londini.*

Part. XXVI. art. 2. ex Cl. MYLII hodoeporico singularis feminae cuiusdam ad spiritum vini potandum impetus recensetur, ab eodem, cum pagum Grobstad transfret, observatus. Vetulam ibi reperiit ab hoc potu iam ebriam, adhuc plus sitientem. Eo veluti raptu singulis annis vel bienniis, quatuor vel sex septimanas agitur, nihil aliud tunc agens, nec dormiens. Ipsa de hoc suo malo quæsta est, et peregrinos, ut consulerent sibi, immo ut pro ipsa preces funderent, orauit, mentis suae plane compos, etsi ebria. Libera ab hoc malo, laboriosa, et sana femina est, potumque illum quam maxime auersatur. Adicit Cl. MYLIVS, cauponis Reichenbacensis uxorem (sine dubio in patria sua) hac occasione in mentem sibi venisse, quae cum similibus raptibus agitata aliquando esset, negato spiritu vini, desperans vitam suspendio finiit.

Ex eodem Cl. MYLII hodoeporico iter in Bructerum montem, aprilis vicesimo die, anno supra millesimum septingesium quinquagesimo quarto, ab eo susceptum, hic legitur art. 4. Mons omnis niue tectus erat. Noctem in domo, iis, qui cespitem effodiunt, inseruiente, tunc vacua peregit; altero mane, ad summum montis adscenderunt. Cl. MYLIVS a motu feruens et sitiens, fontis, in summo montis exsistentis, aquam claram et boni saporis bibit mensuram integram ad minimum, (quart) nullo sui damno, etiam si nix fontem totum circumdabat. Niuem etiam, cum descenderet, indemnus comedit. Hoc quidem mane hora sexta, coelo sereno, vento S. O. leni, sed acuto, tamen barometrum in montis extremo

extremo vertice stetit ad digitos 24. lineas II paris.
 Thermometrum ad grad. 36 supra 0 FAHRENHEI-
 TII. Naturae thesauros in bructero ob niuem in-
 uestigare non potuit; muscos tamen, egregie colori-
 bus variegatos, et lichenes, florentes hos et illos, item
 gramen papposum, alpinum, iunceum (SCHEVCH-
 ZERI *Agrostogr.* p.302) copiose florens et e niue emer-
 gens reperiit. Genistam, ericam, et myrtillum
 crescere ibi vidit, myrtillum flori propinquum.
 Paucae pinus, ad montem reperiundae, exiguae
 sunt, graciles, et ob ventum acrem plerumque foliis
 orbae. Cespitem plenus est mons. In superiori par-
 te, praecipue bructeri minoris, (*der kleine Brocken*)
 lapides maximae molis iacent, plerique lichene viridi
 flauescente tecti. In domo, ubi noctem commora-
 tus est, papilionem erucae vulgaris, setosae, flauo
 nigrae, (*die gelb und schwarze Dornraupe*) reperiit.
 Ad pedem bructeri, proprie sic dicti, ad domum
 scilicet ponti oderae adiacentem (*Oderbrückenhaus*)
 hora octava et dimidia reperit barometrum ad digit.
 26. lin. $3\frac{3}{4}$. thermometrum grad. 54. FAHRENHEI-
 TII.

XIV.

*Versuche und Abhandlungen der Naturforschen-
 den Gesellschaft in Danzig. Zweyter Theil,
 mit Kupfern. Danzig und Leipzig. 1754. in
 Lankischens Buchhandlung. 4. 3 Alph. 2 Bo-
 gen, 6 Kupfertafeln.*

id est:

Tentamina et Commentarii societatis naturae
 indagatorum Gedanensis. Tomus II.

Qua multae iam superbiunt Europae urbes gloria,
 quod eruditas inter muros suos foveant societa-
 tes, eam quoque sibi suo iure vindicat celebris Prus-
 siae

forum metropolis, Dantiscum. Floret enim ibidem, per tria circiter lustra, virorum inter eruditos magni nominis societas, in naturae operibus inuestigandis solum et cum laude occupata. Testantur abunde de egregiis eorum laboribus, et qui iam aliquot annos ante prodiit, tentaminum et commentariorum horum tomus prior *, et, quem indicare adgredimur, secundus. Prius autem, quam id ipsum faciamus, neque inutilem neque iniucundum lecturis suscepturi videmur laborem, si non nulla de origine et institutis laudatae societatis praemittamus **. Aliarum civitatum exemplo ad imitandum suos quoque ciues primus excitauerat ISRAEL CONRADT, medicus Gedanensis percruditus, lecta anno superioris seculi septuagesimo, mense februario, coram illustri concione de frigoris natura et effectibus dissertatione ***; sed votis non respondit euentus, obiitque senex anno praesentis seculi decimo quinto, fundatae societatis orbis adhuc gloria. Cuius post obitum, anno vicesimo eiusdem seculi, conuenerunt non nulli viri eruditi, factoque foedere septem circiter annos conuentus suos atque labores continuarunt, discisso mox hoc vinculo, postquam plures focii, aliis iisque grauioribus ornati dignitatibus, ab hisce, inuiti licet, auocabantur laboribus. Scripta eorum edita umquam vidisse nos non recordamur. Tandem vero alia hic orta est sub finem anni supra millesimum, septin-

* *Versuche und Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. Erster Theil. Danzig, 1747. gedruckt in der Schreiberischen Buchdruckerey. 4. mit Kupfern.*

** Conf. MATTH. GEORG. PFANNS *Sammlung verschiedener merkwürdiger Felle &c. Nürnberg. 1750. 8.* ubi sub finem libri, breuis sed manca, de societate hac dantiscana legitur relatio. vid. Comment. nostr. Vol. I. P. II. p. 312.

*** Prodiit Gedani typis et sumtibus monasterii oliuensis. 1677. 4.

septingentesimum, quadragesimi secundi, societas, sancitis ante legibus, ac varii generis instrumentis physicis coemtis, conuentuum suorum etiam ianuarii secundo die, anni seculi huius quadragesimo tertio, coepit primordia, eosque adhuc singulis hebdomadibus continuauit. Edidit etiam breui post, uti supra dictum est, anno quadragesimo septimo, tentaminum et commentariorum suorum tomum primum, qui tanto cum plausu exceptus fuit ab omnibus, ut alterum breui proditurum exoptarent intentius. Quod quum varia diutius iusto prohibuerint oborta impedimenta, tandem tamen alter hic tomus quoque prodit, moramque compensat insigni non minus rerum, quas offert expositas, varietate ac praestantia. Porro institutum societatis quod attinet, sequentia nos docet ipsa, quae secundo huic tomo praemittitur, praefatio. Nimirum proposuit sibi societas tamquam laborum suorum unicum finem, naturae contemplationem, sumsitque eas modo, quae et scientiam et historiam naturalem spectant, inuestigandas veritates. Membra eius sunt vel ordinaria, vel libera. Illa in conuentibus nunc aliorum repetunt, nunc sua instituunt tentamina, nunc commentarios praelegunt. Haec contra veri quidem videnti cupidi viri, eruditi tamen nomen non adfectantes, congressibus interesse, illorumque labores iuuare variis modis student. Huc usque quidem non nisi ciues suos membra habuit societas, exteris tamen etiam patere aditum, eosque ipsam suscipere velle, ut membra honoraria et ordinaria, publice declarauit in dicto praefamine. Solet insuper sub finem anni cuiuslibet eligere sibi ex membris suis directorem, eiusque vicarium, secretarium, aerarium et quatuor vel sex membra, quae ex facto inter se ordine, per omnem annum singulis septimanis sua proponunt tentamina vel commentarios. Haec sufficiant dixisse

de societatis nostrae institutis; iam ipsos eius labores contemplari conuenit paullo attentius.

p. 1. No. 1. *De formatione, cremento et coloribus testarum, quae sunt cochlidum et concharum*, exponit Cl. IACOB THEODOR. KLEIN. Quam dissertationem, latino sermone conscriptam, in patrium translata, hic inseruit Cl. KLEIN, iisdem additis iconibus, nullaue prorsus facta mutatione; alio vero iam tempore eam fuisse satis in nostris commentariis recensuimus *.

p. 68. No. 2. *De incendiis pulueris pyrii ope exstinguendis* agit Cl. MICH. CHRISTOPH. HANOW. Ignem vero igne restinguere mira licet res sit, ipsa tamen illud homines natura docuit, eamque isti imitati sunt feliciter. Incendia, quae fulgur suscitauerat, saepe aliud iterum quum exstingueret fulgur, eius ad exemplar hominibus inferuire posse visus est puluis pyrius, ut eodem non minus, ac aqua, reprimant ignis vim.

p. 73. Inuentor huius artis fuit ZACH. GREYL, caelator argenti Augustanus, machinamque excogitauit, huic operi aptam. Qua etiam Augustae Vindelicorum, Vindobonae, Ratisbonae, Dresdae, et Parisiis, annis huius seculi decimo sexto, vicesimo primo et secundo, publice et cum successu experimenta instituta fuerunt. Multi multis in locis imitati GREYLI inuentum, similes pararunt machinas, simili non sem-

p. 81. per cum successu. Inter quos eminet IAC. FRID. ВОТН apud Vlmenfes signifer, emendare illam qui studuit; id, quod fuisse narrat Cl. HANOW, descripta simul pictaque in tabulis additis machina. Est haec dolium, cui aqua infunditur, quod media in parte aliud in se recipit vas, puluere pyrio plenum, firmissimumque

*. Conf. Comment. nostr. Vol. III. P. II. p. 274. et 286. ubi Eiusdem tentamen methodi ostracologicae, cui haec accesserat, exhibetur.

usque dein in superiori loco obturatur. Illud igitur, si quod ortum fuerit, in incendium immittitur, et simul ac pulvis pyrius accensus displodit vas, aquamque una dispergit, omnis flamma subito exstinguitur. Quae quantaque commoda adferat haec machina, et quo modo explicandi sint eius effectus, egregie declaravit Cl. Auctor. Nimirum aerem, a flamma iam rarefactum, ab accenso pulvere pyrio intensius adhuc rarefieri, flammam inde exstingui, idque magis ab aqua vaporum sub forma ad omnes plagas subito dispersa, externi tandem aeris accessum et in illum renixum ignem suppressere penitus, demonstrat. Plura addit Cl. HANOW memoratu omnino digna, quae tamen huc transferre non licet; curiosos ad ipsam dissertationem remittimus.

No. 3. *Observationes meteorologicae Gedani factae* p. 104.

a Cl. GOTTFRIED REYGER. Non nulla de tempestatum varietate et causis, atque de observationum, hunc in finem instituendarum, commodis aeque ac impedimentis generatim ubi disseruit Cl. REYGER, earum, quae ipse ab anno huius seculi tricesimo ad quadragesimum nonum Gedani instituit, ita recenset seriem, ut quae singulis diebus per totum annum fuerit aeris ventorumque vicissitudo, in primis adnotauerit, ad barometrum, pluuias niuesque minus attentus; quibus addit adnotationes quasdam, ex observatis suis deductas. Constat inde Gedani hyemem p. 141. plerumque mitiorem, multo quidem, sed fugaci, stipatum frigore, raro saevire violentius; ianuario mense maximum frigus secum ferre austrum et eurum, super rigescentes gelu dum aduehantur terras; mitius autem sequi aquilonem et fauonium; idem observari quotannis Archangelopoli. Februarius esse solet varius et humidus, aquilone tunc niues geluque adferente. Martius riget frigore, quod facit plerumque aquilo et auster. Ver accedit

p. 146. raro amoenum, ventorum, frigoris calorisque subita et iterata stipatum vicissitudine. Aprilis saepe adhuc horridus gelu, sub finem euadit mitior. Maius quoque hyemem prae se fert, niuib, pluuiis comitatus et aquilonibus. Iunium humidum frigidumque reddit boreas, subito aestum et fulgura ferente noto. Aestas moderato vrit calore, diu non durante ob mox sequentes pluuias et refrigeria aeris. Siccam quidem serenamque tempestatem facit boreas, pluuias tamen simul adfert, vapores in aere dispersos impetu congregans. Nebulas, quas aestas quoque habet solis sub occasum, plerumque excipiunt fulgura. Auctumnus mox sequitur, multis pluuiis, niuib et frigore quamuis stipatus, serenos tamen amoenosque saepe numerat dies. Nebulae tum a meridie orae, primo mane adscendunt, raro ex oriente. Ex quibus omnibus facile apparet ventos praecipuas vicissitudinum aeris esse causas: cur autem singulis anni temporibus ille, nec alius, flare soleat ventus, forte tunc demum intelligi poterit, si quando liceret aeris temperiem integrarum regionum uno quasi intuitu cognoscere, vel e factis ubique collatisque obseruationibus praesagire. Dubium est, eandem determinatum post annorum numerum redituram esse aeris temperiem; veri potius simile illud est, quod, quum omnia quoad tempus et spatium coniungi queant mille modis, numquam prorsus eadem, ac olim, sequutura sit aeris temperies.

p. 160. No. 4. *Aquam communem ad congelascendum uno eodemque frigoris gradu indigere* demonstrat Cl. HANOW. Quamuis eam, qua aqua in glaciem coit, aeris frigiditatem siue punctum glaciale in barometris semper et ubique idem obseruauerant plurimi naturae scrutatores; fuere tamen etiam alii, in primis Cll. DE MAIRAN, FAHRENHEIT, TRIEWALD, MICHELI,

MICHELI, IALLABERT, qui aquam multo frigidiorē esse posse, ac alias est, quando congelascit, sine eo, ut in glaciem coeat, ex variis factis tentaminibus adfirmarunt. Quae ubi hic examini subiecit diiudicauitque Cl. HANOW, e suis, quae ipse vario modo instituit, tentaminibus illud tandem accurate comprobat, aquam haud prius umquam congelascere, quam punctum suum congelationis attigerit.

No. 5. *Cancrum quasimodogenitum seu crumenalem* p. 187. *nudum ex insula Vecti* describit pingitque Cl. IAC. THEODOR. KLEIN. Mouerat olim in epistola ad Cl. COLLINSON, qui de canceris marinis in dicta insula obseruationes factas, in Actis Anglicanis * enarrauerat, hoc dubium, num ne canceri aequorei crustas deponerent; in primis quum lapides, quos astaci habent praeparandis nouis testis aptos, nondum in canceris marinis inuenti fuissent. Ast remouit mox dubium illud Cl. KLEINII missus nuper a Cl. COLLINSON una cum depositis integumentis recens veluti natus gammarus, e mari prope insulam *Vectim* extractus. Hunc igitur hic aeri incisum accurate describit Noster, confirmatque Cl. COLLINSONI obseruata, additis variis, quae cancrorum historiam illustrant, adnotationibus. Accedit his noua plane, haud audita prius, obseruatio, ab eodem amico suo communicata: Exuuias nempe duas scorpionis, quas idem Cl. COLLINSON misit, quasque hic depictas exhibet, testari abunde de cutis scorpionum renouatione consueta, non modo sibi persuadet Noster, sed illud etiam inde colligit, squillas reliquaque insecta crustata, quae vocantur entoma, sua simili modo quotannis mutare integumenta.

V, 5

menta.

* Conf. Philos. Transact. n. 478. p. 70. et eorum Vol. XLVII. ad annos 1751 et 1752. p. 40. nec non Comment. nost. Vol. III. P. I. p. 9. 10.

menta. Atque ita errorem, quem se alio loco commisisse confitetur, emendandi datam non praetermisit occasionem veritatis vindex seuerior, Cl. KLEIN.

p. 209. No. 6. *Examen tentaminis optici, a Reuer. P. SCHEINER facti*, instituit Cl. HENRICVS IACOB DE LA MOTTE, M. D. Gedanensis. Reuer. ille SCHEINERVS docuit in oculi sui seu fundamenti optici P. II. lib. I. Exper. 5. quo modo uno oculo rem eandem simul bis, ter aut quater distinctissime videre liceat, absque ullo adhibito alio diaphano: nimirum si discum quemdam duobus vel pluribus perfores foraminulis, in ea distantia, ac pupillae diameter exigit, et tunc his admoto oculo, rem aliquam perlustres, semper eandem bis vel ter, pro numero foraminulorum, videbis. Repetiit illud semel iterumque Cl. DE LA MOTTE, sed absque sperato euentu; tandem amicus myops accessit, idemque repetens tentamen, eandem rem ter; vitro concauo armatus, unicam; Noster contra hoc vitro usus, ter vidit eandem rem. Quae dein accuratius et saepius ubi repetiit, causam phaenomeni huius in diuersa latere oculi cuiusuis dispositione, inde intellexit. Prout enim magis minusue conuexa sit cornea vel lens crystallina alicuius, eo magis minusque variare solet huius et illius visus acies. Multum igitur omnino interesse colligit Cl. DE LA MOTTE, in primis in instituendis experimentis opticis, ut, qui haec instituat, oculi sui dispositionem simul indicet accuratius.

p. 220. No. 7. *Quae aeris temperies fuerit anno 1750*, exponit Cl. GOTTFR. REYGER. Quas supra indicauimus, obseruationes iam factae confirmant: nam mitiorem breuemque hyemem; ver amoenum frigidiusculum; aestatem moderate calidam; auctumnum frigore niuibusque horridum obseruauit Cl. REYGER.

No. 8.

No. 8. Cl. HANOVII *adnotationes circa lances*, p. 226.
frumento librando inferuientes, factae. Eiusdem argumenti commentatio, primo horum, quae indicamus, tentaminum et commentariorum tomo inserta, nunc contrinqua hic legitur, egregia valdeque utilis nobis visa; breuiter tamen ut huc referamus eius contenta, mathematicae rationes ubique interspersae non permittunt.

No. 9. IAC. THEODOR. KLEINII *disquisitio*: p. 252.
an musculi animalis cuiusuis intercostales, tandem ossescere, aut veluti costae in os mutari queant? Missa quum aliquando esset Cl. Auctori, ut eam disquireret, costa animalis cum musculis intercostalibus, in ossa mutatis, nec non, testis instar, IAC. BIRCHERODII historia naturalis quatuor costarum bubularum, quibus quae superinducta caro fuerat, in verissimum os est conuersa. Hafniae 1723. 4. c. icone. Miram hanc rem seueriori subiecit examini, multis autem circumseptam fabulis inueniens eam prorsus negauit, partes illas inuentas arbitratus potius fuisse fragmenta fornicis ossei testudinum, siue terrestres siue marinae fuissent.

No. 10. *Aeris temperiem, quae anno 1751. Dantisci* p. 263.
et Berolini obseruata fuit, inter se comparauit Cl. GOTTFRIED REYGER. Ex facta altitudinum barometri et thermometri, ventorum reliquarumque aeris vicissitudinum, quae occurrerunt utraque in urbe, comparatione, tandem intellexit Cl. REYGER illam, quae Berolini fuerat, huic, quam ipse Dantisci obseruauit, aeris temperiem multum fuisse similem, quamquam etiam a loci utriusque situ aliisque causis orta, simul accesserit varietas.

No. 11. *Libram chinensem argentariam describit* et p. 272.
examinat Cl. HANOW. Vectem homodromum esse docet,

docet, eiusque constructionem, usum et vitia fusc exponit Cl. Auctor, addita simul alius similis, quam ipse fecit, librae descriptione.

p. 292. No. 12. *Echinitem* TESDORFFII depingit Cl. IAC. THEOD. KLEIN. Quamvis in dispositione naturali Echinodermatum, quam edidit, inter plures notas, quae ab aliis haec distinguerent, eam quoque certam posuisset, quod non nisi quinque geminatis lineis ornata essent, a superiori parte deorsum ad os quinquangulare concurrentibus *; hancce tamen iam limitandam esse lubens fatetur Cl. KLEIN, postquam par illud echinodermatum, quod nuper ipsi misit Cl. TESDORFF, naturalium rerum cultor assiduus Lubecensis, quodque sex eius modi lineis et ore sexangulari instructum erat, a posita regula exceptionem fecerat. Cui adeo nouae echinitum speciei nouum etiam imposuit nomen: *globulus* TESDORFFII. Elegans quoque exhibetur icon.

p. 294. No. 13. *De generatione pediculorum, in foliis plantarum occurrentium*, agit Cl. REYGER. Non nisi ex duplicis sexus concursus omne gignitur animal. Cui vero regulae limites ponit nuper detecta polyporum generatio. Idem confirmant pediculi foliorum, genus suum absque ullo congressu cum sui simili propagantes, testibus Cll. LEEVWENHOECKIO et REAUMVRIO. Cl. BONNET idem euicit experimentis. Quem sequuti alii eadem cum successu repetierunt tentamina. Id, quod ipse suis lustrare oculis Cl. REYGER pariter tentauit, in ea pediculorum eius modi specie, quae sambuci foliis infidet. Cuius ramulum cum duobus foliis ab omni insecto vel ouulo immunem et integrum, in vas aqua plenum immisit, ut diutius vigeret ramulus; vas vero in

* Conf. Eiusd. Naturalis Dispositio Echinodermatum. Gedani 1734. §. 49. p. 24.

in aliud collocavit vasculum, aqua plenum, ne quid ab inferiori parte posset adscendere. Ramulo huic dein unicum eius modi pediculum imposuit, et breui post vidit viuum ex hoc nasci similem pediculum. Matre enecta et remota, recens natum solum reliquit in ramulo; qui mox prorexit in illo, depositaque ter cute sua, aliquot diebus post, viuum animalculum sui simile, sequentibus diebus plura adhuc peperit. Vnde genus suum sine praegresso coitu, propagare hos pediculos, certo certius ipse expertus est Cl. REYGER, suaque observatione phaenomenon hoc physicum illustravit, confirmavitque.

No. 14. *Methodum inueniendi mensuram uniuersalem*, magnitudini corporum quorumcunque adaptatam, proponit Cl. HANOW.

No. 15. *De conchis anatiferais simulque de pholadibus* exponit Cl. KLEIN. Multa commenta tandem delet dies. Exemplo sunt conchae illae anatiferae, quas ridet nostra aetas, quas vero generare animalia credidit antiquitas. Sunt quidem ipsae duobus concharum generibus, solenum et pholadum, quoad tubulum, quo gaudent, analogae; inde tamen inter se differunt, quod anatiferae polyconchis, solenes et pholades tantum diconchis adnumerentur*. Pholades ad littora maris copiosae dantur, saepiusque abundis ad rupes et saxa impetuosius proiectae enecantur, interdum in limosa rupium terra, si qua inueniant animalia, tubuli ope inde cibum petentes. Sed, quod veteres putant, saxa ipsis inferuire domicilii loco, fabula est. Similis narratur de anatiferais conchis fabula, ab anatibus, quas dicuntur gignere, ita vocatis. Est etiam anatum quoddam genus, *Brenta minor* dictum, quae magno numero,
per

* vid. Eiusd. Method. Ostracolog. p. 163. et 174. et Comment. nostr. Vol. III. P. II. p. 284. 285.

per insulas Scotiae arcadicas aliasque, hyemem vagantur, iterumque, vere incunte, ad alia loca migrant. Quas ibi oua ponere et excludere ubi nullus viderat, ad has insulas nondum appulsis nauibus; lignis vero in mari natantibus insidentes easdem, atque conchas illas lignis copiose adhaerentes ubi nauitae conspexerant, harum tubulum pro anatis rostro, pedes pisciculi pilosos pro alis, reliquum huius corpus pro pullo anatis habuerunt confidentius, quin credulis nautis vel magni nominis eruditi viri post adhibuerunt fidem. En! fabulam excussae iam nostra aetate superstitionis testem!

p. 355. No. 16. *Historiae electricitatis sectio altera*, auctore DANIEL GRALATH. Commentationem, cuius sectio prior legitur in tentaminum et commentariorum Societatis Dantiscanae Tomo primo*, iam pertexere ulterius, et quae electricitas, in primis ab anno seculi huius quadragesimo quarto ad quadragesimum sextum usque, ceperit incrementa, ex scriptis et experimentis clarissimorum virorum enarrare copioso sermone pergit Cl. GRALATH.

p. 460. No. 17. *Diuersitatem ponderum medicorum* perpendit Cl. HANOW. Quum medicorum et pharmacopoeorum multum omnino intersit, ut ponderum, quae adhibentur in librandis medicinis, probe cognoscant rectitudinem, insignem propter ea apud ipsos sibi promeruit Cl. HANOW gratiam, quod magnam, quam habent haec pondera, diuersitatem non modo indicauit, sed etiam, quo modo sub examen vocari et comprobari possit eorum rectitudo, egregie docuit. Occurrit autem in primis duplex discrepantia; altera ab eorum, qui eadem parare solent, incuria aut ignorantia plerumque pendet; altera a varia gentium diuersarum, vel mutata unius eiusdem-

que

* No. 6. p. 175. seqq.

que populi per tempus consuetudine suam trahit originem. Prior illa ut detegatur discrepantia, duplici ingrediendum est via, nimirum vel ope librae alius medicae, quae sigillo magistratuum insignita est, longoque usu suam comprobavit rectitudinem, vel librae exactae argentariae (*Ducatenwage*) seu, si non suppetat haec, aureorum pleni ponderis auxilio. Suspectam inde libram examinare si cupias, eam cum illa compares ad stateram, vel cum aureis, atque facile inuenies differentiam. Modum exponere hic diffusum nimis foret. Ad alteram iam respiciendum p. 470. est librae medicae diuersitatem, a varia populorum consuetudine pendentem. Vt igitur hanc declararet Noster, ad Graecorum, Romanorum, Aegyptiorum usque tempora respexit non modo, sed ad Gallos, Hispanos, Anglosque etiam progressus est. Quae singulis his populis fuerit ponderum ratio quaeue temporum mutatione accesserit varietas, docte et copiose exponit, eadem inter se comparat, inuentamque ita differentiam demonstrat. En! tabulam optimam differentiae huius testem!

Vncia medica pendet gran. parif. drachma adeo pendeat			
in Germania et Venetiis	562	-	- 70 $\frac{1}{4}$
in Gallia nostro aeuo	580	-	- 72 $\frac{1}{2}$
prisco aeuo	480	-	- 60
in Hispania olim	504	-	- 63
nunc	538	-	- 69 $\frac{1}{2}$
Romae olim	520	-	- 65
posthaec	534	-	- 69
in Graecia	506	-	- 63 $\frac{1}{4}$

atque libra una, si uncias duodecim continet, pendeat

gran. parif.			
in Germania	6744	differentia a Germanorum libra	
in Anglia	6960	+	216 gr.
in Gallia olim	5760	-	884
nunc	6912	+	168
in Hispania olim	6048	-	696
nunc	6456	-	288
Romae olim	6240	-	504
posthaec	6408	-	336
in Graecia	6072	-	672

p. 480. No. 18. *Tentamina de vi, quam exercent fila vel simplicia vel inter se contorta* auctore, BENIAMIN GOTTLIB VON SCHROEDER, M. D.

p. 525. No. 19. *Bibliotheca electrica. Pars prima*, auctore DANIEL GRALATH. Cuius historiam electricitatis supra indicauimus, iam breuiter etiam bibliothecae eius facienda est mentio. In priori illa nimirum proposuerat sibi Cl. GRALATH tantum ad temporis normam, electricitatis enarrare originem, progressum, effectus memorabiles, aliaque, quae eius incrementum vel adauxerint vel impediuerint, neglecta tamen scriptorum, quae eam illustrent, recensione. In hac autem, quotquot edita iam sunt, vel adhuc edenda, electricitatem pertractatura, scripta recensere animus est, temporis ceterum parum obseruato ordine, quo, si qui omissi sint scriptores veteres, facilius inseri queant in sequentibus bibliothecae suae partibus. Ab antiquioribus semper facturus exordium, recentiora subiungere, eorumque contenta exponere breuiter allaborabit.

p. 553. No. 20. *Ope electricitatis curatum malum hysteri- cum conuulsium* obseruauit Cl. IACOB DE LA MOTTE. Anno praesentis seculi quinquagesimo quarto, medio februario, ad ipsum accedebat femina, viginti octo annorum, plethorica, ad tristitiam prona, nondum nupta viro; mox illo correpta malo, proximam infellam se proiecit. Valde concutitur caput; oculi sese claudunt; faciei et oris in primis muscoli conuelluntur, absque ulla tamen in ore spuma; post etiam manus, itemque pedes, totum denique corpus, ita tamen, ut alternis haec omnia se exciperent vicibus. Manus, licet conuulsae, liberae tamen manebant haud contortae. Superatis his post decem minuta temporis motibus, tandem ad se rediit aegra, valde languida, difficileque spirans, praeter capitis dolo-

dolorem et faciei ruborem, multo perfusa sudore, atque omnium, quae perpeffa erat, sibi adhuc conscia. Tanti mali causam rogata post, a vehementi refrigerio, continuis curis et moerore nouem iam annos toleratis, deriuauit. Initium mali inter coenandum sensisse se, et praeter oscitationem et flatum, in faucibus globulum quasi haerentem, remouere tussiendo, sed frustra tentasse narrabat. Saepe redeunte ita malo, iteratisque tussiendo conatibus, conciliauit sibi dyspnoeam, et breui post haemoptysin; qua licet iterum sublata, superstes tamen fuit malum vetus. Accessit anno seculi huius quinquagesimo tertio, paullo ante paschatos festum, subito vocis defectus, misso autem sanguine per venam, vox rediit. Aucti fuerunt dein conuulsiones artuum reliquique corporis, et bis per diem redierunt, frustra tentatis remediis omnibus. Menstrua rite fluxerunt, sed, ubi imminet malum illud, fluunt copiosius. Appetitus moderatus fuit, somnusque bonus. Animi pathemata auxerunt malum. Vt igitur eidem obuiam iret, per tempus aliquod dedit Noster viscum, quod suasisit Cl. COLBATH, sed sine successu; electrica dein cum aegra tentauit experimenta, atque, quum olim inducta pectoris labes obstare videretur, primum a simplicioribus cepit initia, ad pectoris, si qua occurreret, mutationes sollicitè attendens: nihil tamen incommodi sensit ipsa in pectore, scintillae licet multae educerentur e manibus et capite. Erat dies duodecimus februarii anni 1754. Domum post ea quum iuisset, iussuque Cl. DE LA MOTTE lectum, sudoris mouendi obseruandique causa, petiisset, die decimo sexto februarii, redux facta hilaris narrauit ipsa se tum multum sudasse, urinam sanguineo rubram cum sedimento, quae alias aquosa fuerit, dimisisse, et malo suo prorsus liberatam fuisse. Repetitis dein et sensim fortioribus factis experimentis lubens se subiecit aegra, nihil amplius de malo suo sentiens. A

dato leni laxante redierunt spasmi et concussiones, mox iterum cessantes. Continuat adhuc Noster, dum haec scripsit, singulis hebdomadibus semel tentamen electricum, quo certior euaderet curatio atque tutior. Si quid memoratu dignum occurrat in hac morbi historia atque curatione, ad tria potissimum nos iubet respicere ipse Cl. Auctor momenta sequentia: quod electricitas nihil mali attulerit pectori feminae, quae haemoptysin olim passa fuit; dein quod a purgante redierint spasmi; denique celeris illa urinae mutatio certum efficaciae, quam habuit electricitas, indicium.

XV.

Dissertations sur l'incompatibilité de l'Attraction et de ses différentes loix avec les phénomènes; et sur les tuyaux capillaires. Par le P. GERDIL, Barnabite, Professeur de Philosophie - Morale en la Royale Université de Turin, et de l'Institut de Bologne. A Paris chez Defaint et Saillant. MDCCLIV. 12. mai. 18 pl. 1 tab.

i. e.

Dissertationes de Attractione eiusque diversis legibus contra phaenomena pugnantes, tum de tubulis capillaribus. Auctore R. P. GERDILIO. etc.

Doctissimus huius libri Auctor copiose disputat contra eos philosophos, qui attractionem statuunt esse vim primitivam, et proprietatem materiae essentialem, ac phaenomena inde pendentia mechanice explicari posse negant. Et in prima quidem libri parte omnes ingenii neruos in id intendit, ut demonstret, istam sententiam cum experientia pugnare. Primo earum

earum virium attrahentium, quae a gravitate differunt, et rationem distantiae plus quam duplicatam sequuntur, leges in natura rerum locum habere non posse, sed naturae, inuitis phaenomenis, a Newtonianis obtrudi, contendit. Quum enim talis attractio in contactu infinities sit maior, quam in quavis, utut exigua, corpusculi attracti a corpore attrahente distantia: sequi inde existimat, ut aut vi infinita foret opus, ad particulam alicuius corporis solidi a toto diuellendam; id, quod tamen experientia secus esse docet: aut in quamvis exigua distantia prorsus insensibilis esset attractio; etiam contra phaenomena. Plura absurda porro ex illa sententia elicit, quibus enarrandis supersedemus, quoniam veremur, ne istis consequentiis naviter intercedant Newtoniani, easque calculis ab Auctore perperam subductis imputent. Maiorem attentionem meretur, quod admonet, si talis, qualem paullo antea memorauimus, attractio materiae omni esset ingenita, nullum in natura locum fore repulsui, quem tamen inter diuersas materias dari non nunquam, experientia constat. Hac occasione Cl. Auctorem dissertationis *de Lumine* aggre- ditur, eiusque hypotheses de constitutione et insitis viribus corporum sub examen reuocat, nec non contra celebratam illam in mechanicis et physicis legem continuitatis varie disputat. Secundo argumento contra vim attrahendi, materiae inhaerentem, hoc utitur, quod, quum, per magni NEWTONI experimenta, pilus vel filum metallicum radios lucis in notabili distantia vi, gravitatem multum superante, ad se trahere, et a recto tramite deflectere possit*, duo tamen eius modi fila, libere ita pendentia, ut adhuc minus a se mutuo distent, ad se inuicem accedere non videamus. Tertio considerat phaenome-

X 2

non

* Haec parum accurate dicta existimamus. Non trahit pilus ad se radios lucis, sed a se repellit. Vid. NEWTONI Opt. L. III. Obs. I.

non cohaesionis duorum marmorum, superficiebus suis planis, politis, et paulum humectatis, se inuicem contingentium. Si vis attrahendi causa huius phaenomeni sit, consequens esse videtur, ut, quum duorum illorum marmorum superius super inferiori, si illud in directione ad planum contactus parallela impellatur, facillime moueri possit, pari ratione duae partes unius integrae massae marmoreae, plano tantum imaginario distinctae, facile queant de situ suo dimoueri, si alteri applicetur vis ad planum illud imaginarium parallela. Contra ea obseruamus duas quaslibet massae marmoreae partes ingenti vi cohaerere inter se, et vi, eas in qualibet directione separare conanti, fortissime resistere. Quacrit etiam Cl. p. 91. Auctor ex Newtonianis, quo modo cum legibus attractionis conciliari possit phaenomenon illud attractionis magneticae, quum, secundum Auctoris quidem experimentum, duarum acuum chalybearum, ex eadem altitudine in magnetem demissarum, minor citius in magnetem incidit, quam maior, secundum **MVSSCHENBROEKII** vero experientiam idem magnes non nisi certam ferri molem maxima vi attrahit, in minorem vero maioremue remissius agit? Quarto, quum Newtonianis attractio in phaenomenis lucis et colorum quam maxime dominari videatur, ostendere allaborat varia incommoda, quibus illorum phaenomenorum per attractionem explicatio p. 96. prematur. Sic opacitatem vitri fissi in loco fissurae contradicere putat phaenomeno maculae nigrae, quae cingit punctum contactus duarum lentium conuexarum vitrearum, sibi mutuo impositarum. Si enim in secundo phaenomeno nulla sit radiorum reflexio, propter ea, quod attractio, quam lens inferior in radios exercet, vincat superioris lentis attractionem: multo magis necesse esse videtur, ut in primo phaenomeno radios lucis ex parte vitri, supra fissuram posita, emergentes ad se trahat pars altera infra fissuram sita,

lita; quam superficies utriusque harum partium sint
contiguae, lentium autem illarum superficies in loco,
ubi macula nigra conspicitur, sese ne quidem contin-
gant. Similiter ex ea ratione, qua Newtoniani phae- P. 102.
nomenon illud modo commemoratum maculae ni-
grae, et phaenomenon transparentiae, quam charta
induit, oleo vel aqua imbuta, explicant, colligit Au-
ctor hoc, quod pro absurdo habet *, poros chartae
aliquanto ampliores esse eo intervallo, quod est inter
lentium conuexarum sibi mutuo impositarum superfi-
cies in loco maculae nigrae. Silentio praeterimus
alia quaedam incommoda, quae GERDILIVS tum
phaenomenorum lucis explicationi Newtonianae,
tum illi vi primitivae, quae apud Newtonianos est P. 124.
gravitatis causa, sub finem primae partis huius libri
obiicit, et ad *secundam partem* nos conuertimus.

In hac Vir doctissimus duo sibi proposuit, pri-
mum, ut ostenderet, phaenomena ascensus liquo-
rum in tubulis capillaribus per principium internum
attractionis non sufficienter explicari; alterum, ut ve-
ras horum phaenomenorum causas physicas, mecha-
nice agentes, demonstraret. Non negat, quaedam p. 176.
illorum phaenomenorum per attractionum leges,
quas Newtoniani vel stabiliuerunt vel sumserunt, satis
bene explicari: sed non nulla superesse contendit,
quae contra systema attractionum faciant. Huc
praecipue refert experimenta hydrargyri, in tubulis
metallicis capillaribus a semet ipso capta. Duos au- p. 194.
reos tubulos, quorum angustioris diameter fuit tri-
cesimae, amplioris vicesimae parti pollicis aequalis,

X 3

in

* Forſan hac in re nihil adeo abſurdi deprehendent
Newtoniani, qui norunt, ex obſervationibus et di-
menſionibus NEWTONI, intervallum inter dua-
rum lentium ſuperficies in margine maculae nigrae,
vix centies milleſimam partem pollicis Londinenſis
excedere. Conf. NEWTONI Optic. L. II. P. I. Obſ.
6. et 8. et Quaest. 29.

in hydrargyrum demersit tumultuarie, ut superiora tubulorum orificia parum prominere: et vidit, in neutro tubulo hydrargyrum sponte sua usque ad orificium superius ascendere, sed potius notabili interuállo infra illud subsistere; immo tenui filo orichalceo immisso deprehendit superficiem hydrargyri in tubulo angustiori depressiorem, quam de ampliori. Deinde plurimis tubuli amplioris concussionibus effecit tandem, ut hydrargyrus ad orificium supremum pertingeret: verum nullo modo efficere potuit, ut in angustiori tubulo hydrargyrus ad libellam usque ascenderet, etiam postquam hydrargyrum aliquoties per eundem tubulum vi traiecerat. Idem erat experimentorum euentus, quum tubulis argenteis, et stanneis, uteretur, nisi quod in stanneis hydrargyrus usque ad libellam facilius ascendere videretur. In orichalceis etiam tubulis semper infra libellam idem fluidum substitisse

p. 199. expertus est. Porro Auctor in siphonem vitreum incuruum, bene siccum et tersum, cuius alterum crus fuit capillare, infudit hydrargyrum, et, ubi omnia ad quietem rediissent, et superficies liquidi in crure capillari multo depressior esset, ac in altero crure, inclinavit siphonem ita, ut hydrargyrus usque ad orificium superius cruris capillaris promoueretur, deinde lente ac sine succussu reclinauit siphonem in pristinum situm, et vidit, superficiem fluidi in crure capillari supra libellam fluidi in ampliori crure haerere.

p. 201. Tandem similis siphonis internam cavitatem oleo oliuarum inunxit, et infuso hydrargyro, obseruauit, in crure capillari hydrargyrum fere ad eandem altitudinem, atque in altero crure, surgere. Haec experimenta, quorum rationem Auctor per frictionem, et per mutuam particularum hydrargyri cohaesionem, satis verisimiliter reddit, quo modo virium attrahentium systemati aduersentur, facile, nobis tacentibus, intelligent harum rerum periti. Sed et vulgatum illud phaenomenon difficilis ascensus aquae in tubulo, pingue-

pinguedine intus infecto, per leges virium attrahentium recte explicari posse negat GERDILIVS, et hac p. 207. data occasione in WEITBRECHTI de tubulis capillaribus dissertationes varias animaduersiones profert. Tandem suam ipse sententiam de phaenomenis tubulorum capillarium, aquam vel alium liquorem fugentium, edisserit. Tres enumerat causas illorum phaenomenorum, 1) inaequalitatem pressionum, quas aqua p. 222. intra et extra tubulum sustinet, 2) atmosphaeram tubuli, aere subtiliorem, quae totam fere eius cauitatem replere, atque in aquam facilius, quam in aerem, sese insinuare ponitur, 3) vaporem, quem li- p. 315. quor continue exhalat, quique aerem, in tubulo contentum, rarefacere posse videtur. Causas hasce non p. 331. solum ab obiectionibus aduersariorum diligenter vindicat, sed etiam in spatio aeris vacuo easdem locum habere contendit; et, haec agens, ubique sollicita cura annotat phaenomena, quae systemati virium attrahentium contraria sunt. Quum per singula huius dissertationis capita ire nobis non liceat: suffecerit, hoc unum monuisse lectores, quod Auctor hoc argumentum ita tractauerit, ut, quanquam expectationi nostrae ex asse non satisfecit, tamen inter praecipuos auctores, phaenomena tubulorum capillarium intelligibili et mechanica ratione explicare conatus, iure suo meritoque censendus esse nobis videatur.

Ceterum ab omnibus, qui naturam sine partium p. 367. studio scrutantur, gratiam certe iniit doctissimus Auctor, quod elegantissimam commentationem, quae cohaesionem hemisphaeriorum Magdeburgicorum ab interno attrahente principio haud pendere demonstrauit, et quam in Diario Parisiorum, *Journal des Savans*, ad an. 1752. mense maio publici iuris fecerat, huic volumini dedit appendicem.



XVI.

New Experiments and Observations on Electricity made at Philadelphia in America. By BENIAMIN FRANKLIN, Esq; communicated to P. COLLINSON, Esq; of London, F. R. S. and read at the Royal Society June 27, and July 4, 1754. To which are added a Paper on the same Subject by J. CANTON M. A. F. R. S. and read at the Royal Society Dec 6. 1753, and another in defence of Mr. FRANKLIN against the Abbe NOLLET, by Mr. DAVID COLDEN, of New York. Part III. London: printed and sold by D. Henry and R. Cave, 1754. 4. pl. 6.

id est:

Noua experimenta et observationes Electricitatis instituta Philadelpiae in America. Auctore BENIAMINE FRANKLINO etc.; una cum dissertatione I. CANTONII de eodem argumento, etc. et DAVIDIS COLDENII Defensione FRANKLINI contra NOLLETVM.

In hac tertia parte commercii epistolici inter FRANKLINVM et COLLINSONVM de electricitatis phaenomenis primum locum tenet FRANKLINI Epistola data Philadelpiae, mense septembri 1753. in qua primo sententiam suam, quod aqua marina fluidi electrici grauida sit, quia in vase agitata, aliquamdiu lucet, retractat, et se huius phaenomeni veram causam nondum detexisse confitetur. Deinde varia de nubium fulminantium electricitate perscribit. Statuit nunc, plurimis observationibus inductus, nubes illas

illas raro *positivae*, plerumque autem *negativae*, electricitas esse, h. e. raro maiorem, plerumque minorem fluidi electrici copiam continere, quam quae nubibus naturaliter inesse potest, seu rarius eiicere ex se, saepius ad se trahere fluidum electricum. Hinc prope ab eorum abest sententia, qui non nubes in terram, sed terram in nubes, emittere fulmina affirmarunt. Ad illud autem phaenomenon explicandum, coniecit, aquam, naturali sua quantitate fluidi electrici dotatam, simulatque in vaporem resoluatur, plus fluidi electrici capere et absorbere posse; quia unicuique particulae aqueae nunc datur spatium, electricam atmosphaeram circa se formandi. De solidis certe Auctor experimento singulari, quod hic tradit, cognovit, aucto eorum volumine, atmosphaeram electricam, quae ipsa ambeat, posse augeri. Sed totam hanc suam hypothesin eruditorum examini permittit, eosque simul rogat, ut, sicubi recentes fulminis effectus observandi copia ipsis fiat, probe attendant ad ictus directionem. Inter ea perstat in sua sententia, virgas metallicas, quarum diameter quartam pollicis partem circiter aequet, a culmine aedium ad terram usque pertingentes, posse aedes a fulminum periculo tutari, vel restaurando aequilibrium inter fluidum electricum in nubibus et in terra, tam celeriter, ut explosio ignis impediatur, vel ducendo hunc ignem via expedita, de qua cum nihil cogat deflectere, donec in summo virgae apice in aërem exeat, aedibus illaesis.

Sequitur alia epistola FRANKLINI, in qua scribit, novis experimentis confirmatam esse suam sententiam, quod nubes fulminantes saepius negativae, quam positivae electricitate praeditae sint.

Proximum locum occupant COLDENII animadversiones in Cl. NOLLETI epistolas, ad FRANKLINUM datas, consilio defendendi FRANKLINI scriptae. In experimento Musschenbroekiano non so-

lum internam ampullae vitreae superficiem, sed externam quoque, abundare fluido electrico, NOLLETVS contra FRANKLINVM demonstrare voluit inde, quod etiam haec externa superficies signa electricitatis omnia edat. Respondet COLDENIVS, initio quidem, quum ampulla nondum intus plena est fluidi electrici, posse aliquem, in pice stantem, tangendo exteriorem superficiem, electricari; quoniam initio experimenti materia electrica, in externa vitri superficie latens, etiam secundum FRANKLINI sententiam, elicitur: sed, postquam ampulla intus plena facta et electricae materiae (quod cognoscitur ex scintillis, quae tunc ex tubo ferreo, ex quo ampulla pendet, elici possunt) hominem, scabello cereo insistentem, neutiquam electricari, anterioris superficiei ampullae contactu. Quod autem NOLLETVS forsan observauerit, leuia corpuscula ab exteriori superficie ampullae electricatae attrahi, id non abundantiae fluidi electrici circa hanc superficiem videri tribuendum, sed potius defectui, cui supplendo materia electrica in illis corpusculis impendatur. Ceterum nouo experimento FRANKLINI sententiam confirmare allaborat. Deinde dissentit etiam NOLLETVS a FRANKLINO negante, vim illam ingentem percipiendi, quae in eodem experimento percipitur, in aqua vel limatura ferri, quam ampulla continet, residere. Sed NOLLETVM hac de re ita aduersus FRANKLINVM disputare, ut statum controuersiae immutet, censet COLDENIVS. Ad reliquas NOLLETI obiectiones cunctas ita respondet, ut simpliciter affirmet, experimenta, ad quae NOLLETVS prouocat, a se repetita longe alium euentum habuisse, eis tamen exceptis, quae in vacuo capta sunt, quippe quae repetendi occasionem sibi defuisse fatetur.

Vltima huius libelli plagula exhibet Cl. I. CANTONI experimenta nouem electricitatis, Societati Regiae

giae Londinensi praelecta, quibus non nulla capita systematis FRANKLINI confirmari videntur. Exco- gitavit ea Auctor admodum ingeniose, theoriae per- ficiendae gratia: dubitamus tamen, num explicatio- nes, quas addit, omnes tam probabiles sint, ut in- telligentium omnium assensum sint laturae. Quum de singulis his experimentis breviter dicere nequea- mus: satius est, ea lectoribus nostris commendare, in hoc ipso libello legenda.

In breui Appendice COLLINSONIVS narrat me- leagridis trucidationem, de qua nos alibi * mentio- nem facere meminimus.

XVII.

Quaestiones medicae Parisinae. Groningae, ty- pis Iac. Bolt. 1754. 8. pl. 15.

Quod diu iam optavit orbis eruditus, ut, quae minoris molis sunt, eruditorum scripta et ad multorum cognitionem, in primis exterorum, non perueniunt, haud raro tamen aliquam scientiae par- tem illustrent, coniuncta typis exscribantur, pluri- um usui inferitura, et quod BOERHAAVIUS in pri- mis de quaestionibus Parisinis cogitavit, sed non ex- pleuit, eius voti nunc ex parte compotes nos reddi- dit, cuius alibi ** mentionem fecimus G. NIC. HEERKENS. Inter eas enim quaestiones, quae Pa- risiis speciminum academicorum sub forma publici sunt iuris, multae inveniuntur, penetralia scientiae medicae recludentes feliciter, et doctrinae partem aliquam dilucidantes. Quae quidem ratio fuit, ut variorum in nostris commentariis adduxerimus ratio- nem, etiam quarundam ex illis, quae hic denuo exhi- bentur. Solas propositas quaestiones sine ulteriori explica-

* vid. nostr. Commentar. Vol. III. Part. I. p. 25.

** vid. Comment. nostr. Vol. II. P. III. p. 539.

explicatione ad annum huius seculi quinquagesimum secundum dedit I. BARON*, eas vero, quas Cl. Auctor nunc congeffit, sunt autem earum decades duae, maximam partem ita prodeunt, prout ab eorum auctoribus olim fuere exhibitae, nisi quod, ipso momento in epistola nuncupatoria, ad Emin. Card. QVIRINIDA, loca, quae aut nimis vulgata aut minus utilia aut parum clara occurrere, excerpserit, omiserit, in quibusdam etiam sermonem castigare laborauerit. Quo quidem iure, quod Galli saepe nimis sibi arrogant, eo minori cum detrimento uti potuit, quod exinde utilium rerum peritia non destituamur, eas vero eleganter et amoene prolatas cum voluptate excipiamus. Omnium quaestionum uberiores a nobis non requireret beneuolus Lector expositionem, earum tantum dabimus summam, et de ultima, quae a Cl. Auctore est confecta, plura dicemus.

Continet ergo *decas prima sequentes*: 1) An mulieres pluribus obnoxiae morbis quam viri? Praef. GABR. ANT. IACQUES, proponit *Le-Thuiellier*, et affirmat 1743; 2) An renouatus aer sanitati saluberri- mus? Praef. M. FL. COLDE VILARS, proponit *Car. Franc. Theroulde de Toulouse de Valon* affirmando 1747; 3) An cibus deterior sed iucundus et assuetus, meliori sed ingrato et inassueto, potior? Etiam affirmando proposita sub praef. M. IUL. BVSSON, a *Ludov. Anna Lavirotte*, 1751. 4) An legumina prae ceteris alimentis salubria? Sub praef. IAC. ANTON. MILLET, proposuit *Barth. Murry* et affirmavit 1735. In subiecta Cl. Auctor nota exemplis veritatem theses simul corroborat. 5) An eunuchus ut corpore sic et mente minor? praef. M. VRB. LEAVLTE, proponit *Claud. Car. de Iean*, affirmatque 1733. 6) An chocalatae usus salubris? proponit STEPH. BACHOT, et affirmat, seculo superiore. Simulque hic Cl. Auctor CORNARVM aduersus

BACO-

* Conf. Comment. nostr. Vol. III. P. II. p. 344.

BACOTIVM defendit. 7) An a frequentiore potu Café vita breuior? Praef. M. LVD. GVILIELM. LE MONNIER, proponit *Edm. Thomas Moreau* 1751. affirmando. 8) An tabacum lentum sit homini venenum? Praef. IO. MAR. DE LA SONE, proponit affirmando *Io. Bapt. Bariolle*, 1751. 9) An ad sanitatem equitatio? Praef. M. CAR. DIONIS, proponit *Claud. Guilbert de Preval*, 1751. affirmando. 10) An in curanda lue venerea suffimigia rite adhibita, remedium optimum? Affirmando sub praef. M. LVD. RENAT. MARTEAU proponit *Nat. Andr. Chesneau*, 1745.

In *decade secunda* vero collectae sunt hae 1) an Venus hystericis? Proposuit eam affirmando STEPH. BACHOT. Haec atque sexta primae decadis ex parrergis BACOTII, 1686. Parisiis editis, repetitae fuerunt. 2) An obesis somnus brevis salubrior? Praeside THO. RENAT. GASNIER, proposuit *Oliv. Bougourd* 1733 affirmando. 3) An carbonum vapor in clausis cameris sedulo vitandus? Concedendo praef. M. FRANC. POVSSE, proponit *Anna Car. Lorry*, 1747. 4) An ab omni re cibaria vasa aenea prorsus ableganda? Praef. CAM. FALCONET, proposuit *Franc. Thierry* 1747. affirmando. 5) An omne esculentum vegetabile cultura salubrius? Sic iudicat praeside STEPH. L. GEOFFROY, proponens *M. Anton. Iussieu*, 1747. 6) An gymnastica, morborum contumacium, optima medicina? Praef. PETR. IAN. BVRETTE, proposuit *Balib. Tussau le Clerc*, 1746. 7) An Parisinis frequens potus theae frequenti potu caffae salubrior? Praef. IO. FRANC. COVTHIER, proponit *Ant. Garnier*, affirmando 1749. 8) An senibus chocolatae potus? Praef. HIAC. THEOD. BARON, proponit *Io. Franc. Clem. Morand*, affirmando, 1748. 9) An diu possit homo, sine cibo potuque et viuere et valere? Proposuit FRANC. DE PAVLA COMBALVSIER, 1750.

1750 *. 10) An sepultura in urbe et templis prohibenda? Affirmando proposuit GER. NIC. HEERKENS, 1754. De hac autem, cum a Cl. Auctore proposita sit, praecipua iam adducemus momenta.

Peruersum illum morem, cadauera in templis asseruandi, increpaturus Cl. Auctor, quantum quidem sit, qui hominis nomen tueri voluerit, officium demonstrat, quo demortuorum corpora honesto terrae mandentur modo, multiplici porro eruditionis literariae apparatu declarat, quanta et priscorum in exequendo hoc officio olim fuerit sollicitudo, quibusue cauere studuerint modis, ne viuis a necessaria, quae in corruptionem prouum animale cadauer manet, putredine inducatur noxa. Aegyptii enim et ab hac arcere studebant corpora, balsamatione, concremabant eadem aliae gentes, Romani sepulturam et uersionem cadauerum intra urbem lege prohibebant, ut ex his et nociuis praecipue, morborum pestiferorum auctore, effluuiis aerem inquinantibus extra urbem et templa relegandam esse sepulturam pateat, ne noceant ciuitati, qui prodesse non possunt.

Quum autem nunc tantum Cl. Auctori, cui se praecipue laudabili cum studio dicauit, diaeteticas placuerit colligere commentationes, ut illas, ad alias etiam scientias medicas pertinentes, et ex his laudem promerentes velit colligere, peramanter exoptamus atque hortamur.

* vid. Comment. nostr. Vol. I. P. I. p. 121.



XVIII.

Dissertation en Forme de Lettre, sur plusieurs Maladies populaires, qui ont régné depuis quelques années à Châlons-sur-Marne, et dans une partie du Royaume. Avec des Reflexions Physiques sur l'Operation des Remedes, qui ont été employés pour les guerir. Par M. NAVIER, Docteur en Medecine, et Associé Correspondant de l'Academie Royale des Sciences de Paris. A Paris, 1753. Chez la V. Cavelier, et Fils. In 12. plagul. II. sine praefat.

id est:

Dissertatio epistolaris de variis morbis epidemicis, qui Catalauni et in quibusdam regni gallici prouinciis ex aliquot annis grassati sunt. Vna cum meditationibus physicis de adhibitorum remediorum operatione. Auctore Cl. NAVIER.

Totum opus duabus epistolis constat, quarum prior de dysenteria, altera vero de variolis, morbillis, febre scarlatina et tussi ferina infantum agit. Pecorum epidemicus morbus, qui Catalauni anno 1744 grassari coepit, insequentis quasi epidemicorum morborum seriei praeludium fuit. Anno enim 1747 maligna febris, sudor anglicus dicta, insecuta est, quam aphtha gangraenosa, tot infantes e medio tollens, excepit, et, hac terga dante, dysenteria anno 1749 et 1750 in scenam prodiit, qua euanescente variolae, boni tamen characteris, sub finem anni 1750 et ineunte anno 1751 apparuere. Hanc, p. 2. quae epidemica quidem, neutiquam vero contagiosa fuit, dysenteriam, non ab aeris vicissitudinibus, sed a pere-

- peregrinis miasmatibus, per aerem, salivae, cibis, vel etiam sanguini in pulmonibus se immiscentem, in primas vias delatis, ibidemque plus minus magnam phlogosin excitantibus, originem duxisse credit Cl. Auctor. Mitis quidem in principio, sub finem vero mensis augusti anni 1750 longe grauior longaque difficilior curatu fuit. Venae sectio enim, abdominis fomentationes, potus demulcentes, clysteres, ipecacuanha et rhabarbarum tollere quidem morbum videbantur, sed mox de nouo et maiore cum furore apparuit. Maxima aegrorum pars circa morbi finem febrem intermittentem tertianam duplicatam paruis manuum pedumque refrigerationibus et oscitationibus quibusdam se manifestantem sensit; quam ob rationem quoque hanc dysenteriam ex fermento febrili, in intestina deposito, ortam esse cum SYDENHAMO credit Cl. Auctor. Corticem igitur peruuanum rhabbaro, ipecacuanhae, nitro, et interdum etiam camphorae grano semis sociauit, et sub boli forma duorum vel trium dierum interuallo, vel crebrius etiam pro febris exigentia exhibuit, interpo-
- p. 29. fitis cardiacis, demulcentibus, anodynisque. Opitata vero, clysteribus nimia dosi addita, stuporem generalem produxerunt. Casus quidam adstringentium
- p. 31. noxam satis demonstravit. Dysentericus viginti quinque vel triginta annorum, qui comestis primo statim die multis cydoniis, una cum aliis pyris, coctis, alui fluxum per viginti quatuor horas cohibuerat, post tres vel quatuor dies vehementissimos pedum dolores paruaque totius corporis intumescantiam, et bi-
- duo post, eosdem dolores in manibus carpisque, itidem intumescantibus, et dein in toto corpore, longe vehementius tamen in articulationibus, sensit. Post purgationes vero, a Cl. Auctore institutas, quae dolores valde mitigarunt, diarrhoea, aliquot dies durans, et dolores tollere visa, insecuta est, qui vero, cessante eadem, statim recruderunt. Purgantia igitur per

per vices continuata cum potu abundante diapnoico, post sex demum septimanas, aegro, membrorum motum antea prorsus abolitum, pristinamque sanitatem, restituerunt. De reliquo in vermium praesentia bolo superius descripto aquilam albam (seu flores salis ammoniaci) adiecit, et vesicatoriorum applicationem ob peregrina miasmata necessariam iudicavit, suppurationem vero largam theriaca, recenti butyro mixta, et neutiquam nova cantharidum inspersione sustentavit Cl. Auctor. Vitrum antimonii ceratum, p. 40. quod in hac dysenteria nihil iuuit, ad grana sex, cum aequali portione gummi tragacanthae, in forma boli, feminae triginta quinque annorum dysentericae exhibuit. Hicce bolus nebula inuolutus deglutiri debebat, cum eundem vero aqua calida dissolutum assumeret, decies vel duodecies exinde vomuit, et plus quam vices aluum deposuit. Neutiquam igitur vitrum antimonii ceratum in aqua calida assumi debet *. Regulinae enim vitri antimonii partes, cerae ramentis inuolutae, ab aqua calida, ceram dissolvente, adeo rursus denudantur, ut emeticam suam virtutem libere exercere possint. Emetica etiam virtus praeparatorum antimonii non in sulphure, sed in regulinis partibus haeret. Kermes porro minerale, p. 53. seu sulphur antimonii auratum, prodigiosa quantitate partium regularum armatum est. Quodsi enim huius pars quaedam, vitri frustulo indita, carbonum igni, in loco obscuro, imponatur, fusa et ardens coeruleam flammam sulphurei odoris reddet, et vitrum tandem, ab igne remotum et refrigeratum, materiem albam admodum leuem exhibebit, quae, micro-

* Clariss. vero GEOFFROY aquam calidam superbibendam suavit, si vitrum antimonii ceratum vomitus excitet. vid. Philos. Transf. Vol. XLVII. artic. 41. p. 273 seq. et Commentar. nostror. Vol. III. Part. I, p. 33.

microscopio examinata, nil nisi contextum regulinarum partium, in spicula admodum tenuia dispositum, ostendet. Sic in tartaro emetico ne minimum quidem sulphuris vestigium detegere potuit; ex uncia una vero eiusdem, cuius dosis grana sex erant drachmam unam et grana quadraginta sex reguli extraxit. Emetica quoque virtus vetusti pulveris *de tribus*, cornachini alias dicti, ex unione cremoris tartari cum diaphoretico minerali unice pendet, ex quibus, tractu temporis, corpus sub forma salis mediocris in aqua calida admodum solubilis, oritur. Indidit enim Cl. Auctor filtro papyraceo in infundibulo vitreo vetustum pulverem cornachinum, eidemque aquam ebullientem affudit, quae filtrata, biduo post multas crystallos, in acus extreme tenues formatas, et sub papillarum, seu parvorum globulorum forma, cuspidibus, erinacei in modum, armatorum, deposuit. Miscuerat quoque anno 1738 cremoris tartari et antimonii diaphoretici bene abluti ana unciam semis, quae, usque ad finem anni 1750 quiete reposita, in massam splendentem mutata erant. Hanc vero massam filtro et infundibulo, uti superius, indidit, aqua ebulliens affusa, omnem, excepta drachma una cum semisse materiei albae non salinae, solvit. Filtrata aqua nullas quidem deposuit crystallos, inspissata vero in balneo maris, splendentem massam, in aere parum sese humectantem, pròduxit, quae ad grana sex, nauseas, ad grana vero viginti quatuor data, vomitum unum vel alterum, et alui fluxum, excitavit. Hinc cremorem tartari per unionem, cum calce antimonii, vel forsitan cum qualibet calce metallica, solubilem fieri, et, ex eadem ratione, purgatricem pulveris cornachini virtutem, potius augere, quam diagrydii corrigens esse posse, concludit Cl. Auctor. Praeterimus vero variolarum et morbillorum, qui exeunte anno 1750 et ineunte 1751, Catalauni grassati sunt, curationes. Methodum
enim,

enim, qua Cl. Auctor usus est, ex SYDENHAMII, FREINDII, BOERHAAVII, HELVETIIQUE methodis compositam, lectoribusque nostris diu cognitam esse deprehendimus. Ipsae variolae satis benignae fuerunt. Variolosum vero fermentum putridae naturae esse, et hinc per specificum acidae vel acidulae naturae extinguere posse sperat. Aetherem nitrosum et liquorem mineralem anodynum HOFFMANNI specifica, per excellentiam huic scopo apta, esse arbitratur, et quaerit, cur SYDENHAM acidia non in principio morbi exhibuerit, cum tamen eorundem bonos effectus in progressu morbi adeo laudauerit? Certissima eius remedia, quibus variolae et morbilli praecaveri, aut saltem ad bonum characterem curatuque facilem reduci possunt, in eo consistunt, ut, cum ambo morbi sint inflammatorii, fluida solidaque nostri corporis in eius modi statu seruentur, in quo minimae inflammationis capacia esse possunt, seruando nimirum solida in magna flexibilitate, et sanguinem reliquaque fluida in magna dulcedine, id quod obtineri posse arbitratur, vitando longas vigilias, intensos corporis animique labores, iram, immoderatum gaudium, tristitiam, omnesque violentas animi passiones, aromatibus conditos cibos, et succos animalium concentratos, cibos salitos, fumo induratos, excessum vini, in primis spirituosum, spiritus vini, potus caffee, chocolate etc. et obseruando victum simplicem, dulcem, vegetabilem et animale, potionem aquoso-acidulam, fructus horaeos maturos, balnea ad transpirationem promouendam, et in omnibus tandem moderationem, ne ventriculus oneretur. Quis vero est, qui haec omnia ad vitae usque finem obseruare velit, vel, si etiam velit, possit? Variolis tandem, a mediocri orto frigore fere prorsus extinctis, tempestate dein paulo mitius facta alius apparuit epidemicus morbus variolis longe magis inflammatorius, febris nimirum rubra, scarlatina dicta. Hic morbus per

p. 73.

p. 91.


p. 179.

p. 208.

febrem admodum vehementem se manifestavit quae animi deliquiis, lassitudinibus spontaneis, capitis, fauciumque doloribus, deglutitionem impediens, comitata erat. Secundo die et saepe post viginti quatuor vel triginta horas in toto corpore maculae rubrae, viuido scarlatino colore, largae, manus magnitudinem saepe excedentes, figurae irregularis, et dorsum, pectus, femora et nates saepe ita tegentes, ut unica tantum esse videretur, apparuerunt. Hae maculae, quouis fere momento disparescentes, se in alia loca erysipelatis more conferre videbantur, in quibus antea non fuerant. Manus easdem tangens calorem viuidum et ardentem, praecipue in adultis, sentiebat, et cutis ruberrima digito compressa albescens, remoto digito statim rursus rufescebat. Pulsus parvus et frequens erat, et respiratio difficilis et intercepta et singultuosa in plurimis esse videbatur. Halituosus vapor e pulmonibus egrediens adeo calidus et urens deprehendebatur, ut unusquisque hunc percipiens faciem ab aegro statim auertere cogeretur. Haec febris etiam interdum cum manuum et brachiorum inflatione coniuncta fuit, integrasque familias aut insimul aut successive inuasit. Vidit Cl. Auctor infantes, hoc morbo laborantes, quibus prodigiosa leucophlegmatia superuenit. Quidam hac febre laborans et usque ad palpebras leucophlegmaticus, parcissimam brunam urinam reddens, qualem in hac febre saepissime, imo interdum sanguinolentam secedere asserit Cl. Auctor, praemissis praemittendis, ab omnibus symptomatibus, vesicatoriorum applicatione, liberatus fuit. Quidam ventrem flatibus distentum (*dans un état de météorisme*), et linguam valde siccam, plurimi vero humidam habent. His, qui emergunt, epidermis quinto vel sexto die per squamas decedit, quin imo adolescenti tredecim vel quatuordecim annorum tota manus pedisque cuticula, exceptis unguibus decedit, quarum unam adhuc

huc Cl. Auctor asseruat. Nisi aegro statim in primo p. 212.
 morbi impetu succurratur, escharae gangraenosae in
 fundo faucium versus arcus et velum palati superue-
 niunt, et hisce ortis pauci emergunt; haec gangraena
 oesophagum asperamque arteriam saepe ante occupat,
 quam illam percipere illique mederi queamus. Pro-
 gressum vero huius internac gangraenae quam certif-
 sime impedit gargarisma ex oxymelle cum adiecto spi-
 ritu vini camphorato, qui vero HOFFMANNI me-
 thodo sale alcali praeparatus esse debet, ne aquosis
 mixtus lactescat. Quidam hac febre rubra affecti p. 213.
 quarto vel quinto die eodem modo pereunt, ac si
 per inflammationem gangraenosam pulmonum suffo-
 cati essent; alii post vehemens delirium morientes
 magnam saniei quantitatem per os et nares reddunt,
 et rubrae antea maculae post mortem in quibusdam
 prorsus violaceae conspiciuntur. Haec symptomata p. 214.
 vero in infantibus longe minus violentia sunt, reme-
 diisque facile cedunt. Causam huius morbi non so-
 lum cum illa, quae sudorem anglicum, aphtham
 gangraenosam, dysenteriam etc. excitavit, eandem
 esse dicit, sed in miasmate, quod cum morbilloso
 comparat, acri, caustico, et putrefaciente, consiste-
 re, ipsiusque morbum analogiam alere perhibet cum
 morbo epidemico pecorum. His enim conualescen-
 tibus pili et epidermis eodem modo deciderunt, ac
 hominibus cuticula, et in cadaueribus pecorum aper-
 tis semper viscera quaedam gangraenosa inuenit Cl.
 Auctor. Ex pecorum igitur morbo hanc febrem per p. 223.
 contagium ortam esse arbitratur, eandemque cum
 variolis ideo quoque conuenire asserit, quia magnus
 infantum numerus eandem breui ante vel post vario-
 las habuerit. Virgo quaedam post hanc febrem variolis
 discretis benignissimis laborauit. Venae sectio interdum p. 225.
 ob vehementiam inflammationis summe necessaria
 est. Praefert vero venae sectionem in brachio, illam
 enim in pede institutam varia saepius exceperunt in-

- commoda, in primis si viscera, quod saepissime fieri asserit, inflammatione quadam affecta fuerunt. In delirio vero vel comate iugularem quoque secare curavit. Serum lactis tamarindinum plantisque nitrosis sociatum, pro potu largo et clysmate iniiciendum, post institutam venae sectionem maxime commendat. Si purgantia propter symptomatum violentiam exhiberi non possunt, vesicatoria inter scapulas vel in suris optimi effectus esse deprehenduntur. Ad refraenandum statum solidorum spasmoticum paregorica parua dosi, post purgationes vero maiori exhibuit. Infantes, hac febre scarlatina decumbentes, ordinarie ante febrem tussi ferina laborarunt, quae vero cum febre sese imminuit, et cum illa quoque evanuit. Quodsi vero febris cum cardiacis tractabatur, tunc post febrem longe vehementior euasit tussis. Et licet pauci exinde mortui sint, plurimi tamen pulmonici facti sunt, id quod ex sectionibus satis apparuit; modo enim suppuratos, modo inflammatos, modo ad pleuram adhaerentes inuenit Cl. Auctor pulmones. Hanc tussim epidemicam cum morbillis, febre scarlatina etc. eiusdem quidem naturae, longioris vero durationis et difficilioris curationis esse arbitratur. Expectoratio quidem negligi non debet, praefert vero vesicatoria omnibus becchiis. His iungenda sunt lenia purgantia reiterata. Paregorica parca manu et magna cum circumspectione adhibenda sunt. Infantibus tandem, hoc morbo laborantibus, lac nullos usus praestare saepius obseruauit Cl. Auctor.



XIX.

C. E. ESCHENBACHS *d. A. D. Chirurgie. Mit Kupfern. Rostock und Leipzig, bey Johann Christian Koppe, 1754. 8. 3 Alph. 6 Bog. 7 Kupfer-tafeln.*

id est:

CHRISTIANI EHRENFRIED ESCHENBACHII *Chirurgia. Adiectae sunt Tabulae aeneae VII.*

Paucos forte latet, Cl. Auctorem, cuius chirurgiam iamiam lectoribus nostris indicare constituimus, ante octennium edidisse elementa chirurgiae in usum praelectionum academicarum, ideo, quia tum nullum exstaret huius artis compendium, lingua nostra patriae conscriptum, tironibus chirurgiae exponendum. Ex eo vero tempore Cl. HEISTERVS ex maiori sua chirurgia contulit ea, quae instituendo tironi sufficere ei videbantur, linguaque nostra vernacula compendium edidit chirurgiae. Antequam vero prodiret iste tractatus HEISTERI, ediderat iam institutiones chirurgiae, germanice conscriptas, b. Ill. FLATNERVS, cuius memoria nobis est desideratissima, et cuius fama, quam consequutus est scriptis suis, artem chirurgicam illustrantibus, per se nota est, neque laude nostra indiget. Habemus itaque confidente Cl. Auctore nostro ipso, praecepta et institutiones chirurgicas, ab conterraneis nostris conscriptas, dignitate, eruditione, ordine concinno et inuentis nouis, quibus abundant, etiam exterorum scriptis non postponendas. Fatetur hinc Cl. Auctor, videri, ac si actum ageret, cum molitur, nouam conscribere chirurgiam, supra adductis egregiis libris iam editis. Inter ea comprobandus est Cl. Auctor conatus, secundum quem, elementa chirurgiae suae, aucta et emendata, variisque experientiis, quae ex

eo tempore fecit, postquam libellum primum edide-
 rat, confirmata, denuo in lucem emittit. Arbitra-
 rias esse docentium methodos cuique notum est; hinc
 etiam Auctori nostro, ordine proprio suoque modu-
 lo praecepta artis, quae manu medetur, proponere
 placuit. Ex eo enim fundamento, quod cum ple-
 risque non inique adsumit, chirurgiam esse veram
 medicinae partem, recte opinatur, posse et hanc
 scientiam illo modo, quo medicina traditur, exponi
 discipulis. Scientia enim remediorum, quae sani-
 tatem praesentem conseruat, prophylactica nuncupa-
 tur, morbos vero praesentes quae tollere suscipit,
 therapeutica salutatur a medicis: quid ergo impedit,
 quo minus etiam ad mentem Cl. Auctoris, hac diui-
 sione adsumta, corpus doctrinae chirurgicae ita expo-
 natur et tironibus huius artis tradatur, cum idem
 finis, integritas et corporis humani cura, utrique
 doctrinae communis sit. Diuisionem, quam adduxi-
 mus libri huius, in quo Cl. Auctor primum agit de
 auxiliis et remediis chirurgicis, sanitatem praesentem
 conseruantibus et deinde de iisdem, morbos ipsos
 tollentibus, non improbamus, cum cuilibet liberum
 sit, voluntaria methodo disponere dicendorum sum-
 mam, praesertim, si auctori suo facilitate quadam
 superare videtur, reliquas, prout et Nostro de sua
 expositione illud adfirmare libuit. Inter ea nec haec
 in laudem Auctoris reticere possumus, quod serio
 dissuadeat chirurgo nouitio, adhaerere tantum prae-
 ceptis doctoris, quem sibi elegit; sed potius cum re-
 cte edocet, cuncta, quae ei in arte sua obueniunt
 peragenda, sedulo considerare, neque quidquam ra-
 tione sufficiente destitutum suscipere. Ista vero artis
 certitudo, quam inculcat Noster, acquiritur, partim
 sedula observatione, partim lectione indefessa aucto-
 rum, utrumque tamen circumspecte instituendum
 est. Praeuntem habent, qui haec imitari cupiunt,
 Cl. Auctorem, qui varia eruditionis copia, et sen-
 tentias

tentias veterum, et placita recentiorum sedulo et magno labore collegit, et ea adfertis suis, ut clariora euaderent, subiecit et adposuit, quibus insimul etiam probare annitur, non nulla inuenta recentiorum antiquioribus scriptoribus iam fuisse cognita, imo non nulla clarius exposita olim, ac nunc fieri solet. Latine equidem adposita sunt testimonia haec auctorum, pro chirurgis huius doctae linguae non ignaris; maiori tamen iure lectioni medicorum commendanda. Non superfluum esse putamus indicare hic quoque, lectionem huius libri illis eo faciliorem fore, quo maiori studio ex anatomia Cl. Auctoris, in qua ex nominibus artis graecis germanica fecit et recepit nomina, nota et familiaria ea sibi reddiderint, cum iisdem hic quoque usus sit.

Praemisit operi suo insuper Cl. Auctor perspicuam expositionem iconum appositarum, quae sistunt fascias non nullas chirurgicas, neque ab HEISTERO, neque a BASSIO delineatas. *Tabula* itaque *prima* modum tenendi fasciam conuoluendam figura repraesentat. *Secunda* fasciam, monoculum dictam, et aliam pro utrisque oculis. *Tertia* fasciam in morbis nasi cum splenio supponendo. *Quarta* fascias mammarum duas. *Quinta* fasciam mammarum compositam. *Sexta* fasciam herniarum, vulgo bracherium vocant, in bubonocle sinistri lateris una cum partibus, hanc componentibus. *Septima* subligaculum, ex arcu ferreo confectum et fasciam, loco bracherii adhibendam. Constituimus non immerito, quo eo clarius ordo, quem tenuit Cl. Auctor in tractatu hoc, pateat, ipsam operis sciagraphiam, breuem hic quoque adducere, quia insimul hac ipsa argumentum libri exponitur. Non nulla tamen ex introductione praeliminari commemoranda sunt. Postquam Cl. Auctor chirurgiam ipsam descripsit, et media, quibus opus habet chirurgus, ut dextre agat, instrumenta nempe et medicamenta, indicauit, progredi-

tur ad eius historiam et ad enarrandas diuersas huius artis aetates et incrementa, adducens quoque auctores plurimos, scriptis suis illam illustrantes, ubi merito recentiores praefert antiquioribus, et primarium chirurgi futuri laborem in addiscenda structura corporis humani esse statuit, et in coniuncta cum hac cognitione remediorum, quibus olim necesse habet. Quibus omnibus demum ipse adiiciat eorum, quae suscipit, conaminum, rationes probabiles vel veras, et experientiam rationalem et fidam. Cum pauci prostant libri, materiam externorum remediorum exponentes et indicantes, laudanda est Cl. Auctoris industria, quod medicamentorum, sic dictorum chirurgicorum, indicem et syllabum, una cum accurata horum descriptione et virium enumeratione, tam simplicium, quam compositorum, tironibus exhibuerit. Simili modo ac ratione etiam adducit reliquam suppellectilem, chirurgi necessariam, quorsum referuntur instrumenta varii generis, fasciae et vincula, variis corporis humani partibus, diuerso modo adplicanda. Reliqua forte, quae adhuc ex hac introductione commemorare possemus, exponunt copiose chirurgi studia, mores et vitae genus, quod sibi eligendum habet, si dextre et cum laude officio suo rite defungi velit.

Tota autem tractatio in duas, quod iam adnotauimus, abit partes, ex quibus *prima* remedia et auxilia chirurgica, recenset, quae sanitatem conseruant, et in quatuor iterum articulos subdiuiditur, quorum *primus* de sanguinis detractione ex venis et arteriis, nec non per scarificationem et hirudines exponit, *secundus* fonticulum, setaceum et vesicatorium describit, *tertius* enematum, suppositoriorum balneorum, humidorum atque siccorum, fotuum et frictionum rationes expendit, *quartus* tandem infusionem sanguinis et medicamentorum in venas, simulque excutiae ventriculi et inoculationis variolarum

rum naturam explanat. *Pars* porro *secunda* proponit remedia, morbos ipsos sanantia. Horum autem triplex instituitur consideratio, simplicium nempe morborum chirurgicorum deinde compositorum, tandemque partium specialium. Ad simplices pertinent, inflammatio, suppuratio, abscessus, ulcus, gangraena et sphacelus. Compositis vero adnumerantur vulnus per se, vulnera porro tendinum, nervorum, ligamentorum, arteriarum et venarum, ulcus fistulosum seu fistula, tumores folliculosi, sarcoma, scirrhus, cancer, oedema, ancylosis, emphysema, sugillatio, aneurismata, varix, luxatio et fractura. In specialioribus partium morbis initium faciunt capitis vulnera et faciei, sequuntur hydrocephalus, emphysema capitis, tinea. Morbi palpebrarum deinde exponuntur, glandulae et sacci lacrymalis, praeter hos morbi oculi et cataracta. In naribus morbi varii exoriuntur et polypus speciatim. Os externum praeter alia mala foedatur labio leporino. Dentes, lingua, os internum et collum, varios patitur morbos, a quibus, sigillatim descriptis, transitus est ad vulnera thoracis, morbos mammarum, empyema, hydropem et gibbositatem. In abdomine obveniunt vulnera varia, hydrops et herniae variae species, nec non calculus. Deinde et suis adficiuntur incommodis partes genitales et anus, in quo praecipue fistulae occurrunt. Ultimo deinde loco post partus difficilis disquisitionem artuum extremorum morbi finem libro faciunt.

Postquam itaque uniuersalem huius libri conspectum exhibuimus lectoribus nostris, nexumque morborum et horum curationes, secundum ordinem, quem elegit Cl. Auctor indicauimus: transeundum nunc est ad singularia quaedam capita, ex quibus, enarranda sunt, quae Cl. Auctori vel sunt propria dogmata, vel quae cum aliis adsumsit, experientia tamen confirmata. Speciminis loco sit expositio eius
de

de inflammatione, morbo omnium fere frequentissimo et chirurgiae studioso quam maxime necessario.

p. 177. Inflammationem itaque partem aliquam comprehensisse docet, si rubor, ardor, dolor, pulsatio artierum, tumor et tensio cum aliqua duritie in parte conspiciuntur. Haec signa, ut plurimum praesentia, semper adiunctam habent febrem, vel uniuersalem, vel partialem, cuius nullam tamen insimul mentionem facit Cl. Auctor. Videtur nobis insuper, ac si signa inflammationis, quae CELSVS enarrat, et quae alii pro indicanda inflammatione sufficere putant, eaque tantum adducunt, Cl. Auctoris indicata quoque sub se complectantur, cum ardor, pulsus artierum molestus et tensio partium unica doloris designatione exprimantur, qui pro gradu morbi ipsius varius est. Neque tenax ista ac albida sanguinis pellicula semper adest in inflammatione adfectis, neque etiam certum huius morbi indicium exhibet, et si reperitur, nonne etiam pro effectu inflammationis haberi poterit? Bene quidem monet, se in chirurgia sua pertractare tantum constituisse morbos externos, hinc etiam de inflammatione partium externarum hic age-

p. 185. re atque necessaria exponere velle: An vero secundum mentem Cl. Auctoris causae internae, inflammationem aliquam externam producentes, non indicandae sint tironi chirurgiae, de eo aliter sentimus,

p. 183. in primis, cum causam proximam, stagnationem nempe sanguinis in ultimis arteriis, quae etiam abscondita est, una cum vitiis reliquis solidorum et fluidorum enumeret. Et nos sumus in ea sententia, non posse commode explicari ortum huius morbi, si plane negliguntur causae internae, inflammationem efficietes, neque, si ad eas non adtendimus, illasque remouere cogitamus, possibile esse, inflammationes metastaticas, post febres continuas ortas, recte intelligere et curare: fiunt etiam saepius spontaneae humorum dyscrasiae et ad circulationem ineptae, quae

quae stagnando corrumpuntur et morbis inflammatoriis partialibus initium praebent. Frequentes sunt tales humorum in variis partibus congestiones, quae tumores efficiunt et inflammatione semper, vel resolvuntur vel etiam suppurantur, e. g. bubones, carbunculi, furunculi: non tamen negare possumus, subesse non leue discrimen in origine et causis horum morborum, in symptomatibus, in cura ipsa: hinc liberum relinquimus Cl. Auctori, referre omnes hos morbos ad inflammationem: satius tamen esse, nos putamus, praemissa doctrina generali de inflammatione, sigillatim enarrare partes, quibus superuenit, et deinde, quid in unaquaque parte speciatim observandum sit, cum omnium structura plane inter se diuersa sit, et causarum origo varia. Gradus inflammationis vel leuiiores, vel grauiiores, dum constituit Noster, primum huius erysipelas esse statuit et phlegmonem alterum, qui facile in pus seu abscessum transeat, illudque eo probare annitur, quod eadem medicamenta, gradu efficaciae et virtutis tantum diuersa, adhibeantur in utroque morbo: quae adfertio non generaliter valere poterit. Porro denuo erysipelas distinguit in rubrum et album, à vasis diuersi generis, in quibus, vel sanguis, vel lymphæ haereat; nempe rubrum dici, si vasa sanguinea, album, si lymphatica infarcta sint humore peregrino. Si causa inflammationis est stagnatio sanguinis in minimis arteriis, prout nemo negat, et quidem eo in loco, ubi sanguis arteriosus in venas transfunditur rubicundus et coloratus adhuc: tunc iste sanguis, circulatione citatiore huc delatus et impeditus in motu, efficit inflammationem proprie sic dictam: hinc clarum est, minus commode impeditum circulum humorum lymphaticorum, qui in extremis tubulis cutaneis contingit, et vero suo nomine erysipelas vocatur, ab Cl. Auctore pro mitiore gradu inflammationis sanguineae haberi, cum causa, symptomatibus

et

- et cura multum inter se differant. Antiqui et non nulli recentiorum vocant hoc erysipelas inflammationem, ex errore loci factam. Si porro erysipelas non
- p. 182. differt ab inflammatione sanguinea, cur adfirmat Auctor praecurrere febrem morbum ipsum, et febrem, erysipelas efficientem, morbo esse priorem et ab aliis
- p. 186. causis oriri? Quam causam adlegat inflammationis, stagnationem nempe sanguinis rubri, eam obstructionem adpellat, cum tamen vocabula germanica, (*Stockung und Verstopfung*), quibus loco citato indistinctim utitur, singularis sint significationis, aliumque statum morbi indicent. Stagnatio attenuari et repelli poterit: obstructio vero vasis, quae plenariam vasis obturationem omnemque circulum humorum sublatum innuit, numquam resolui poterit, sed ruptis
- p. 187. vasis et effusis humoribus, semper efficit pus. Scirrhosas indurationes non numquam post male curatam inflammationem remanere certum est: sed an in solis lymphaticis vasis, illud crebro fiat, dubitamus, prout etiam illud forte rarum est, post inflammationes praegressas in venis remanere varices, ibi, ubi valuulae earum constitutae sunt, et quia venarum diameter nimium expansus fuerit, cum proprie inflammatio venas non adficiat, et motus, qui eis a non nullis tribuitur, sanguinem repellendi, nondum ex-
- p. 190. tra omnem controuersiam positus sit. Dolorem molestissimum, partium inflammatarum symptoma, ab extensione sola arteriarum deducit, qui potius ramificationibus neruorum, parti adfectae intextis, adscribendus est, cum vasa sanguifera, etiam dissicilia, parum doleant. Persuadet sibi Cl. Auctor dolentes arteriarum fibras, vel medicamentis emollientibus solis, varia sub forma adhibitis, vel etiam anodynis et opiatis sopiri posse: hinc et b. PLATNERVM nostrum, qui opiatorum usum in inflammationibus recte reiiicit, inter eos collocat scriptores, qui sinistre de effectum opiatorum iudicant, et miratur, quod nul-
- la

la ratio, cur noceant, adiecta sit, cum tamen horum effectus, quem praestant in corpore humano, satis superque notus sit omnibus In omni inflamma-
 tione, vel incipiente, vel et ea, quae iam increuit, p. 188.
 omnis cura eo dirigenda est, ut impediatur copiosior adfluxus sanguinis ad locum iam adfectum, et ut omnes humores, hic stagnantes, auocentur et reliquo sanguini, adhuc circulanti, admisceantur denuo, consentiente nobiscum hac in re Cl. Auctore. Huic vero scopo adsequendo, quem intendimus, minime conueniunt opiata, quorum actionem in relaxatione solidorum et fluidorum motibus cohibendis consistere, satis firma et certa experientia comprobauit: hinc in leuiori inflammatione, neque discussionem, neque in grauiori malo laudabile pus, ut illud vocant chirurgi, viribus vitae elaborandum, fieri permittunt. Si dolor mitior factus, vel plane remisit, tunc omni opera humores hucusque stagnantes attenuandos et propellendos esse, innuit Cl. Auctor et, ut com-
 mode peragatur, suadet, diluentibus internis, p. 193.
 externis vero resoluentibus et roborantibus illud tentare: Sed hac in re forte non inique iudicamus, si adfirmamus, nimium tribuisse Cl. Auctorem remediis suis, varie inter se mixtis, cum non semper in omnibus hominibus, aetate, habitu corporis et idiosyncrasia singulari diuersis, eundem effectum speratum medicamenta, quem quaerimus salutarem exitum morbi, procurare valeant. Ad causas externas, inflammationum auctores, quoque refert, contusiones, ambustiones, congelationes partium externarum, cum tamen istae adfectiones corporis etiam saepius sine inflammatione partibus variis inhaereant, neque semper inflammationem efficiant, vel eam comitem habeant. Praeferimus aliorum institutum, hos morbos sigillatim exponendi, propter cautelas, quas in cura requirunt.

Capite

- p. 289. Capite secundo partis secundae exponit Cl. Auctor morbos uniuersales, prout eos adpellat, quia in omnibus corporis humani partibus inueniuntur, et propter antecedentes, compositos vult adpellari. Huc refert vulnera generatim considerata, et alios morbos superius iam indicatos. Statuit Cl. Auctor adesse vulnus, si a vi quadam externa, recens corpori illata, laeduntur partes corporis humani molles, quod vero etiam in contusionibus fit: num vero recte dici possit, etiam vulnus a causa interna oriri, dubitamus, alias necessarium foret apoplexiam, rupturam vasorum lymphaticorum et alias eius modi humorum effusiones, quae interius in corpore humano fiunt, adpellari vulnera. Post ea progreditur ad diuisionem et accidentia vulnerum, ubi copiose et erudite refellit diuersorum auctorum adserta, de lethaltate vulnerum per se et per accidens, prout iam peculiari libro, Rostochii 1748. 4. emissio, illud demonstrauit uberiorius, et hic in chirurgia sua prae reliquis ea docet, quae ad felicem horum vulnerum curationem et exitum pertinent.
- p. 460. Transcamus porro ad luxationes. Data huius morbi descriptione, eam diuidit in completam et incompletam, ubi nempe ossa, articulatione inter se iuncta, vel plenarie, vel ex parte a se inuicem secedunt. Postquam signa enumerauit, ex quibus praesens luxatio cognosci potest, progreditur ad enumerationem causarum, quae utplurimum externae et violentae, non numquam tamen internae sunt. Inter has omnino nobis rarissima ista visa fuit, quam Cl. Auctor addit, quod aneurysma, sub clauicula exortum, valeat propellere eam ex articulatione sua, cum adeo validis ligamentis vicinis ossibus iuncta sit; hinc ea etiam citius frangitur, quam luxatur, si illam externa quaedam vis ferit. Quodsi nunc os, ex articulatione emotum, in sedem suam repellendum est, extensione et repositione opus habemus, quam,

vel

vel manibus, vel instrumentis, perficiunt chirurgi. Ad membrorum luxationes ipsas nunc deuenit Cl. Au p. 475. Auctor, et species non nullas luxationum adducit, ubi vis sola manuum sufficit, nempe luxationes manuum et pedum inferiorum: et vertebrarum colli puero- rum incompletam et modum eas restituendi insimul exponit, quam comprobare non possumus, cum ele- uatio ista totius corporis, apprehenso capite, admo- dum periculosa sit et peiora mala ex ea prouenire possint, prout PLATNERVS simile exemplum ex PETITO adducit*; neque omnibus placebit modus Cl. Auctoris in luxatione incompleta maxillae inferio- ris restituenda, dum iubet aegroto infligere cola- phum, propter graues dolores, qui exoriuntur, si molesta enchiresi tali repellitur in locum maxilla. Porro enumerat luxationes ossium nasi, clauiculae, costarum et enchireses eas reponendi breuibus stri- ctisque proponit: in maioribus vero articulis, prout loqui amat, sola manuum virtus non sufficit, hinc aliis auxiliis opus est, nempe habenis, loris et poly- spasto. Restitutum nunc in articulum, antea emo- tum, os retinetur, vel ab ligamentis ipsis in sede sua, vel deuincitur vinculis, cuilibet membro et luxationi propriis, si sedulo antea prospeximus sym- ptomatibus, quae deligationem necessariam impedire possunt, qualia sunt tumor, fugillatio, vulnus, fractura.

Sed cum fasciarum chirurgicarum variae sint figu- p. 487. rae et adpositionis modi, has, prout singulis singulo- rum membrorum luxationibus iniiciendae sunt, chi- rurgiae tironem pressa oratione edocet, et non tam ad ornatum et varietatem vincturarum, quam ad usum, nempe constrictionem partium, respexisse vide- tur, quia insimul monet, plures eius modi fascias, in fracturis alias tantum usuales, etiam in luxationibus adhiberi posse commode.

Ad

* Instit. Chir. §. 1123.

Ad caput tertium nunc progredimur, et ex mor-
bis partium singularibus, prae reliquis, morbos ocu-
li eligere placuit, quum summa diligentia omnia hu-
ius organi vitia considerasse, et diuersas curandi me-
thodos dilucide et erudite explanasse inueniamus Cl.
Auctorem. Ab externis oculi tegumentis exorsus,
recenset primum palpebrarum aegritudines, quas tum
adesse cognoscimus, si palpebrae insolitam magnitu-
dinem, immobilitatem, inuersionem et concretio-
nem inter se habent: si inflammantur et suppuran-
tur, et si, ut aliae corporis humani partes, reliquis
quoque morbis uniuersalibus, alibi expositis, adfici-
untur, quibus adhuc accedit in palpebris margo ci-
liorum induratus, cilia inuersa, vel eorum casus, re-
laxata vel nimium propendens palpebra superior,
p. 646. prout Cl. Auctor haec sigillatim indicauit, et quid
in quolibet morbi statu, aetate, et symptomatibus
fufcipiendum vel perficiendum fit, secundum feriem
explicat. Sub finem huius capitis modum deligandi
molliter oculos fascia Tab. 2. fig. 1. si alter oculus, et
Tab. 2. fig. 2. si uterque male adfectus, tirones ar-
tis instruit, et fasciarum ductus, quorsum dirigendi
sint, indicat. Absolutis autem palpebrarum morbis,
ad ea, quae interiora oculi comprehendunt mala
morbos nempe glandulae lacrymalis et sacci lacryma-
rum et fistulam lacrymalem pergit et quidquid mo-
do tam de cognoscendis rite hisce morbis, quam
etiam curandis illis, necessarium est scire medentibus
magna dictionis ubertate et remediorum copia, di-
serte demonstrat. Neque minori studio reliquos, qui
oculum ipsum tangere possunt morbos, et quorum
magnus est numerus, commentario erudito illustrat.
Sed nimis copiosum foret, si singula membratim re-
censere vellemus, hinc lectores nostros ad ipsum
Auctoris tractatum ablegamus, quem perlegisse queni-
libet iuuabit, in hac de oculorum morbis expositione.



XX.

Noua physico - medica.

Doctores et Professores, medicinam docentes.

1) In Academia Iulia Carolina dicta, quae floret
Helmstadii:

LAVRENTIUS HEISTER, Med. D. Sereniss. Brun-
svic. et Luneburg. Duci a consiliis aulicis eiusque
Archiatro; Medic. Profes. Publ. Ordinar. et Pri-
marius; Acad. Caesar. Naturae Curiosor. Adiun-
ctus et Regg. Acad. Berolin. et Societ. Londin.
Scient. Sodal. S.

PHILIPPUS CONRADUS FABRICIUS, Med. D.
Sereniss. Brunsv. et Luneburg. Duci a consiliis auli-
cis; Medic. Prof. Publ. Ordin. Societat. Medic.
Helmstad. Praefes; Acad. Caes. Nat. Curios. So-
dalis.

IO. GOTTLOB KRÜGER, Med. D. Medic. et Phi-
losoph. Profes. Publ. Ord. Acad. Caes. Nat. Curios.
Sodal. S.

His ex Philosophorum Ordine addendus:

IO. NICOLAUS FROBESIUS, Mathem. et Physic.
Prof. Publ. Ord. Acad. Iul. Carol. Aedilis.

2) In Academia Francofurtana ad Viadrum.

Professores Ordinarii:

CAROLUS AVGVSTVS DE BERGEN, Med. D. Pa-
thologiae et Therapiae Prof. Publ. Ord. Acad. Cae-
sar. Nat. Curiosor. et Reg. Scient. Berolinens. So-
dalis.

IO. FRIDERICVS CARTHEVSE, Med. D. Medic.
Anatom. Botanic. et Chymiae Prof. Publ. Ordin.
Z 2 Academ.

Academ. Electoral. Moguntinae Scient. Vtil. Socius Ordinarius.

Doctores reliqui legentes :

ANTON. PHILIPP. QVEITSCH, Med. D.

FRIDERICVS AVGVSTVS CARTHEVSE, Med.
D. Acad. Elector. Mogunt. Scient. Vtil. Socius Ordinarius.

Dresdae Vir Cl. CHRISTIANVS HENRICVS HAENEL, Med. D. Medicus huc usque Aulicus et copiarum Saxonicarum Primarius, sub initium huius anni a Potentiss. nostro Rege Consiliarius Aulicus, Archiater, collegiique medico-chirurgici Dresdensis Director, nominatus atque constitutus fuit.

Gottingae Cl. IO. GOTTFR. ZINN, Med. D. et Professor Botanices huc usque extraordinarius, quem saepius laudandi habuimus occasionem, a Pot. Magnae Britanniae Rege Professor Medicinae Ordinarius, nuper die nono mensis ianuarii declaratus fuit.

Ab eadem vero, qui *ibidem* floret, Academia Cl. IO. ANDREAS SEGNER, Phil. et Med. D. et Physices atque Matheseos Professor Ord. Vir de re publica literaria bene meritus, *Halam Magdeburgicam* auocatus ibique a Pot. Borussiae Rege Physices atque Matheseos Professor Ordin. constitutus et Consilarii Intimi honoribus, quumque e nobili gente ortus esset, in hisce nobilitatis iuribus atque honore ab eodem Sereniss. Rege confirmatus fuit.

Cum etiam de cura, quam uniuersitatis nostrae *Lipsiensis* Rex noster gerit Potentiss. laetemur, denuo habemus. Munus enim publice docendi botanicam, quo per multos haecenus annos cum laude functus fuerat

fuerat Cl. ANTON. GVILIELMVS PLAZIVS*, nunc in Virum Cl. ERNEST. GOTTLOB BOSE, Phil. et Med. D. et Facultatis, quae dicitur, Medicae Assessorum, quem, uti maximopere meretur, laudaremus, nisi amicitia, quam nobiscum colit, suspensas reddere videretur nostras laudes, detulit Optimus ille Pater Patriae. Illud is quoque munus nuperrime iam adiit die mensis huius aprilis decimo nono, programme eum in finem edito *de secretionibus humorum in plantis*, ideoque publice dicta oratione *de studio botanico oeconomico necessario*.

Porro medicinam extra ordinem apud nos docere iussit Clementiss. noster Rex Viros Cl. IO. CHRISTIAN. TILLING, Med. D. quem alia iam cur laudaremus occasione, habuimus: hic tamen per aestiui temporis menses, uti per plures iam annos cum merita fama solitus fuit, thermas Carolinas adire ibique porro aegros, aquis illis utentes, consiliis iuuare perget; et HENRICVM OTTONEM BOSSECK, Phil. et Med. D. et Reg. Litt. Acad. Rupell. Socium, IO. BOHNII, celeberrimi, dum viueret, non inter nostrates solum, sed apud externos quoque optimo iure celebris facti medici, ex filia nepotem.

Berolini in publico, quem Reg. Scient. Academia die mensis februarii vicesimo septimo habuit, conuentu inter alios, qui ad nos pertinet, Cl. DE SAVAGES, Med. D. eiusdemque in Academia, quae Monte Pessulano floret, Professore, adsciuit sibi socium.

Nouum prorsus atque omnium, qui rerum naturalium thesauros perscrutari solent, attentione ac ulteriore inuestigatione dignissimum semimetallum, *Platina di Pinto* Hispanis dictum, pondere suo aurum

Z 3

rum

* Comment. nostr. Vol. IV. P. I. p. 163.

rum fere aequans, argentum vero superans ab eoque quoad colorem proximum, ante paucos annos in America inuentum fuisse, studioque ANTON D' VILLOA inter nostrates demum innotuisse, olim iam retulimus *. Singulari nunc industria in indagandam corporis huius metallici indolem inquisiuisse legimus Anglum quendam, Cl. LEWIS (LVDOVICVM), Medicinae Baccalaureum, hosque suos labores cum Reg. Scient. Societate *Londinensi* communicasse, quae ideo nuper tricesimo mensis nouembris die illum ipsi, ut palmam, decreuerit nummum memorialem, ex testamento equitis cuiusdam COPLEY quotannis ei tribui solitum, qui, ex Illustris illius Societatis iudicio, nouis inuentis alios antecelluit. Vberiore *Ludouicianorum* horum tentaminum notitiam lectoribus nostris dare poterimus, ut primum ea Societatis eius actis inserta fuerint.

Regia Chirurgorum *Parisiensis* Academia praemio, quod b. DE LA PEYRONIE legasse constat, ad annum superiorem quinquagesimum quartum pertinenti et destinato quaestionem de amputationis membrorum in vulneribus cum ossium collisione et in primis vi sclopeti factis, determinanda necessitate proposuisse olim quoque iam narrauimus **. Commentarios autem super hoc argumento scriptos et ad illam Academiam missos, voluntati suae atque expectationi haud satis fecisse ea ipsa nunc indicauit monens potissimum, quod ab eorum auctoribus vix non omnibus quaestionis summa nec obseruata neque discussa satis fuerit: quibusnam nimirum in casibus illico post vulnus acceptum, operatio suscipi debeat, et in quibus contra aliis ea differri possit? Illud itaque idem argumentum, praemio nummi aurei, qui alias quingenta pondo aequat gallica, duplicato, ad annum proxime

* 1. c. Vol. I. P. IV. p. 708.

** 1. c. Vol. II. Part. I. p. 178.

proxime futurum, quinquagesimum scilicet sextum, doctorum virorum studio atque investigationi offert; iis, qui suas iam miserunt ad ipsam dissertationes, alias denuo, vel mutatas saltem, transmittendi relinquens potestatem, et terminum, intra quem illae iterum recipientur, ad huius usque, quem iam agimus, anni finem extendens.

Romae lege publica ante breue tempus sancitum esse legimus, quod nemini utramque medicinam, et externam et internam, facere in posterum debeat esse permissum, quin ideo examen subierit suaeque peritiae ediderit documenta; siue is hanc artem huc usque iam exercuerit, siue, quod suam illi nunc demum operam daturus sit, profiteatur.

Ibidem porro ut in rei pharmaceuticae incrementum publica, quae dicuntur, dispensatoria emendantur; iussu fuit, superfluis aut forte nociuis remediis penitus reiiciendis, reliquis autem, quo ea modo rite praeparari debeant, sedulo examinandis, totique pharmacopœorum ordini legibus praescriptis, ad quas artem suam ediscere et in usum deducere debeant, ut rei publicae veram afferant utilitatem.

Erfordiae anno iam superiore non nullos viros doctos in societatem ea mente coiisse, ut utilium artium atque scientiarum studeant augmento, silentio praeterire non possumus. Ea quoque iam felicitatis parte gauisa est haec societas, ut a Clementissimo suo Domino, Principe Electore Moguntiae non confirmata solum, sed et variis privilegiis et titulo *Academiae Electoralis Moguntinae Scientiarum Utilium* ornata sit, publico simul loco, conuentibus ipsius destinato, concessio. Omnibus reliquis, praeter theologiam, ius publicum et metaphysicam, scientiis et artibus operam atque studium ipsam daturam esse porro Praesidem ipsius Generosissimum Virum DA

NIELEM CHRISTOPHORVM, Liberum Baronem
 DE LYNKER, Regininis Electoralis Consiliarium;
 Directorem, Cl. Virum, HIERONYMV M FRIDERI-
 CVM SCHORCH, I. V. D. S. Palat. Caesar. Comi-
 tem, Iurid. Facult. Assessorem et Iur. Publ. Profess.
 Ordinar.; Secretarium denique, IO. GVILIELM.
 BAVMER, Med. D. et Prof. constitutos esse legimus.
 Prolixiorem sine dubio et instituti, et sociorum atque
 laborum, ipsa dabit adhuc societas rationem atque
 notitiam, quam, simul ac publici iuris facta fuit,
 cum lectoribus nostris communicare haud intermitte-
 mus.

In *eadem* urbe uniuersitas, quae ibi floret, per
 antiqua iacturam passa nuper est die quarto mensis
 nouembris morte viri, dum viueret, clari, IO.
 HENR. DE STEINMETZEN, Facult. Philos. Assess.
 et Physices Profess. Ordin. et totius uniuersitatis Se-
 nioris; in cuius locum surrogatum et paulo post die
 duodecimo eiusdem mensis Facult. Philosoph. Assess.
 Ordin. et Professore Physices constitutum esse Vi-
 rum Cl. quem iamiam nominauimus, IO. GVIL.
 BAVMER, accipimus.

Qua occasione facere non possumus, quin aliud
 viri mortem, per omnem fere Europam celebris fa-
 cti et qui inter physicos etiam innotuerat, Cl. scri-
 PIONIS MAFFEI referamus, quippe qui *Veronae*
 die mensis februarii undecimo, suum diem obiit su-
 premum, postquam doloroso ac diuturno morbo,
 quem asthma vocamus, confectus fuerat. Memo-
 riae huius viri de re publica literaria maxime meriti
 nuper decreuere Veronenses marmoream statuam,
 eamque nunc erigendam curant.

Parisis etiam ante breue tempus sub finem men-
 sis martii e viuis discessit Cl. DV MOVLIN, Med. D.
 et

et Potentiss. Regis Galliae Archiater, plurimum quam nonaginta annorum aetatem adeptus et insignes, uti fertur, post se relinquens diuitias.

XXI.

Continuatio supplementi indicis scriptorum physico-medidorum, quae anno 1753 prodierunt.

CAROL. LINNAEI Diff. Demonstrationes plantarum. Resp. *I. Christian Höjer*. Vpsal. 4.

Eiusd. Diff. Herbationes Vpsalienses. Resp. *Andr. N. Fornander*. ib. 4.

Eiusd. Diff. Instructio musaei. Resp. *Dau. Hultman*. ib. 4.

Eiusd. Diff. Plantae officinales. Resp. *Nicol. Gabn*. ib. 4.

Eiusd. Diff. Censura medicamentorum simplicium vegetabilium. Resp. *Gust. Iac. Carlbohm* ib. 4.

Eiusd. Diff. de cynographia. Resp. *Lindekranz*. ib. 4.

Esperienze sopra la Elettricità celeste di TOMASO MARINI. Bologna, 4.

Traité de charpenterie et des bois de toutes espèces, par M. MESANGE. 2 Voll. à Paris, 8.

ANTON. MICHETTA, Diff. de generali medicamentorum cognitione et usu. Viennae Austriae, 4.

ADAM NIETZKI, Progr. de medicina organica quatenus philosophiam mechanicam sibi vindicante. Halae ad Salam, 4.

Essai sur l'électricité des corps, par l'Abbé NOLLET. à Paris, 12. c. f.

Eiusd. Recherches sur les causes particulières des phénomènes électriques. ib. 12. c. f.

An Essay on the general method of treating cancerous tumours, in which the opinions of some of the most celebrated authors, who have writ on

• this subject, are examined and compared. The whole endeavouring to shew, what stages of this formidable disease are curable. Illustrated with several extraordinary cases. By WILLIAM NORFORD. London, 12.

Istoria de fossili del Pesarese, ed altri luoghi vicini di M. GIAM BATTISTA PASSERI Dissertazione I. nella quale si riferisce la storia della maggior parte de fossili, che nel territorio di quella città si ritrovano. Pesaro, 12.

CAROL. EMANVEL SCHELENBERGER, Diss. de musculorum actione. Resp. *Ioseph Wencesl. Czikanek*. Viennae Austriac, 4.

10. MELCHIOR STOERCK, Diss. de respirationis actione. Resp. *Theodor Offermanns*. Viennae Austriae, 4.

Eiusd. Diss. de visus organo. Resp. *Carol. Krapff*. ib. 4.

Eiusd. Diss. de secretione in genere. Resp. *Io. Georg. Hasenoehrl*. ib. 4.

THOMAS SHORT, on the causes and effects, prevention and cure of corpulency. London, 8.

LVDOLPH. STENHVYS, Diss. inaug. de haemorrhagiis in genere. Groningae, 4. mai.

105. FRANC. TESTA, Sopra la diss. della venefica indole del rame riflessioni dirette al s. p. P. MOLINELLI, Ferrara, 8. mai.

Relazioni d'alcuni viaggi fatti in diverse parti della Toscana per osservare le produzioni naturali e gli antichi monumenti di essa del GIOVANNI TARGIONI TOZZETTI. Fiorenza, Tom. VI. 8. (*Volumen ultimum*).

Institutiones physicae Auctore P. D. IOANNE MARIA DE TURRE. 2 Voll. Neapoli, 8.

Della venefica indole del Rame, Dissertazione di IGNAZIO VARI, in occasione della violenta morte cagionata da cibo in rame condito. Ferrara, 8.

An

An abstract of the anatomy of the human body, containing a short, but exact and satisfactory description of all the parts which compose it together with a plain account of their several uses. By VERDIER. Translated from the original French by DALE INGRAM. London, 8.

10. GOTTSCHALK WALLERII Diff. de origine Salium alcalinorum. Resp. Io. Sternberg. Vpsal. 4.
GEORG. WIDMER, Theoria chimificationis, chylificationis et lactificationis, methodo scientifica pertractata. Argentorati, 4.

XXII.

Index scriptorum physico-medlicorum, quae anno 1754 prodierunt.

Philosophical Transactions giving some account of the present undertakings, studies and labours of the ingenious, in many considerable parts of the world. Vol. XLVIII. Part. I. For the year 1753. London, 4. c. f.

Histoire de l'Academie Royale des Sciences, année 1750, avec les Memoires de Mathématique et de Physique pour la même année, tirés des Registres de cette Académie; à Paris, 4. mai. c. f.

Der Königl. Academie der Wissenschaften in Paris physikalische Abhandlungen, 10ter Theil, welcher die Jahre 1733 und 1734. in sich enthält; aus dem Französischen übersetzt von W. E. A. VON STEINWEHR. Breslau, 8. mai.

Ebender selben Academie, anatomische, chymische und botanische Abhandlungen, 6ter Theil; aus dem Französischen übersetzt von eben demselben. ib. 8.

Abhandlungen der Königl. Parisischen Academie der Chirurgie. Altenburg, 4. m. K.

Kongl.

Kongl. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar
för År 1754. Vol. XV. Stockholm, 8. mai. c. f.

*Der Königl. Schwedischen Academie der Wissenschaften
Abhandlungen aus der Naturlehre, Haushaltungs-
kunst und Mechanick auf das Jahr 1749; aus dem
Schwedischen übersetzt von ABRAHAM GOTTF-
HELF KAESTNER. 12ter Band. Hamburg, 8. mai.
m. K.*

Eben derselben 12ter Band auf das Jahr 1750. ib. m. K.
Commentarii Societatis regiae scientiarum Gottingen-
sis. Tomus III. ad annum 1753. Gottingae, 4.
c. f.

Acta physico medica Academiae Caesareae Leopoldi-
no-Carolinae Naturae Curiosorum exhibentia Ephe-
merides siue observationes historicas et experimen-
ta a celeberrimis Germaniae et exterarum regio-
num viris habita et communicata. Vol. decimum.
Accedunt appendix et tabulae aeneae XIII. Norim-
bergae, 4.

Histoire de l'Academie Royale des Sciences et belles
lettres, Année 1752, à Berlin, 4. c. f.

Dissertation qui a remporté le prix proposé par l'Aca-
demie Roy. des Sciences et belles lettres sur le
principe de l'action des muscles, avec les pieces
qui ont concouru; à Berlin, 4.

Actorum societatis Latinae Ienensis, editorum ab
eius Directore IO. ERNEST. WALCHIO. Voll.
III. Ienae, 8. mai. (*Aliqua ad historiam medici-
nae pertinentia in illis continentur*).

Essays and observations physical and litterary, read
before a society in Edinburgh and published by
them. Vol. I. Edinburgh, 8.

Recueil périodique d'observations de médecine, de
chirurgie et de pharmacie. Tom. I. à Paris, 8.
(*A mensé julio-collectionis huius initium*).

Recueil des Mémoires, ou Collection des Pièces Aca-
demi-

démiques, concernant la Médecine, l'Anatomie et la Chirurgie, la Chymie, la Physique Expérimentale, la Botanique et l'Histoire Naturelle, tirées des meilleures sources et mis en ordre par feu M. BERRYAT. 2 Voll. à Dijon, 4.

Curious Remarks and Observations, extracted from the history and memoirs of the royal academie of sciences at Paris; Vol. II. which concludes the general physics; By Dr. PETER TEMPLEMAN. London, 8.

Bibliothèque choisie de Médecine tirée des Ouvrages périodiques tant françois qu'étrangers; avec plusieurs autres Pièces rares et des Remarques utiles curieuses par M. PLANQUE; à Paris, 4.

Neue Anmerkungen über alle Theile der Naturlehre, aus den Englischen Transactionen, Actis Eruditorum, den Gedenkschriften der Academie der Wissenschaften in Paris und andern mehr gesammelt; aus dem Französischen übersetzt. 2ter Theil. Copenbagen, 8.

Allgemeine Historie der Natur nach allen ihren besondern Theilen abgehandelt; nebst einer Beschreibung der Naturalien Kammer Sr. Majestät des Königs von Franckreich; des 2ten Theils 2ter Band. Hamburg und Leipzig. 4. mai. m. K.

Sammlung neuer und merkwürdiger Reisen zu Wasser und zu Lande; 8ter Theil, worinnen der Herren ARMSTRONG und CLEGHORN Beschreibung der Insel Minorca enthalten ist, und von ihrem gegenwärtigen natürlichen und politischen Zustande, Alterthümern, Sitten und Gewohnheiten gehandelt wird; aus dem Englischen übersetzt. Göttingen, 8. mai. m. K.

Ebender selben 9ter Theil; worinnen des Herrn Prof. KALMS Beschreibung seiner Reise nach dem nördlichen America, die er auf Befehl der Königlich Schwedischen Academie der Wissenschaften un-
nommen

nommen hat; aus dem Schwedischen übersetzt. Erster Theil. Göttingen, 8. mai. m. K.

Histoire générale des voyages; avec des cartes géographiques, nouvellement composées sur les observations les plus authentiques; des plans et des perspectives; des figures d'animaux, des végétaux, habits, antiquités, etc. Tom. XII. à Paris, 4. c. f.

Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande, oder Sammlung aller Reisebeschreibungen. 12ter Band. Leipzig, 4. mai. m. K.

Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel. 9. 10. 11tes Stück. Basel, 8.

Neue Versuche nützlicher Sammlungen zu der Natur- und Kunstgeschichte, sonderlich von Obersachsen; gesammelt von einem Liebhaber der Wunder und Werke Gottes; bis 32tes Stück. Schneeberg, 8. (Editor CHRISTIAN GOTTLIEB GRUNDIG).

Versuche und Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 2ter Theil. Danzig und Leipzig, 4. m. K.

Stockholmisches Magazin, darinnen kleine Schwedische Schriften, welche die Geschichte, Staatsklugheit und Naturforschung betreffen, nebst neuen Berichten von den Königl. Schwedischen Academien der Wissenschaften, Hohen Schulen und andern Gelehrten in Schweden. Stockholm, 8. mai.

Hamburgisches Magazin oder gesammlete Schriften aus der Naturforschung und den angenehmen Wissenschaften überhaupt. 12ter und 13ter Band. Hamburg und Leipzig. 8. m. K.

Allgemeines Magazin der Natur, Kunst und Wissenschaften; 3ter und 4ter Theil. Leipzig, 8. mai. m. K.

Journal oeconomique ou Mémoires, notes et avis sur les arts, l'agriculture, le commerce et tout ce qui peut y avoir rapport. à Paris, 12.

Essays

Essays on Commerce, Mines, Agriculture, Fisheries, etc. as also the method of breeding silk worms in France, and many other parts of Europe, with several other useful subjects; translated from the *Journal Oeconomique*, printed at Paris. London, 8.

Oeconomische Nachrichten; bis 80tes Stück. Leipzig, 8.

Oeconomisch-physicalische Abhandlungen. 7ter Theil. ibid. 8.

Leipziger Sammlungen von allerhand zum Land- und Stadt-wirthschaftlichen-Policy-Finanz- und Cammer-Wesen dienlichen Nachrichten; bis 124. Stück. Leipzig, 8.

Selecta physico-oeconomica, oder nützliche Sammlungen von allerhand zur Naturforschung und Haushaltungskunst gehörigen Begebenheiten; etc. bis 13tes Stück. Stuttgart, 8.

Die wahren Mittel, Länder und Staaten glücklich zu machen; oder großes oekonomisches und physicalisches Lexicon, etc. vornemlich aus des P. NOEL CHOMELS Dictionnaire oeconomique genommen und vermehret. 6ter Theil. Leipzig, fol.

Physicalische Belustigungen; bis 24. Stück. Berlin, 8.

Gesellschaftliche Erzählungen, für die Liebhaber der Naturlehre, der Haushaltungswissenschaft, der Arzneykunst und der Sitten; 4ter und letzter Theil. Hamburg, 8.

Ephemerides cosmographiques, où le cour vrai du soleil et des planètes est représenté et expliqué en détail dans l'apparence de tous ses arcs consécutifs par sa réalité, d'après les tables, les calculs, les équations astronomiques pour l'année 1754; avec d'importantes observations sur la cosmographie, l'astronomie, l'histoire naturelle, la métaphysique, la physique systématique et expérimentale, la theorie des cieux et de la terre, qui forment une
suite

suite aux articles des quatre volumes précédens.
Vol. in 16. à Paris, c. f.

The principles of natural philosophy: with some Remarks upon the fundamental principles of the Newtonian philosophy; in an introductory letter to sir HILDEBRAND IACOB. London, 8.

Songes physiques. à Amsterdam, 12.

Penées sur l'interpretation de la nature. 12.

De causa descensus gravium dissertatio physica in usum studiosae iuventutis. Wratislaviae, 8.

Recherches et observations sur la durée de la vie de l'homme. Première partie. à Nancy, 8.

Amilec, ou la graine d'hommes qui sert à peupler les planètes, Par L'A. D. P. Troisième édition, augmentée très - considérablement; à Luneville, 12. Deux parties.

Amilec, ou la graine d'hommes. Nouvelle édition, avec des remarques amusantes; à Somniopolis, chez Morphée. 12.

Idem liber. 3 part. à Francfort. 12.

Système Naturel du Règne Animal par classes, familles ou ordres, genres et espèces avec une notice de tous les animaux; les noms grecs, latins et vulgaires, que les Naturalistes leur ont donnés; les citations des Auteurs, qui en ont écrit; une table pour chaque classe, qui désigne la famille ou l'ordre, le genre et l'espèce de chaque animal. Ouvrage enrichi de Figures en taille-douce. Tome I. Contenant les classes des Quadrupèdes, Oiseaux, Amphibies; suivant la méthode de Mr. KLEIN; avec une notice de celle de Mr. LINNAEVS sur ces mêmes animaux; et l'ordre des Poissons suivant la division d'ARTEDI; à Paris 8. mai. c. f. Tom. II. Contenant la classe des insectes et celle des vers; suivant la méthode de Mr. LINNAEVS; à Paris, 8. mai. c. f.

Gründliche Anweisung alle Arten Vögel zu fangen, einzustellen, abzurichten, zahm zu machen, ihre Eigenschaften zu erkennen, Bastarten zu ziehen, ihnen fremden Gesang zu lernen, und sie zum Aus- und Einfliegen zu gewöhnen, nebst Anmerkungen über HERVIEUX von Vögeln, und JOSEPH MITTELLI Jagdlust, Nürnberg, 8. m. K.

A Catalogue of seeds and roots, divided under their proper heads; Shewing their different kinds, season of sowing, planting and culture, according to the new stile; colours of flowers height and time of flowering; the quantity of grass seeds sown on an acre of land, and which trees and shrubs shed their leaves, and which are ever-green. London, 4.

Unterricht von der wilden Baumzucht, welchergestalt durch Anlegung nützlicher Pflanzgärten oder wilder Baumschulen, allerley Holzsorten nachgezogen werden können. Aufpach, 8.

L'art de cultiver les mûriers blancs, d'élever les vers à soye et de tirer la soye des cocons; à Paris, 8 c. f.

Memoire pour servir à la culture des mûriers et à l'éducation des vers à soye; à Poitiers, 12.

Deutliche Anweisung, wie sich bey Anziehung der weissen Maulbeerbäume, so wohl bloß durch Saamen, als durch deren Pflanzung und Fortsetzung, allenthalben zu verhalten; ingleichen was bey Zucht und Wartung der Seidenwürmer vornehmlich zu beobachten und wie die Seide zuzubereiten. Zu eines jeden Unterricht öffentlich mitgetheilt. Dresden, 8.

Traité de la culture des Renoncules, des Oeuillets, des Auricules et des Tulipes; à Paris, 12.

Om medel til Mineralogiens vidare förkofran. Stockholm.

Aquitaniae, minerales aquae. Parisiis, 4. (Auctor est Cl. DE BORDEU).

Tom. IV. Pars II.

A a

Le

Le véritable elixir; des propriétés, qualités et effets du Caffé, avec la maniere d'en user tant pour la santé que pour certaines maladies; à Bresle, 8.

Essai sur les alimens pour servir de Commentaire aux livres diététiques d'HIPPOCRATE; Trois parties, à Paris, 12. (Cl. Auct^{or} LORRY).

Von der Schädlichkeit des Kupfergeschirres in der Haushaltung. Eisenach, 4.

Dictionnaire anatomique latin-françois, contenant l'explication des termes les plus utiles et les plus connus avec leurs définitions exactes; à Paris, 12.

Abrégé de l'anatomie du corps humain. Par M.... dernière édition; à Paris, 12. (Auct^{or} est Cl. VERDIER).

Pharmacopoeia Wurtembergica, in duas partes diuisa, quarum prior materiam medicam, historico-physico-medice descriptam, posterior composita et praeparata, modum praeparandi et encheireses exhibet. Editio tertia. Stuttgartardiae, fol.

Delle ferite della cute del capo, dissertazione, in cui si mostra l'insufficienza del di loro preteso pericolo, ed il metodo di presto, sicuramente, e con placidezza curarle. In Venezia, 4. (Auct^{or} Cl. PROSPERO MARIOTTI).

Dissertazione teorico pratica dell'utilità del salasso nel vajuolo. In Verona, 8. (Auct^{or} GIOVANNI DALLA BONA).

Pensées d'un Allemand de Nostalgie adressées à un de ses amis en Suisse. à Iene, 4.

The history of the great plague in London, in the year 1665; containing observations and memorials of the most remarkable occurrences, both public and private, that happened during that dreadful period. By a citizen that lived the whole time in London. To which is added a journal of the plague at Marseilles, in the year 1720.

London, 8. (*Libri huius iam olim editi, nunc au-*

tem

tem recus; verus auctor esse dicitur satis ille clarus
DANIEL DE FOE).

*Unterricht von der Hornviehseuche, wie solcher vor-
zubauen, und wie des kranken Viehes zu pflegen.*
Leipzig, 8.

*Sammlung der in Sr. Koeniglichen Preussischen Majestät
Landen ergangenen neuesten Verordnungen, Instru-
tionen und medicinischen Gutachten, die Rindvieh-
Seuche betreffend; nebst einem Vorberichte, worin-
nen ein zuverlässiges Mittel wider diese Seuche zu-
erst bekannt gemacht wird von D. DAN. GOTT-
FRIED SCHREBERN. Halle, 8.*

*Abhandlung von der Gewalt des Teufels in die Körper,
oder was von Hexen, Zaubereyen, Gespenstern und
Geistern zu halten. zwey Theile. Eisenach, 4.*

*Fasciculus dissertationum ad historiam medicam, spe-
ciatim anatomes, spectantium, quem ob raritatem
non minus ac utilitatem prodire curavit ERN. GO-
DOFR. KVRELLA. Berolini, 8. (Auctores earum
dissertationum sunt: PHILIPP. IACOB. HART-
MANN, Prof. Regiomont. et IO. HENR. SCHVL-
ZE, Prof. Halensis).*

Quaestiones medicae Parisinae. Groningae, 8.

*Traductions des Statuts des Docteurs Régens, de la
Faculté de Médecine en l'Université de Paris. Par
M. MICHEL BERMINGHAM; à Paris, 4.*

*Die Einrichtung einer Haushaltung, sowohl in der Stadt,
als auf dem Lande. Leipzig, 8.*

*Kurze, jedoch gründliche Einleitung in die Haushal-
tungskunst, worinnen das nützlichste und nathis-
t derselben deutlich enthalten ist. Nürnberg, 8.*

*Verbesserung aller Stubenoefen, wodurch dem vielen
Einheizen, wie auch Holznachlegen, abgeholfen,
und dennoch die Stube warm gehalten wird. Eise-
nach, 8. m. K.*

*GEORGE ANDR. AGRICOLA, Neu und nie erhör-
ter, doch in der Natur und Vernunft wohlgegrün-*

deter Versuch der Universal-Vermehrung aller Bäume, Stauden-und Blumen-Gewächse. 2 Theile. Regensburg, fol. m. K.

MICHAEL ALBERTI, Diff. inaug. de athletica fallaci sanitate. Resp. Io. Christian Rokkobl. Halae Magdeb. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de morbis incarceratorum. Resp. Io. Dan. Hutter. ib. 4.

Eiusd. Diff. de febre intermittente senibus lethifera. Resp. Nic. Esmarch. ib. 4.

B. S. ALBINI Academicarum annotationum liber primus, continens anatomica, physiologica, zoographica, phytographica. Leidae, 4. mai. c. f.

PROSPER. ALPINI de praesagienda vita et morte libri septem; cum praef. HERM. BOERHAAVE. Accurante H. D. GAVBIO. Francofurti, 4.

Brevis relatio de electricitate propria lignorum, auctore P. WENDELINO AMMERSIN. Lucernae, 12.

Des Pater D'ARDENE Tractat von den Ranunkeln, worinnen nebst andern physischen Wahrnehmungen auch zum Feldbau und zur Gärtnerey gehörige nützliche Anmerkungen vorkommen. Aus dem Französischen übersetzt von D. G. E. H. Nürnberg, 8. mit illuminirten Kupfern.

Plain and familiar instructions for persons afflicted with ruptures, in which are given distinct notions of these maladies and the most proper means of curing them, with rules and directions on the use and application of trusses; to which is added a Dissertation upon the disorders of the urethra, by GEORGE ARNAVD. London, 8.

IOH. CHRISTIAN ARNOLD, Dissert. de calore, motu particularum corporis eoque rotatorio circa axes neutiquam explicando. Resp. Laur. Io. Iac. Lange. Erlangae, 4.

VON ARVIEUX, *hinterlassene merkwürdige Nachrichten, worinnen er sowohl seine Reise nach Constantino-*

stantinopel, in Asien, Syrien, dem gelobten Lande, etc. beschreibt; im Französischen herausgegeben von LABAT, und itzt ins Deutsche übersetzt, dritter und vierter Theil. Coppenhagen, 8.

IOH. AVNANTS gründliche Anweisung zum Seiden-Bau und Maulbeerbaum-Plantagen, wie solche in Teutschland anzulegen; nebst einem nützlichen Anbange. Zweyte und mit vielen neuen Zusätzen vermehrte Auflage. Leipzig, 8.

HEINRICH BAKERS Beyträge zu nützlichem und vergnügendem Gebrauche und Verbesserung des microscopii, mit 17 Kupferblatten; aus dem Englischen übersetzt. Augspurg, 8.

IO. BAPT. BASSEVILLE, Quaest med. Vtrum Aquitaniae minerales aquae morbis chronicis? Resp. Theophil. de Borden. Paris, 4. mai.

IO. WILHELM. BAVMER, Diss. de animali generatione et speciatim de humana natura. Resp. Christoph. Wilh. Emanuel Reichard. Erford. 4.

Lettre sur l'électricité par le I. B. BECCARIA, adressée à Mr. l'Abbé NOLLET; traduite de l'Italien par M. DE LOR; à Paris, 12.

IOH. IOACHIM BECHERS kluger Hausvater, verständige Hausmutter, vollkommener Landmedicus, auch wohlerfahrner Roß- und Vieh-Arzt. Leipzig, 12.

IOAN. V. D. BEKE, Diss. de variolis. Traj. ad Rhen. 4.

CAROL. AVG. DE BERGEN, Diss. inaug. de nyctalopia, seu visu nocturno. Resp. Anton. Maximilian. Bach. Francof. ad Viadr. 4.

Eiusd. Diss. de morbis auris externae. Resp. Ferdinand. Godofr. Schiebel. ibid. 4.

Eiusd. Diss. de morbis auris internae. Resp. Ignat. Adalbert. Diettrich. ibid. 4.

Traité d'Osteologie, par M. BERTIN. 4 Voll. à Paris, 8. c. f.

Essai sur les usages des montagnes avec une lettre sur le Nil, par ELIE BERTRAND; à Zurich. 8. mai.

BIDET, *Abhandlung vom Anbau und Verbesserung des Weinstocks, von der Art und Zubereitung des Weins, und was man dabey in Acht zu nehmen habe. Mit Kupfern, vornemlich zu einer Presse von einer ganz neuen Erfindung versehen. Aus dem Französischen übersetzt. Leipzig, 8. m. K.*

ELISABETHAE BLACKWELL, collectio stirpium, quae in pharmacopoliis ad medicum usum afferuntur etc. ELISABETH BLACKWELL *vermehrtes und verbessertes Kräuterbuch; bis 306. Blat; illuminirt. Nürnberg, fol. mai.*

GEORG. RYDOLPH. BOEHMER, *Diss. inaug. de feбри, remedio. Resp. Io. Traugott Boehme. Wittenbergae, 4.*

Eiusd. *Progr. de virtute febris in sanandis spasmodicis. ibid. 4.*

HERRMANN BOERHAAV, *Physiologie übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von IOH. PETER EBERHARD. Halle, 8.*

ABRAH. KAW BOERHAAV, *Historia anatomica infantis, cuius pars inferior monstrosa. Petropoli, 4. c. f.*

FRIDER. BOERNER, *de Aemilio Macro eiusque rarioribus hodie opusculo de virtutibus plantarum diatriba. Lipsiae, 4.*

Eiusd. *Progr. de vera medicinae origine potioribusque eius ad HIPPOCRATIS usque tempora incrementis. Vitembergae, 4.*

GE. DAN. BÜSSEI, *Grundlegung zur Hebammenkunst für die Wehmütter. Flensburg, 8.*

IO. BAPTISTA DE BONIS, *Hydropisia seu de potu aquae in morbis libri quatuor. Neapoli, 4. (Tractatio poetica).*

Recherches sur l'usage des feuilles dans les plantes, et sur quelques autres sujets relatifs à l'histoire de la

la vegetation par CHARLES BONNET; à Göttingue et Leide, 4. c. f.

ERNEST. GOTTLOR. ROSE, *Diss. de radicum in plantis ortu et directione.* Resp. *Christoph. Gottlieb Trautmann.* Lipsiae, 4.

L'Electricité, son origine et ses progrès. Poëme en deux livres par Mr. GEORGE MATTHIAS ROSE, traduit de l'Allemand par Mr. l'Abbé JOSEPH ANTOINE DE C**; à Leipzig, 12. mai.

Eiusd. *Diss. sistens prima corporis physici principia.* Resp. *Joseph. Mart. Mierling.* Wittebergae, 4.

HENRIC. OTTO BOSSECK, *Diss. inaug. de malo ossium schemate.* Lipsiae, 4.

IOH. MICHAEL BOVRGARD, *Diss. inaug. de pleuripneumonitide.* Argentorati, 4.

IAC. IOH. BRÜHNER, *Abhandlung von der Ungewissheit der Kennzeichen des Todes, und dem Misbrauche, der mit übereilten Beerdigungen und Einbalsamirungen vorgeht; aus dem Französichen übersetzt, und mit Anmerkungen und Zusätzen vermehrt; herausgegeben von D. IOH. GOTTFR. IANCKE.* Leipzig, 8.

I. H. BRAND, *Sorgfältiger Land-und Bauern-Doctor; vermehrte Auflage. Erster Theil.* Heilbron, 8.

IOH. GOTTFR. BRENDL, *Diss. inaug. sistens experimenta circa submersos in animalibus instituta.* Resp. *Eman. Ioh. Alb. Evers.* Editio secunda. Göttingae, 4.

Eiusd. *Diss. inaug. de feriori usu euacuantium in quibusdam morbis acutis.* Resp. *Frid. Aug. Schulze.* ibid. 4.

Eiusd. *Diss. inaug. de phthiseos hecticæque discrimine et setaceorum utrobique usu.* Resp. *Io. Henr. Riepenhausen.* ibid. 4.

SIMON. ANTON. BRINGARD, *Quaest. med. An, ut suppurato reni, sic calculoso, ferrum?* Resp. *Theophil. de Borden.* Paris, 4. mai.

IOH. FRIDER. DE BROKE, Diff. inaug. de vesicae urinariae appendicibus. Argentor, 4. c. f.

An introduction to physick and surgery. Containing
1) Medicinal institutions, or physiology, hygiene, pathology, semiotics and therapeutics. 2) A compendious system of anatomy. 3) A general account of wounds, ulcers, tumours, operations and dressings; as also the medicines used in surgery. 4) Botany and the *Materia Medica*. 5) Pharmacy as well chemical as galenical. 6) A dispensatory containing a great variety of the most efficacious officinal compositions and extemporaneous prescriptions. 7) A syllabus of the symptoms of all the diseases incident to the human body. 8) An index of diseases and their remedies. 9) A posologic table, containing the doses of all the simples and compounds. 10) An explanation of the terms of art, accented as they are to be pronounced. By R. BROOKES. London, 8.

Essai sur l'éducation medicinale des enfans et sur leurs maladies. Par M. BROVZET; à Paris, Tom. I. II. 12. mai.

IO. PETR. BVCHNER, Diff. inaug. de rachitide perfecta et imperfecta. Argentor, 4. c. f.

IO. BALTHASAR VON BVCHWALD, Diff. de rationali aetologia rheumatismi et arthritidis una cum methodica nosologia utriusque affectus, ad normam Sauvagesianam confecta. Resp. Ioh. Carl. Christian Pape. Hafniae.

Discours sur la nature des animaux per M. DE BUFFON, à Geneve, 12.

Fundamenta Materiae medicae ad specialem praxin in primis accommodatae, edita ab ANDREA ELIA BVCHNER. Halae Magd. 8.

Eiusd. Diff. inaug. de purpura puerperarum symptomatologica ex uteri inflammatione. Resp. Ernst. Christian. Hartmann. ibid. 4.

ANDR. ELIA BÜCHNER, Diff. inaug. de remediis mercurialibus spinæ ventosæ medicandæ interdum idoneis. Resp. *Ioachim. Niemann.* Halæ Magd. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de vitiis mēstrui fluxus perite emendandis. Resp. *Georg. Werner.* Niedt. ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de morbo periodico generatim. Resp. *Io. Samuel Raetzdorff.* ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de differentia actionis medicamentorum medicæ et physicæ. Resp. *Henr. de Roy.* ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de morborum signis, quæ a naribus desumuntur. Resp. *Christian. Gottlieb Roll.* ibid. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de partibus constitutivis salis communis huiusque actione in corpus humanum vivum. Resp. *Frid. Reinhard. Marquard.* ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de pinaestro siue pino sylvestri. Resp. *Gottlieb. Engelb. Fuchs.* ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de medicamentorum mercurialium, cum salibus paratorum, efficacitate, per adiunctum sulphur ad certos quosdam morbos magis accommodanda. Resp. *Io. Erhard. Richter.* ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de iudiciis aurium in morbis. Resp. *Io. Gottlieb Dennewitz.* ib. 4.

An account of the preparation and management necessary to inoculation; by JAMES BURGES. London, 8.

GOTTFRIED HEINRICH BURGHART, *wohl eingerichtete Destillir-Kunst; neue revidirte Auflage.* Breslau, 8.

A method of cure for the Stone chiefly by injections; with descriptions and delineations of the instrumens contrived for those purposes; by WILLIAM BUTTER. Edinburgh, 12. mai.

PETR. CAMPER, Diff. de fractura patellæ. Resp. *Iac. Koole.* Franequeræ, 4. mai.

IOH. SALOMON LA CARRIERE, Diss. inaug. de qualitate et quantitate alimentorum infantibus a prima natiuitate usque ad septimum aetatis annum conuenientibus. Ienae, 4.

IO. FRID. CARTHEUSER, Diss. inaug. de oleo Kajuput. Resp. Carol. Wilhelm. Cartheuser. Francof. ad Viadr. 4. mai.

Eiusd. Diss. de singultu. Resp. Carol. Mauriti. Küstler. ibid. 4.

Eiusd. Diss. chymico-physica, de genericis quibusdam plantarum principiis haëtenus plerumque neglectis. Resp. Io. Laurent. Baudis. ib. 4.

Piscium, serpentum, insectorum, aliorumque nonnullorum animalium, nec non plantarum quarundam imagines, quas MARCVS CATESBY in posteriore parte operis, quo Carolinae, Floridae et Bahamensium insularum tradidit historiam naturalem eiusque appendice, descripsit. -- MARCVS CATESBY *Abbildung verschiedener Fische, Schlangen, Insecten, etc. bis 38stes Blat; illuminirt.* Nürnberg. fol. reg.

A treatise on the Bath-Waters: wherein are discovered the several principles of which they are composed, the cause of their heat, and the manner of their production; by RICE CHARLETON. Bath. 8. c. f.

Graecorum chirurgici libri; SORANI unus de fracturarum signis, ORIBASII duo de fractis et de luxatis, e collectione NICEITAE ab antiquissimo et optimo codice Florentino descripti, conuersi atque editi ab ANTONIO COCCIO. Florentiae. fol.

IO. HENR. COHAUSENII Commercii litterarii curiosi dissertat. epistolic. Tom. III. Francof. 8. c. f.

Pneumato-Pathologie ou Traité des maladies ventreuses,

teuses, traduit du Latin de M. COMBALVSIER,
par M. I. (IAVLT.) 2 Voll. à Paris, 12.

Memoire sur l'inoculation de la petite verole par M.
DE LA CONDAMINE; à Paris, 12. *Idem liber
prodiit succice Stockholmiae.*

Traité des sensations, à Madame la Comtesse DE
VASSE par M. l'Abbé DE CONDILLAC; 2 Voll.
à Londres, 12.

*Der neue Arzt, eine Anweisung, wie er seyn soll; ent-
worfen von C. L. N. D. Leipzig, 8.*

IO. HARTMANN DEGNER, Historia medi-
ca de dysenteria biliosa contagiosa, quae anno
MDCCXXXVI. Neomagi et in vicinis ei pagis
epidemice grassata fuit. Editio nouissima, ab
Auctore ipso reuisa et aucta. Trajecti ad Rhenum,
8. mai.

Consultations et Observations Medicinales par Mr.
ANTOINE DEIDIER; 3 Voll. à Paris, 12.

DEIEAN gründliche Abhandlung vom Destilliren; aus
dem Französischen übersetzt. Altenburg, 8.

IOHANN ANDR. DEISCHENS Abhandlung, daß
weder die Wendung noch Englische Zange in allen
Geburtsfüllen sicher gebraucht, noch dadurch, die
scharffen Instrumente gänzlich können vermieden wer-
den; nebst einem Anhang von eingesperreten Brü-
chen. Augspurg, 8.

HENR. FRIED. DELII Diss. inaug. de taraxaco, prae-
fertim aquae eiusdem per fermentationem paratae
eximio usu. Resp. Frid. Ioseph. Wilhelm Schröder.
Erlangae, 4.

Eiusd. Diatribe medica de catalepsi. Editio altera.
ibid. 4.

IOH. DAN. DENSO, physikalische Bibliothek. 4tes und
2tes Stück. Rostock, 8.

GEORG. CHRISTOPH. DETHARDING, Diss. de
scorbuto Megapolensium. Resp. Georg. Frid.
Ziegenhagen. Rostoch. 4.

GEORG.

GEORG. CHRISTOPH. DETHARDING, Diff. de haemorrhoidibus vesicae mucosis. Resp. *Franc. Phil. Knaudt*. Rostoch. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de febribus vulnerariis. Resp. *Cour. Ern. Endter*. ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de cautione medici circa casus infanticidiorum. Resp. *Christ. Ioach. Wolff*. ib. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de facie a variolarum insultibus praeservanda. Resp. *Tob. Phil. Hilcken*. ib. 4.

Eiusd. Progr. de haemorrhoidibus hodie quam olim frequentioribus. ib. 4.

LUDWIG MICHAEL DIETERICH *historisch-physikalische Abhandlung von dem berühmten Wildbade zu Abach in Niederbayern*. Regensburg, 8. m. K.

Publick Virtu, a poem in three books; 1) Agriculture; 2) Commerce; 3) Arts; by R. DODSLEY. London, 4.

GVALTHERI VAN DOEVEREN, Sermo academicus de imprudenti ratiocinio ex observationibus et experimentis medicis. Groningae, 4. mai.

ARNOLD DVNTZE, Diff. inaug. complectens experimenta varia, calorem animale spectantia. Lugd. Bat. 4 mai.

FRANC. IOSEPH DVTOY, Diff. inaug. de tunica pituitaria, exponens eius anatomiam, physiologiam et pathologiam. Resp. *Bened. Ruppert*. Vitero. Pragae. 4.

Eiusd. Diff. inaug. de ventriculo, exponens eius anatomiam, physiologiam, et aetiologiam pathologicam. Resp. *Io. Nepomuc. Schlemmer*. ib. 4.

IO. PETR. EBERHARD, Diff. sistens Theses de visu. Resp. *Carol. Guil. Schulz*. Halae Magd. 4.

Eiusd. Diff. sistens Theses de sensatione ut natura. Resp. *I. C. S. Brückner*. ibid. 4.

Eiusd. methodus conscribendi formulas medicas tabulis expressa. ib. 8.

JOHANN GOTTLIEB VON ECKHART, *vollständige Experimental-Oeconomie über das vegetabilische, animalische und mineralische Reich. Jena. 4.*

Essais de Medecine sur le flux menstruel et la curation des maladies de la tête; où par rapport à la première partie, on donne une théorie nouvelle sur le flux periodique des femmes; et par rapport à la seconde, on propose un remède nouveau contre les maladies céphaliques; traduits du latin de Mr. ROBERT EMETT; par M. HURTAVT; à Paris, 12.

O. MICHAEL ENGELMANN, *Diff. inaug. de melancholia. Argentorati, 4.*

WILHELM ERHARD, *Oeconomische Pflanzen-Historie, nebst dem Kerne der Landwirthschaft, Garten- und Arzeneykunst. Dritter Band. Ulm, 8.*

DOROTHEA CHRISTIANA ERXLEBIA, *Diff. inaug. exponens quod nimis cito ac iucunde curare saepius fiat causa minus tutae curationis. Halae Magdeburg. 4.*

FR. ESCHENBACHS *Chirurgie. Rosstock und Leipzig. 8. m. K.*

PHILIPP. CONRAD. FABRICII *Progr. quo observationes nonnullas anatomicas nuperis sectionibus collectas recensere pergit. Helmstädt, 4.*

Eiusd. *Sammlung einiger medicinischer Responsorum und Sectionsberichte. Helmstädt, 8.*

O. GOTTFR. FALCK, *Diff. inaug. de epilepsia seu convulsivis motibus virginum. Gottingae, 4.*

A vindication of a Sermon entitled: *Inoculation an indefensible practice*; in which Dr. KIRKPATRICK's arguments in favour of the operation, together with his and a certain letter-writer's objections are distinctly considered and reply'd to, and the practice demonstrated in the amplest manner, highly culpable in a moral, extremely absurd

furd in a physical view by THEODORE DE LA
 FAYE. London, 8.

GEORG. GVIL. FEVERLEIN, Diss. inaug. de ulce-
 rum artificialium in crisi bus febrium acutarum im-
 perfectis praeclaro usu. Götting. 4.

Osservazioni apologetiche critiche sopra la relazione
 d'un malatto della Rocca di S. Cassiano del CAR-
 LENIO FIDANI. Bolognese, 4.

De senio, eiusque gradibus et morbis, nec non de
 eiusdem acquisitione tractatus. Auctore IOAN.
 BERNHARDO DE FISCHER. Praemissa praefat-
 tione ANDRAE ELIAE BÜCHNERI. Erfor-
 diae, 8.

*Oeconomische Vorschläge die Lüneburger Heyde art-
 hafft zu machen, von IOH. IACOB FLEISCH-
 HAVER. Göttingen.*

*Der vernünftige Medicus in der Physiologie, Pathologie
 und Praxi, darinnen gezeigt wird, was ein Medi-
 cus nicht allein in der Physiologie und Pathologie zu
 beobachten hat; sondern auch, wie sowohl ein Medi-
 cus, als Chirurgus, in den Zufällen und Krankheiten
 des Leibes auf die Bewegungen der Natur, Tempe-
 ramente, Gewohnheiten der Natur und andere Um-
 stände sehen, und seine Cur vernünftig darnach an-
 stellen soll; mit Beyfügung bey jedem Zufalle der
 sichersten und bewährtesten, nach des berühmten Herrn
 D. STAHL'S Methode eingerichteten Medicamenten
 verfaßet und herausgegeben von D. SAMUEL FOR-
 BIGERN. Vierte Auflage. Leipzig, 8.*

LA FOSSE, Abhandlung von dem wahren Sitze des
 Rotzes bey denen Pferdten und denen Mitteln, diese
 Krankheit zu heilen. Frankfurth, 8.

Observations et decouvertes faites sur des chevaux,
 avec une nouvelle pratique sur la ferrure. Par le
 Sieur LA FOSSE; à Paris, 8. c. f.

FRACASTORII Syphilis seu Morbus Gallicus, tra-
 duit

duit en Prose françoise par M. M. MAQVER et
LACOMBE; à Paris.

OACH. FRANKENS *Philosophische Abbildung der
Arzney-Erkenntniß und des Arzneyverständigen.*
Altona, 8. mai.

New Experiments and observations on Electricity,
made at Philadelphia in America; By BENIAMIN
FRANCKLIN; Communicated to P. COLLIN-
SON; and read at the Royal Society June 27. and
July 4. 1754. To which are added: A Paper on
the same subject by I. CANTON and read at the
Royal Society Dec. 6. 1753; and another in de-
fence of Mr. FRANCKLIN against the Abbe
NOLLET, by Mr. D. COLDEN, of New-York.
Part. III. London, 4.

O. HERMANN FVRSTENAV, Diff. inaug. de
brachio sphacelato, spontanea naturae vi ab inte-
gro reliquo corpore separato. Resp. Christian. Ru-
dolph. Bödeker. Rintelii, 4.

*Mit nützlichen Anmerkungen erläuterte Beschreibung sei-
ner im Jahr 1751. in das Kayser-Carls-Bad gethanen
Reise, nebst geographischer Kupferplatte; wie auch
einer Nachricht aller von dem Carlsbade bekannten
Bücher und Schriften; in einigen Briefen ausgefertigt
von M. C. G. G. Schneeberg, 8.*

Observations on venereal complaints, and on the me-
thods recommended for their cure. By THOMAS
GATAKER. London, 8.

E. DE GEER, Tal om infectes nas alstring. Stock-
holm.

CLAUD. IOSEPH. GENDIL, Quaest. med. An cal-
uae vehementius contusae terebra? Resp. Io. Nicol.
Millin de la Courveault. Paris, 4. mai.

Reliqua proxime.



Conten-

Contenta in hac Parte.

1. Commentarii societatis regiae scientiarum Göttingensis. Tom. III. p. 193.
2. DE HALLER Iconum anatomicarum Fasciculus VII. p. 205.
3. ROESEL'S *Insecten - Belustigungen* p. 215.
4. HERBERT Diss. de Cassauae amarae Surinamensis radice p. 228.
5. GRAINGER Historia febris anomaliae Batavae annorum 1746 etc. p. 234.
6. LIND a Treatise of the Scurvy p. 238.
7. LE ROY an a diuersa virus scorbutici indole et sede morbi diuersi? p. 259.
8. LAMBERGEN Ephemeris persanati carcinomatis p. 261.
9. DEGNER de dysenteria bilioso-contagiosa. Edit. Nov. p. 267.
10. BUTTER a Method of cure for the stone chiefly by injections p. 273.
11. WATTS a Dissertation on the ancient and noted doctrine of revulsion and derivation p. 277.
12. BASSEVILLE utrum Aquitaniae minerales aquae morbis chronicis p. 289.
13. *Physicalische Belustigungen*, Pars I. - XXIV. p. 295.
14. *Versuche und Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig. II. Theil.* p. 305.
15. GERDIL Diss. sur l'incompatibilité de l'Attraction etc. p. 320.
16. FRANKLIN new Experiments and observations on electricity. Pars III. p. 326.
17. Quaestiones medicae Parisinae p. 329.
18. NAVIER Diss. Sur plusieurs maladies populaires etc. p. 333.
19. ESCHENBACH'S Chirurgie p. 341.
20. Noua physico - medica p. 353.
21. Continuatio supplementi indicis scriptorum physico-medicorum, quae anno 1753. prodierunt p. 359.
22. Index scriptorum physico - medicorum, quae anno 1754 prodierunt p. 361.

